

ГЕРБИЦИДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ С ПАВ ИЛИ АДЬЮВАНТАМИ

АГРОСТАР	327	*ПАВ Даш	322
АТОН	330	*ПАВ Нью-филм.....	323
БАЗАГРАН	331	*ПАВ Протон.....	323
БАЗИС	327	*ПАВ Сателлит.....	324
БАТУ	325	*ПАВ Саф	324
*БиоПауэр (адьювант)	321	*ПАВ Сильвет Голд	325
БОМБА	318	*ПАВ Талант.....	325
БУРАН СУПЕР	323, 331	*ПАВ ТБС.....	326
ГАРМОНД	323	*ПАВ Тоник	326
ГРАНСТАР	327	*ПАВ Трайдокс.....	327
ГРИМС	320	*ПАВ Тренд 90	327
ДУБЛОН ГОЛД	318	*ПАВ Фортуна	330
ДУБЛОН СУПЕР	319	*ПАВ Хелтер	330
КАЛИБР	328	*ПАВ Цитовет.....	331
КАЛЛИСТО	323	*ПАВ Экоприл.....	331
КАРЕ ПЛЮС	326	ПЛУГГЕР	319
КАРИ-МАКС	322	РЕВАНШ	326
КАРИБУ	328	Риф Макс	317
КАСКАД	317	САЛЬСА	328
КАССИУС.....	324	САТИР	325, 326
КОНДОР	324	САТИР ПЛЮС	325, 327
КОРРСАН	317	СЕРТО ПЛЮС	322
ЛЕГИОН	330	СТЕДФАСТ	328
ЛЕОНИЙ	327	СТЕЛЛАР	322
МАИС	321	СТРАТОС УЛЬТРА	323
МайсТер	321	ТАРАН	317
МАЙТУС	325	ТИТУС	329
НИКОМЕКС ПЛЮС	318	ТИТУС ПЛЮС	329
НОПАСАРАН	322	ТРИЦЕПС	319
НОПАСАРАН УЛЬТРА	322	ХАРМОНИ	329
ОВСЮГЕН СУПЕР.....	324	ХАРМОНИ ЭКСТРА	329
*ПАВ (Корвет или Ат Плюс)	323	ШЕДОУ ЭКСТРА	320
*ПАВ 100	317	ЭКЛАТ	324
*ПАВ 200	317	ЭЛЛАЙ ЛАЙТ	330
*ПАВ АГРО.....	317	ЭСКУДО	319
*ПАВ Агронекс ПРО	318	ЭФФЕКТ	327
*ПАВ АДЬЮ, Ж	318		
*ПАВ Альф.....	320		
*ПАВ Амиго	320		
*ПАВ Бит 90	321		

Примечание:

* - наименование ПАВ.

ГЕРБИЦИДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ С ПАВ ИЛИ АДЪЮВАНТАМИ

<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, фирма</i>	<i>Норма расхода препара- тата, л/га, кг/га</i>	<i>Культура, обрабатыва- емые объекты</i>	<i>Сорная и нежелательная растительность</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Срок пос- ледней об- работ- ки (в днях до сбора уро- жая)</i>	<i>Крат- ность обра- боток</i>
1	2	3	4	5	6	7
ПАВ 100						
КОРРСАН , ВРГ, (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсуль- фурон-метил, 250 г/кг), ООО «Агрозашита плюс», Беларусь, Ningbo Lido Interna- tional Incorporation Co., Ltd, Китай	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ 100	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях дву- дольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползу- чего 10-15 см)	1	
ПАВ 200						
Риф Макс , ВРГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсуль- фурон-метил, 250 г/кг), ЧУП «Двистар», Беларусь, «Ипрохем» СО., LTD, Китай (Р), (П-4)	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ 200	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях дву- дольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползу- чего 10-15 см)		1
ПАВ АГРО						
КАСКАД , ВДГ (амидосульфурон, 750 г/кг), ООО «Франдеса», Беларусь, Yangzhou Pioneer Chemikal Co., Ltd, Китай (П-4)	15-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Агро	Пшеница, тритикале, рожь озимые	Однолетние двудольные, в т. ч устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х (подмаренник цепкий)	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения до появления флаг-листа культуры		1
	15-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Агро	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х (подмаренник цепкий)	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения до появления флаг-листа культуры		1
ТАРАН , ВДГ (римсульфурон 50% + тифенсульфурон-метил 25%), ООО «Франдеса», Беларусь, Yangzhou Pioneer Chem- ical Co., Ltd, Китай (Р), (П-4)	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ АГРО	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях дву- дольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползу- чего 10-15 см)	83	1

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
ПАВ Агронекс ПРО						
НИКОМЕКС ПЛЮС, ВДГ (никосульфурон, 700 г/кг + тифенсульфурон-метил, 125 г/кг), ф. МАС-GmbH, Германия (Р), (П-З)	50-70 г/га + 150 мл/га ПАВ Агронекс ПРО	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
ПАВ АДЬЮ, Ж						
БОМБА, ВДГ (трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг), ЗАО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	20 – 25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев - полного кущения культуры		1
	25 – 30 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения-флаг - лист культуры		1
	20 – 25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Пшеница озимая	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев - кущения культуры		1
	20 – 25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	25 – 30 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Пшеница озимая	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения-флаг - лист культуры		1
	20 – 25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Тритикале озимая	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев - кущения культуры		1
ДУБЛОН ГОЛД, ВДГ (никосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил, 150 г/кг), ЗАО Фирма "Август", Россия (Р), (П-З)	50 – 70 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных сорняков, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-20 см)		1

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
ДУБЛОН СУПЕР , ВДГ (дикамба кислоты, 425 г/кг + никосульфурон, 125 г/кг), ЗАО Фирма "Август", Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5 кг/га + 0,2 л/га ПАВ Адю, Ж	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
ПЛУГТЕР , ВДГ (метсульфурон-метил, 125 г/кг + трибенурон-метил, 625 г/кг), ЗАО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	10-15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д, 2М-4Х и некоторые многолетние	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры, 2-4 листа однолетних сорняков и в фазу розетки многолетних сорняков		1
	10-15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов осенью в фазе 2-3 листа – кущение культуры		1
	10-15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Пшеница озимая	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры и ранние фазы роста сорняков		1
	15-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу трубкования – флаг-лист культуры		1
ТРИЦЕПС , ВДГ (трифлусульфурон-метил, 750 г/кг), ЗАО Фирма "Август", Россия (Р), (П-3)	20 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов после появления всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сорняков		3
ЭСКУДО , ВДГ (римсульфурон, 500 г/кг) ЗАО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Картофель	Однолетние, многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см и высоте пырея ползучего 10-15 см.		1
	15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	То же	То же	Двукратное опрыскивание. Первое: опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см и высоте пырея ползучего 10-15 см.		2
	10 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж			второе – не позднее 14 дней после первого		

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Кукуруза	То же	Опрыскивание в фазу 2-6 листьев культуры и высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж 10 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	То же	То же	Двукратное опрыскивание по первой и второй волне сорняков в фазу 2-6 листьев культуры, при высоте пырея ползучего 10-15 см (интервал 10-20 дней)		2
ПАВ Альф						
ГРИМС , ВДГ (римсульфурон, 250 г/кг), ЗАО «ФМРус», Россия, ТООО «Фобус», Беларусь (П-3)	50 г/га + 200 мл/га ПАВ Альф Ж	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые, некоторые двудольные	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Альф Ж	Кукуруза (кроме семенных посевов)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры в период до начала кушения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев		1
ПАВ Амиго						
ШЕДОУ ЭКСТРА , КЭ (клетодим, 240 г/л), ф. Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция, ООО «Ариста ЛайфСайенс Восток», Россия (П-4)	0,4-1 л/га + 1,2-3 л/га ПАВ Амиго	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. виды щетинника, куриное просо, пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев у сорняков, при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		1
	0,2-0,3 л/га + 0,6-0,9 л/га ПАВ Амиго	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев у сорняков (независимо от фазы развития культуры)		1
	0,5-0,7 л/га + 1,5-2,1 л/га ПАВ Амиго	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		1

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
	0,3-0,5 л/га + 0,9-1,5 л/га ПАВ Амиго	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры при 2-5 листьев сорняков		1
	0,5-0,7 л/га + 1,5-2,1 л/га ПАВ Амиго	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	0,4-0,6 л/га + 0,7 л/га ПАВ Амиго Стар	Рапс озимый	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,7-1 л/га + 0,7 л/га ПАВ Амиго Стар	То же	Многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
Био-Пауэр (адьювант)						
МайсТер , ВДГ (форамсульфурон, 300 г/кг + йодосульфурон-метил-натрий, 10 г/кг + изоксадифен-этил /антидот/, 300 г/кг), ф. Байер КропСайенс АГ, Германия (П-3)	0,1-0,125 л/га + 1 л/га Био-Пауэр (адьювант)	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры, в т. ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 л/га		1
ПАВ Бит 90						
МАИС , СТС (римсульфурон, 250 г/кг), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия, ф. «Agro Expert Group» Kft., Венгрия	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Бит 90	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры в период до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев		1
	50 г/га + 200 мл/га ПАВ Бит 90	Картофель	То же	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Бит 90	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – при высоте культуры 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см;		2

Гербициды, используемые с пав или адъювантами

1	2	3	4	5	6	7
	20 г/га + 200 мл/га ПАВ Бит 90			второе – не позднее 14 дней после первого		
КАРИ-МАКС, СП в водорастворимых пакетах (трифлусуль- фурон-метил, 500 г/кг + ПАВ Бит 90), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия, ф. «Agro Expert Group» Kft., Венгрия (Р), (П-4)	30 г/га + 200 мл/ га ПАВ Бит 90	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные	Опрыскивание по- севов после появле- ния всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сор- няков		3
ПАВ Даш						
НОПАСАРАН, КС (имазамокс, 25 г/л + метазахлор, 375 г/л), ф.БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-3)	1-1,2 л/га + 1-1,2 л/га ПАВ Даш	Рапс озимый и яровой СL (гибриды рап- са Clearfield, устойчивые к гербициду)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание по- севов в фазу 2-4 ли- стьев культуры		1
НОПАСАРАН УЛЬТРА, КС (имазамокс, 35г/л + квинмерак, 250 г/л), ф.БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-3)	1-1,2 л/га + 1-1,2 л/га ПАВ Даш	Рапс яровой СL, (гибриды рап- са, Clearfield, устойчивые к гербициду)	То же	То же		1
СЕРТО ПЛЮС, ВДГ (тритосульфурон, 250 г/кг + дикамба, 500 г/кг) ф. БАСФ СЕ, Германия	0,1-0,2 кг/га + 0,5 л/га ПАВ Даш	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание по- севов осенью в фазу 1-2 листа - кущения культуры		1
	0,1-0,2 кг/га + 0,5 л/га ПАВ Даш	То же	То же	Опрыскивание по- севов весной в фазу кущения культуры		1
	0,1- 0,15 кг/га + 0,5 л/га ПАВ Даш	Ячмень	То же	То же		1
	0,2 кг/га + 1 л/га ПАВ Даш	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 листьев культуры		1
СТЕЛЛАР, ВРК (дикамба, 160 г/л + топрамезон, 50 г/л), ф. БАСФ СЕ, Германия (П-3)	0,8-1 л/га + 1 л/га ПАВ Даш	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 листьев культуры		1

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
СТРАТОС УЛЬТРА, КЭ (циклоксидим, 100 г/л), ф.БАСФ СЕ, Германия (Р), (П-3)	1- 1,5 л/га + 1-1,5 л/га ПАВ Даш	Рапс яровой	Однолетние злаковые	Опрыскивание по- севов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков		1
	1,5 – 2 л/га + 1,5- 2 л/га ПАВ Даш	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание по- севов при высоте пырея ползучего 10- 15 см		1
ПАВ (Корвет или Ат Плюс)						
КАЛИСТО, КС (мезотрион, 480 г/л) ф. Сингента Лимитед, Великобритания (Р), (П-4)	0,15- 0,25 + 1,0 л/га ПАВ (Корвет или Ат- Плюс)	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые и не- которые много- летние двудольные (мята полевая, чистец болот- ный)	Опрыскивание по- севов в фазу 3-5 ли- стьев культуры и 2-4-х листьев у дву- дольных сорняков до начала кущения однолетних злаковых сорняков		1
ПАВ Нью филм 17						
БУРАН СУПЕР, ВР (глифосата кислоты, 550 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (П-4)	1,5-3 л/га + 0,2 л/га ПАВ Нью филм- 17	Поля, пред- назначенные под посев различных культур (яро- вые зерновые, овощные, технические, масличные, лекарствен- ные и др.)	Однолетние и многолетние злаковые и дву- дольные	Опрыскивание веге- тирующих сорняков в период их активного роста		1
	3,6 л/га + 0,2 л/га ПАВ Нью филм- 17	То же	Бодяк полевой, вьюнок полевой, чистец болот- ный	То же		1
ПАВ Протон						
ГАРМОНД, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), ф. Inter Tecno Consult Ltd., Швейцария (Р)	15-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Протон	Пшеница, три- тикале и рожь озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2-3 листьев культуры, в период 2-4 листьев у двудольных сорняков		1
	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Протон	То же	То же + бодяк полевой	Опрыскивание по- севов в фазу 2-3 листьев культуры, в фазу розетки у бодя- ка полевого		1

Гербициды, используемые с пав или адъювантами

1	2	3	4	5	6	7
ПАВ Сателлит						
КАССИУС , ВРП (римсульфурон, 250 г/кг), ЗАО «Щелково Агрохим», Россия	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Сател- лит, Ж	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и не- которые дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея пол- зучего 10-15 см, дву- дольных – в фазу 2-4 листьев		1
	50 г/га + 200 мл/га ПАВ Сател- лит, Ж	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые и неко- торые двудоль- ные	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков, при высоте пырея ползучего 10- 15 см		1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Сател- лит, Ж 20 г/га + 200 мл/га ПАВ Сател- лит, Ж	То же	То же	Двукратное опрыски- вание: первое - при высоте картофеля 5-25 см и при высо- те пырея ползучего 10-15 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков; второе – не позднее 14 дней после первого		2
КОНДОР , ВДГ (трифлусульфурон-ме- тил, 500 г/кг), ЗАО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-4)	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Сател- лит, Ж	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов после появле- ния всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сор- няков		3
ОВСЮГЕН СУПЕР , КЭ (феноксапроп-П- этил, 140 г/л + клокви- тосет -мексил, 47 г/л /антидот/), ЗАО "Щелково Агро- хим", Россия П-4	0,3 л/га + 0,2 л/га ПАВ Сател- лит, Ж	Тритикале озимая, пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг обыкновенный, просо куриное и др.)	Опрыскивание посе- вов весной по веге- тирующим сорнякам, начиная со 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)		1
	0,3 л/га + 0,2 л/га ПАВ Сател- лит, Ж	Ячмень, пшеница яровые	То же	То же		1
ПАВ Саф						
ЭКЛАТ , в.г. (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсуль- фурон-метил, 250 г/кг), ф. Симонис Б.В., Нидерланды	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Саф	Кукуруза	Однолетние дву- дольные, одно- летние и много- летние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10- 15 см)		1

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
ПАВ Сильвет Голд						
САТИР , ВДГ (римсульфурон, 250 г/кг), ф. Уилловуд Лтд, Китай (Р)	40-50 г/га + 50-100 мл/га ПАВ Силь- вет Голд	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, некоторые двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры в период до начала кущения одно- летних злаковых сор- няков и высоте пырея ползучего 10-15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев		1
	45-55 г/га + 50-100 мл/га ПАВ Силь- вет Голд	Картофель	То же	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков, высоте пы- рея ползучего 10-15 см		1
	30 г/га + 50-100 мл/га ПАВ Силь- вет Голд 20 г/га + 50-100 мл/га ПАВ Силь- вет Голд	То же	То же	Двукратное опрыски- вание: первое – при высоте культуры 5-25 см и высоте пырея ползу- чего 10-15 см, в фазу 2-4 листьев двудоль- ных сорняков; второе – не позднее 14 дней после первого		2
САТИР ПЛЮС , ВДГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсуль- фурон-метил, 250 г/кг), ф. Уилловуд Лтд., Китай (П-4) (Р)	20-25 г/га + 50-100 мл/га Силь- вет Голд	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры в период до начала кущения одно- летних злаковых сор- няков и высоте пырея ползучего 10-15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев		1
ПАВ Талант						
БАТУ , ВГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсуль- фурон-метил, 250 г/кг), ООО «Рутон», Украина (Р), (П-3)	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Талант	Кукуруза (кроме семен- ных посевов)	Однолетние, многолетние злаковые и одно- летние двудоль- ные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10- 15 см)		1
МАЙТУС , в.г. (римсульфурон, 250 г/кг), ООО «Рутон», Украина (Р)	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Талант	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, и некоторые дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры в период до начала кущения одно- летних злаковых сор- няков и высоте пырея ползучего 10-15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев		1

Гербициды, используемые с пав или адъювантами

1	2	3	4	5	6	7
	50 г/га + 200 мл/га ПАВ Талант	Картофель	То же	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков, высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Талант 20 г/га + 200 мл/га ПАВ Талант	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – при высоте культуры 5-25 см и высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков; второе – не позднее 14 дней после первого		2
КАРЕ ПЛЮС , в.г. (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг), ООО «Рутон», Украина (Р)	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Талант	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов после появления всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сорняков		3
ПАВ ТБС						
РЕВАНШ , ВДГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг), ООО «ТрансБелСиб Техно», Беларусь, Yangzhou Pioneer Chemical Co., Ltd, Китай (Р), (П-4)	20-25 г/га + 0,2 л/га ПАВ ТБС	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см)	68	1
ПАВ Тоник						
САТИР , ВДГ (римсульфурон, 250 г/кг), ф. Уилловуд Лтд., Китай (Р)	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры в период до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев		1
	45-55 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник	Картофель	То же	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков, высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – при высоте культуры 5-25 см и высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков;		2

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
	20 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник			второе – не позднее 14 дней после первого		
САТИР ПЛЮС , ВДГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсуль- фурон-метил, 250 г/кг), ф. Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-4)	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10- 15 см)		1
ЭФФЕКТ , ВДГ (трифлусульфурон-ме- тил, 500 г/кг), ф. Уилловуд Лтд., Китай (Р)	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание по- севов после появле- ния всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сор- няков		3
ПАВ Трайдокс						
ЛЕОНИЙ , 75% в. г. (римсульфурон, 50% + тифенсульфурон-метил, 25%), ООО «Научно-произ- водственное коммер- ческое предприятие «УСХ», Украина (П-4)	20-25 г/га + 200 мл/ га ПАВ Трай- докс	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10- 15 см)		1
ПАВ Тренд 90						
АГРОСТАР , ВДГ (тифенсульфурон-ме- тил, 545 г/кг + метсуль- фурон-метил, 164 г/кг), ф. Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл, Швейцария	15-18 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Пшеница озимая и яровая, ячмень	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, 2М-4Х и некоторые мно- голетние дву- дольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения – флаг-листа культуры, в фазу 2-4 листа однолетних сорняков и фазу ро- зетки бодяка полево- го и осота полевого		1
БАЗИС , 75% в.р.г. (римсульфурон, 50% + тифенсульфурон-метил, 25%), ф. Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл, Швейцария (П-4)	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 ли- стьях двудольных, до начала кущения одно- летних злаковых сор- няков и высоте пырея ползучего 10-15 см)		1
ГРАНСТАР , 75% с.т.с. (трибенурон-метил), ф. Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл, Швейцария (П-4)	10-15 г/га + 200 мл/ га ПАВ Тренд 90	Пшеница яровая и озимая, триitikале озимая, ячмень	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев – флаг-листа культуры, в период 2-4 листьев у дву- дольных сорняков		1
	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	То же	То же + бодяк полевой	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-3 листьев – флаг-листа культу- ры, при высоте бодя- ка полевого 10-15 см		1

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
	15-20 г/га без ПАВ Тренд 90	Овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-3 листьев – флаг-листа куль- туры, в период 2-4 листьев у двудольных сорняков		1
КАРИБУ , 50% с.п. (водорастворимые пакеты) (трифлусульфурон-метил), ф. Дюпон Интернешнл Оперейшнз Сарл, Швейцария (П-4)	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посе- вов после появле- ния всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сор- няков	60	3
КАЛИБР , ВДГ (тифенсульфурон-ме- тил, 500 г/кг + трибенурон-метил, 250 г/кг), ф. Дюпон Интернешнл Оперейшнз Сарл., Швейцария (П-3)	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Пшеница, тритикале озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, 2-М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посе- вов весной в фазу кущения - флаг-листа культуры, ранние фазы роста однолет- них и фазу розетки многолетних сорняков		1
	30-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Рожь озимая	То же	То же		1
	30-40 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Пшеница, ячмень яровые	То же	То же		1
САЛЬСА , СП в водорастворимых пакетах (этамесульфурон-метил, 750 г/кг) ф. Дюпон Интернешнл Оперейшнз Сарл., Швейцария (Р), (П-3)	15-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Рапс яровой	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посе- вов в ранние фазы развития сорняков (семядольные ли- стья)		1
	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Рапс озимый	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посе- вов осенью или вес- ной в фазу: развития культуры - от семя- долей до момента вы- движения цветочных бутонов; (сорняков - семядоли -2-4 листа- однолетние; много- летние –розетка)		1
СТЕДФАСТ , ВДГ (никосульфурон, 500 г/кг + римсульфу- рон, 250 г/кг), ф. Дюпон Интернешнл Оперейшнз Сарл., Швейцария (Р), (П-3)	20-40 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10- 15 см		1

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
ТИТУС , 25% с.т.с. (римсульфурон), ф. Дюпон Интернешнл Оперейшнз Сарл, Швейцария (П-4)	50 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые, двудольные	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90 20 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – при высоте культуры 5-25 см и высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков; второе – не позднее 14 дней после первого		2
	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры в период до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев		1
ТИТУС ПЛЮС , ВДГ (дикамба кислоты (в виде диметил аминной соли), 609 г/кг + римсульфурон, 32,5 г/кг), ф. Дюпон Интернешнл Оперейшнз Сарл., Швейцария (Р), (П-3)	310-385 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры в период 2-4 листьев у двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см		1
ХАРМОНИ , 75 % с.т.с. (тифенсульфурон-метил), ф. Дюпон Интернешнл Оперейшнз Сарл, Швейцария (П-4)	15-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	10-15 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Пшеница яровая, ячмень	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков		1
	10 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и триазиновым гербицидам	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры и 2-4 листьев сорняков		1
ХАРМОНИ ЭКСТРА , ВДГ (тифенсульфурон-метил, 500 г/кг + трибену-	40-50 г/га + 200 мл/га	Рожь, пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, 2М-4Х	Опрыскивание посевов осенью в фазу 1-2 листа – кущения культуры, ранние фазы		1

Гербициды, используемые с пав или адъювантами

1	2	3	4	5	6	7
рон-метил, 250 г/кг), ф. Дюпон Интернэшнл Оперейшнз Сарл, Швейцария (П-4)	ПАВ Тренд 90		и некоторые многолетние	роста однолетних и фазу розетки много- летних сорняков		
	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	То же	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу кущения - флаг-листа культуры, ранние фазы роста однолет- них и фазу розетки многолетних сорняков		1
	30-40 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Пшеница и ячмень яровые	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-3 листьев - флаг-листа куль- туры, ранние фазы роста однолетних и фазу розетки много- летних сорняков		1
ЭЛЛАЙ ЛАЙТ , ВДГ (метсульфурон-метил, 391 г/кг + трибенурон- метил, 261 г/кг), ф. Дюпон Интернэшл Оперейшнз Сарл, Швейцария	6-8 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	Рожь, пшеница и тритикале озимые, пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, 2М-4Х и некоторые мно- голетние дву- дольные (осот, бодяк)	Опрыскивание посе- вов весной в фазу кущения – флаг – ли- ста культуры, в фазу 2-4 листа однолетних сорняков и фазу ро- зетки многолетних сорняков		1
ПАВ Фортуна						
АТОН , ВДГ (тифенсульфурон-ме- тил, 750 г/кг), ф. Кеминова А/С, Дания (П-3)	10-15 г/га + 0,25 л/га ПАВ Форту- на	Кукуруза (кро- ме семенных посевов)	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 листьев культуры и 2-4 ли- стьев сорняков		1
ПАВ Хелпер						
ЛЕГИОН , КЭ (клетодим, 240 г/л + ПАВ Хелпер), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия, ф. «Agro Expert Group» Kft., Венгрия (Р), (П-4)	0,2-0,4 л/га + 0,6- 1,2 л/га ПАВ Хелпер	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,7-1,0 л/га + 2,1-3 л/га ПАВ Хелпер	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов при высоте пырея ползучего 10- 15 см		1
	0,2-0,3 л/га + 0,6-0,9 л/га ПАВ Хелпер	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры		1
	0,7-1 л/га + 2,1-3 л/га ПАВ Хелпер	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см (в фазу 3-5 листьев) незави- симо от фазы разви- тия культуры		1

Гербициды, используемые с пав или адьювантами

1	2	3	4	5	6	7
	0,2-0,3 л/га + 0,6- 0,9 л/га ПАВ Хелпер	Рапс яровой	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-4 листьев культуры		1
	0,5-0,7 л/га + 1,5- 2,1 л/га ПАВ Хелпер	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов при высоте пырея ползучего 10- 15 см		1
ПАВ Цитовет						
БАЗАГРАН, 480 г/л в.р. (бентазон), ф. БАСФ СЕ, Германия (П-4)	1,5-2 л/га + 0,4 л/га ПАВ Цито- вет	Горох овощной	Однолетние двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-4 листьев культуры		1
ПАВ Экоприл						
БУРАН СУПЕР, ВР (глифосата кислоты, 550 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (П-4)	1,5-3 л/га + 0,5 л/га ПАВ Эко- прил	Поля, предна- значенные под посев различ- ных культур (яровые зерно- вые, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание веге- тирующих сорняков в период их активного роста		1
	3,6 л/га + 0,5 л/га ПАВ Эко- прил	То же	Бодяк полевой, вьюнок полевой, чистец болотный	То же		1