

Приложение 4
к постановлению
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
29.10.2015 № 37
(в редакции постановления
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
04.10.2017 № 49)

ТРЕБОВАНИЯ к сортовым и посевным качествам семян картофеля

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Допустимые значения признаков для различных категорий семян по этапам их воспроизводства					
		оригинальные семена				элитные семена	репродукционные семена
		микрорастения в культуре in vitro	первое клубневое поколение	питомник предварительного размножения	супер-супер элита		
Требования к сортовым качествам семян							
Сортовая чистота посадок	%, не менее	–	100	100	100	100	98,5
Наличие растений, пораженных болезнями (по внешним признакам), всего в том числе:	%, не более	–	0	0,4	0,4	4,0	10,0

легкими вирусными болезнями (обыкновенная мозаика, мозаичное закручивание листьев)		–	0	0,4	0,4	3,0	–
тяжелыми вирусными болезнями (морщинистая мозаика, полосчатая мозаика, скручивание листьев)		–	0	0	0	1,0	10,0
почвенными вирусами (раттл, моп-топ)		–	0	0	0	1,0	2,5
виroidными (готика-веретеновидность клубней)		–	0	0	0	0	0
бактериальными:							
черная ножка		–	0	0	0	0	2,0
кольцевая гниль		–	0	0	0	0	0
Требования к посевным качествам семян							
Размер клубней (не распространяется на семена, используемые на собственные нужды):	мм						
для сортов с удлинённой формой		–	7–55	28–55	28–55	28–55	28–55
для сортов с округло-овальной формой		–	9–60	30–60	30–60	30–60	30–60
Наличие клубней, не соответствующих по размеру	%, не более	–	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Внешний вид		растения зеленой окраски с не менее чем четырьмя междоузлиями, с развитой корневой системой и листовым аппаратом	клубни целые, с окрепшей кожурой по форме и окраске типичные соответствующему ботаническому сорту, сухие, непроросшие (при весенней реализации с ростками длиной не более 5 мм)				

Наличие растений: переросших с искривленными стеблями, других ботанических сортов, пораженных вирусной и другой инфекцией	шт.	0	–	–	–	–	–
Наличие клубней с признаками «удушья», подмороженных, с ожогами, уродливых, с израстаниями и легкообламываемыми наростами, разрезанных, раздавленных, с ободранной кожурой более 1/3 поверхности клубня	%, не более	–	0	0	0	0	0
Наличие клубней с повреждениями: механическими (порезы, вырывы, трещины, вмятины тканей клубней глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм) и вредителями (проволочником – более трех ходов, грызунами, хрущами и совками на площади более 1/3 поверхности клубня и глубиной более 5 мм без повреждения глазков)	%, не более	–	5	5	5	5	5
Наличие клубней других ботанических сортов	%, не более	–	0	0	0	0	0,5
Наличие клубней, пораженных болезнями, всего	%, не более	–	0,5	6,0	6,0	8,0	12,0
в том числе:							
мокрой гнилью		–	0	0	0	1,0	1,0
черной ножкой		–	0	0	0	0	1,0
кольцевой гнилью		–	0	0	0	0	0
фитофторозом		–	0	0,5	0,5	1,0	2,5
резиновой, сухими гнилями (фомоз, фузариоз, антракноз)		–	0	0,5	0,5	1,0	2,0
стеблевой нематодой		–	0	0	0	0	0,5
обыкновенной и серебристой паршой (поражение		–	0,5	5,0	5,0	5,0	5,0

более 1/3 поверхности клубней) ризиктониозом (при поражении от 1/10 до 1/4 включительно поверхности клубней)		–	0,5	1,0	1,0	5,0	5,0
Наличие земли и посторонних примесей	%, не более	–	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0
Наличие растений, клубней, пораженных вирусной и бактериальной инфекцией в скрытой форме (не распространяется на семена, используемые на собственные нужды, за исключением семян супер- суперэлиты), всего	%, не более	0	1,0	10	10	–	–
в том числе:							
вирусами X, S, M		0	1,0	9,0	9,0	–	–
вирусами Y, L, A		0	0	1,0	1,0	–	–
бактериальной инфекцией:							
черной ножкой		0	0	0	0	–	–
кольцевой гнилью		0	0	0	0	–	–