

ФУНГИЦИДЫ
(для субъектов хозяйствования)

А

АБАКУС ПРАЙМ	80
АБАКУС УЛЬТРА	80
АБАРОНЦА	70
АБАРОНЦА СУПЕР	73
АБИГА-ПИК	75
АВАТАР 280 КС	11
АГРИСЕЙВ	38
АДВАНС	71
АЗИМУТ	62
*Азоксистробин	9
*Азоксистробин + боскалид	9
*Азоксистробин + дифеноконазол	9
*Азоксистробин + дифеноконазол + тебуконазол	10
*Азоксистробин + протиоконазол	13
*Азоксистробин + протиоконазол + дифеноконазол	13
*Азоксистробин + тебуконазол	10
*Азоксистробин + флузаинам	11
*Азоксистробин + ципроконазол + пропиконазол	13
*Азоксистробин + эпоксиконазол	14
АЗОРРО	24
АЗОФОС ФОРТ, 30% к.с.	75
АЗОФОС, 50% к.с.	15
АЗОФОС, 65% пс.	15
АЗУМАКС	23
АКАНТО ПЛЮС	33
АКРОБАТ МЦ	18
АЛИОТ	44
АЛЬКОР СУПЕР	45
АЛЬТО СУПЕР	45
АЛЬТО ТУРБО	78
*Аметоктрадин + диметоморф	15
АМИСТАР ГОЛД	9
АМИСТАР ТРИО	13
АМИСТАР ЭКСТРА	11
АМИСТАР ЭКСТРА ГОЛД	12
*Аммоний-медь-фосфат /АМФ/	15
АНОРКА	9
АНТРАКОЛ	46
АРМЕКС 5	75
АРФА	17

Б

БАКЛЕР	59
БАЛАЯ	34
БАЛИЙ	40
БАНДЖО ФОРТЕ	66
БЕЛЛИС	33
БЕЛУДЖИ	76
*Бензовиндифлупир + пропиконазол	16
*Бензойная кислота	15
*Биксафен + протиоконазол	16
*Биксафен + протиоконазол + тебуконазол	17
*Биксафен + тебуконазол	17
БН-003	47
БОЛИВАР ФОРТЕ	59
БОМБЕР	63
*Боскалид + дифеноконазол	17
БРАВО	76
БРАМБИ	55
БРОАДЕР	21
БУКАТ 500	56

В

ВЕРБЕН	47
ВИНТАГА	76
ВИНТАЖ	22
ВИСТ-Супер	17
ВИТАЗОЛ ЭКСТРА	47

Г

ГЕКАТА	22
ГЕОКС	66
ГРАНУФЛО	64
ГРЕННИ	18
ГРИТОЛЬ ЭКСТРА	40
ГРЭММИ	76

Д

ДАКСУР	30
ДАРИУС	27
ДАФНА 250	19
ДЕЛАН	19
ДЕЛАН ФЛО	19
ДЕЛАРО ИВЛОН	23
<i>*Дидецилдиметиламмоний бромид</i>	<i>17</i>
ДИККАРТ	25
<i>*Диметоморф + манкоцеб</i>	<i>17</i>
<i>*Димоксистробин + боскалид</i>	<i>18</i>
ДИТАН НЕО ТЕК 75	26
<i>*Дитианон</i>	<i>18</i>
<i>*Дифенокназол</i>	<i>19</i>
<i>*Дифенокназол + изопиразам</i>	<i>21</i>
<i>*Дифенокназол + метконазол</i>	<i>21</i>
<i>*Дифенокназол + паклобутразол</i>	<i>21</i>
<i>*Дифенокназол + пропиконазол</i>	<i>21</i>
<i>*Дифенокназол + протиокназол</i>	<i>22</i>
<i>*Дифенокназол + тебуконазол + пираклостробин</i>	<i>59</i>
<i>*Дифенокназол + тетраконаз</i>	<i>22</i>
<i>*Дифенокназол + тирам</i>	<i>22</i>
<i>*Дифенокназол + флутриафол</i>	<i>22</i>
<i>*Дифенокназол + цифлufenамид</i>	<i>22</i>
ДИФФЕРЕНТ	19
ДОГОДА	58
ДОГОДА ПРО	48
<i>*Додин</i>	<i>23</i>

З

ЗАМИР	54
ЗАНТАРА	17
ЗАРНИЦА	14
ЗАТО	64
ЗАТО ПЛЮС	64
ЗИМ 500	23
ЗОРВЕК ЭНКАНТИЯ	64
ЗУММЕР	66

И

<i>*Изофлуципрам + протиокназол + трифлуксистробин</i>	<i>23</i>
ИМПАКТ	72
ИМПАКТ СУПЕР	74
ИМПАКТ ЭКСКЛЮЗИВ	73
ИНДИГО	56
ИНПУТ ТРИО	56
ИНСАЙД	66
ИНСИГНИЯ	67
ИНТРАДА	9
ИНФИНИТО	68
ИППОН	38

К

КАГАТНИК	15
КАЛЬДЕРА	19
КАМБАЛИО СМАРТ	69
КАНТИК	65
КАНТУС ТОП	29
КАПАЛО	83
КАПЕЛЛА	44
*Каптан	23
КАПТАН	23
КАРАМБА	28
КАРБЕНАЗОЛ	25
КАРБЕНАЗОЛ НЕО	63
*Карбендазим	23
*Карбендазим + азоксистробин	24
*Карбендазим + ципроконазол	25
КАРИАЛ ФЛЕКС	77
КВАДРИС	9
КВИНТА	35
КЕЙРА	30
КЛЕЙМОР	67
КОАЛИЦИЯ	55
КОЛОСАЛЬ	57
КОЛОСАЛЬ Про	41
КОНСЕНТО ТОП	65
КРЕДО	24
*Крезоксим-метил	25
*Крезоксим-метил + пириметанил	25
*Крезоксим-метил + эпоксиконазол + дифеноконазол	25
КРЕСТРАЖ	48
КУМИР	56
КУПРОКСАТ	56
КУСТОДИЯ	10

Л

ЛАНЦЕЯ	46
ЛАЭРТ	45
ЛИБЕРТОДОР	76
ЛИНДЕР ТОП	65
ЛУНА ТРАНКВИЛИТИ	69
ЛУНА ЭКСПИРИЕНС	70

М

МАГАНИК	22
МАГНЕЛЛИО	58
*Мандипропамид	26
*Мандипропамид + дифеноконазол	26
*Мандипропамид + оксатиапипролин	26
*Манкоцеб	26
*Манкоцеб + металаксил	27
МАРАКАС	81
МЕДЕЯ	22
МЕРПАН	23
МЕТАКСИЛ	27
*Металаксил М + манкоцеб	27
*Металаксил-М + флуазилам	27
МЕТАМИЛ МЦ	27
МЕТЗОЛ	28
*Метирам	27
*Метконазол	28
*Метрафенон	29
*Мефеноксам + манкоцеб	29
*Мефентрифлуконазол	29
*Мефентрифлуконазол + боскалид	29
*Мефентрифлуконазол + крезоксим-метил	29
*Мефентрифлуконазол + протиоконазол	30
*Мефентрифлуконазол + фенпропиморф	30
МИРАВИС	31

МИРАВИС ГОЛД	32
МИРАВИС ПРАЙМ	32
МИРАВИС ЭЙС	32
МИСТЕРИЯ	59
МОЛЛИС 450	10

Н

НАВУРА	30
НАНДО 500	66
НОРТОН ПРО	49

О

ОПТИМО ДУО	34
ОРВЕГО	15
ОРДАН	77
ОРОНДИС УЛЬТРА	26
ОСИРИС	80
ОСКАР	60

П

*Пенконазол	30
ПЕРЕГРИН	53
*Пидифлуметофен	31
*Пидифлуметофен + азоксистробин + дифеноконазол	32
*Пидифлуметофен + пропиконазол	32
*Пидифлуметофен + флудиоксонил	32
*Пикоксистробин + ципроконазол	33
ПИКТОР	18
ПИКТОР АКТИВ	33
ПИЛАРВИВА	46
ПИЛАРЗОРРО	50
ПИЛАРКАДИС	54
ПИЛАРЛУНА	69
*Пиракlostробин + боскалид	33
*Пиракlostробин + мефентрифлуконазол	34
*Пиракlostробин + пропиконазол + флуксapiроксад	35
*Пиракlostробин + ципроконазол	35
*Пиракlostробин + метконазол	34
*Пиракlostробин + флуксapiроксад	35
*Пириметанил	36
ПИРУС	36
ПИРУЭТ	76
ПЛАНТЕНОЛ Нео	77
*Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	36
ПОЛИДОК	27
ПОЛИРАМ ДФ	28
*Полисульфиды натрия	36
ПОНЕЗИМ	24
ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ	37
ПРЕГАРД	66
Препарат фунгицидно-акарицидный «ПСК 25% водный раствор»	36
ПРИАКСОР МАКС	35
ПРИАЛИН	36
ПРИАМ	77
ПРИЗМА 250 КЭ	39
ПРИРАСТАР ПЛЮС	81
ПРОЗАРО	50
ПРОКСАНИЛ	39
ПРОМЕКС	55
*Пропамокарб + фосэтил	36
*Пропамокарб-гидрохлорид	37
*Пропамокарб-гидрохлорид + цимоксанил	38
*Пропиконазол	39
*Пропиконазол + ципроконазол	44
*Пропиконазол + прохлораз	40
*Пропиконазол + тебуконазол	41
*Пропиконазол + тебуконазол + эпоксиконазол	43
*Пропиконазол + флутриафол + дифеноконазол	44
16.10.2026	4

*Пропиконазол+азоксистробин	40
*Пропинеб	46
ПРОПИШАНС УНИВЕРСАЛ	42
ПРОПУЛЬС	69
ПРОТАЗОКС	13
ПРОТИО ПРО	13
*Протиоконазол + паклобутразол.....	46
*Протиоконазол + пикоксистробин.....	46
*Протиоконазол + пираклостробин.....	46
*Протиоконазол + проквиназид	47
*Протиоконазол + тебуконазол	47
*Протиоконазол + тебуконазол + спироksamин	53
*Протиоконазол + флуксапироксад.....	54
ПРОФЕССОР МИКС	54
*Прохлораз + тебуконазол	54
*Прохлораз марганца	55

Р

РАЁК	19
РАКУРС	79
РЕВИОНА	29
РЕВИСТАР ТОП	67
РЕВУС	26
РЕВУС ТОП	26
РЕКС ДУО	81
РЕКС ПЛЮС	82
РЕКС ТРИО	68
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ	29
РОБУСТ	46
РОНИЛАН	10

С

СВИТЧ	67
*Сера	55
*Сера + тебуконазол	55
СЕРА 400	55
СЕРКАДИС	67
СЕРКАДИС ПЛЮС	67
СЕТАР	21
СИЗАРО	51
СИЛЛИТ	23
СИЛТРА ХПРО	16
СИЛЬВЗОЛ	57
СИНЕКУРА	27
СИНТРОН	47
СКАЙВЭЙ ХПРО	17
СКАЙСТАР	12
СКОР	20
СОЛИГОР	53
СПАЙК	38
СПИРИТ	14
*Спироksamин + протиоконазол + проквиназид	56
*Спироksamин + тебуконазол + азоксистробин	55
*Спироksamин + тебуконазол + триадеминол	54
СТРАЙК	72
СТРАЙК ФОРТЕ	74
СТРИМ	51
СТРОБИ	25
СТРОБИШАНС ПРО	12
*Сульфат меди	56

Т

ТАЛИУС	36
ТАНОС	64
ТАНОШАНС	65
ТЕБАЗ ПРО	10
*Тебуконазол	56
*Тебуконазол + дифеноконазол	58
16.10.2026	5

*Тебуконазол + крезоксим-метил	59
*Тебуконазол + метконазол	59
*Тебуконазол + пираклостробин	60
*Тебуконазол + пираклостробин + протиоконазол	60
*Тебуконазол + пропиконазол + ципроконазол	61
*Тебуконазол + триадименол + спирокамин	61
*Тебуконазол + триадимефон	62
*Тебуконазол + ципроконазол	62
ТЕБУМЕТ	21
ТЕЗИС	57
ТЕРАПЕВТ ПРО	25
*Тиабендазол + циперметрин	63
ТИЛМОР	52
ТИЛТ ТУРБО	65
ТИОМЕКС	63
*Тиофанат-метил	63
*Тиофанат-метил + флутриафол	63
*Тиофанат-метил + ципроконазол	63
ТИРАДА	22
*Тирам	64
ТИТАНИУМ 250 ВЭ	58
ТИТУЛ 390	39
ТИТУЛ ДУО	42
ТИТУЛ ТРИО	61
ТОПАЗ	30
ТОПАЗИО	55
ТОПСИН М	63
ТРАЙДЕКС (ПЕННКОЦЕБ)	26
ТРИАДА	43
*Трифлуксистробин	64
*Трифлуксистробин + каптан	64

У

УЛИС	65
------------	----

Ф

ФАЛЬКОН	61
*Фамоксадон + оксатиапинолин	64
*Фамоксадон + цимоксанил	64
ФАРГО	62
*Фенамидон + пропамокарб гидрохлорида	65
*Фенпропидин + пропиконазол	65
*Фенпропидин + прохлораз + тебуконазол	65
*Фенпропидин + эпоксиконазол	65
ФЕРАЗИМ	24
ФЕЯ	52
ФИТОЦЕБ	27
ФЛАНОБИН	11
ФЛЕКСИТИ	29
ФЛИНТ	79
ФЛОСУЛ	55
*Флуазинам	66
*Флуазинам + диметоморф	66
*Флудиоксонил	66
*Флудиоксонил + ципродинил	67
*Флуксапироксад	67
*Флуксапироксад + мефентрифлуконазол + пираклостробин	68
*Флуксапироксад + дифеноконазол	67
*Флуксапироксад + мефентрифлуконазол	67
*Флуоксастробин + тебуконазол	68
*Флуониколит + пропамокарб-гидрохлорид	68
*Флуониколит + флуоксапинолин	69
*Флуопирам + пираклостробин	69
*Флуопирам + пириметанил	69
*Флуопирам + протиоконазол	69
*Флуопирам + тебуконазол	70
*Флутриафол	70
*Флутриафол + карбендазим	73

*Флутриафол + тебуконазол	73
ФОРМАТ ЭКСТРА	63

Х

ХАРВИГА	35
*Хлорат натрия	75
*Хлорокись меди	75
*Хлороталонил	76
*Хлороталонил + боскалид	76
*Хлороталонил + пираклостробин	76
ХОРУС	77

Ц

*Циазофамид	76
ЦИДЕЛИ ТОП 140	23
*Цимоксанил + мандипропамид	76
*Цимоксанил + хлорокись меди	77
*Ципродинил	77
*Ципроконазол + пропиконазол	77
*Ципроконазол + пропиконазол + бензовиндифлупир	78
*Ципроконазол + эпоксиконазол	79

Ч

ЧУГУР	12
-------------	----

Ш

ШИРЛАН	66
ШИРМА	66

Э

ЭВИТО Т	68
ЭВКЛИД	9
ЭЙС	60
ЭКВИНОКС	17
ЭЛАТУС РИА	78
ЭЛАТУС ЭЙС	16
ЭМБРЕЛИЯ ЭКСТРА	21
*Эпоксиконазол + метконазол	80
*Эпоксиконазол + пираклостробин	80
*Эпоксиконазол + прохлораз	81
*Эпоксиконазол + тиофанат-метил	81
*Эпоксиконазол + фенпропиморф	82
*Эпоксиконазол + фенпропиморф+ метрафенон	83
ЭПСИЛОН	21
ЭФФИКУР	27
ЭХИОН	39

Примечание: * - действующее вещество средства защиты растений

ФУНГИЦИДЫ

Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель	Норма расхода препарата, л/га, кг/га	Культура, обрабатываемые объекты	Заболевание	Способ, время обработки, ограничения	Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)	Кратность обработок
Азоксистробин						
ИНТРАДА , СК (азоксистробин, 250 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	1	Пионы, лилии, ирисы	Серая гниль, бурая пятнистость, гетероспориоз, фузариоз, ржавчина	То же		3
КВАДРИС , СК (азоксистробин, 250 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,6	Картофель	Альтернариоз, фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,8	Капуста белокочанная	Альтернариоз, пероноспороз	То же	30	1
	0,8	Морковь столовая	Бурая пятнистость листьев	То же	30	1
Азоксистробин + боскалид						
АНОРКА , ВДГ (боскалид, 350 г/кг + азоксистробин, 250 г/кг), ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А. Нидерланды (Р), (П-З)	0,15-0,25	Рапс озимый	Склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,15-0,2	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса	То же	20	1
	0,5-0,6	Морковь столовая	Бурая пятнистость листьев	То же	10	2
	0,5-0,6	Голубика высокорослая	Серая гниль, антракноз	То же	3	1
ЭВКЛИД , СК (азоксистробин, 250 г/л + боскалид, 150 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,6	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,4-0,6		То же	То же	30	2
	0,4-0,6	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
	0,4	Горох посевной	Аскохитоз	То же	31	1
	0,4	Бобы кормовые	Шоколадная пятнистость	То же	30	2
	0,4-0,5	Сурепица озимая	Альтернариоз	То же	30	1
	0,4-0,5	Соя	Аскохитоз, пероноспороз	То же	27	1
	0,4	Люпин белый	Бурая пятнистость, серая гниль, фузариоз	То же	31	1-2
	0,4-0,5	Подсолнечник	Альтернариоз, серая и белая гниль	То же	32	1
	0,3	Картофель	Альтернариоз	То же	21	1-2
Азоксистробин + дифеноконазол						
АМИСТАР ГОЛД , СК (азоксистробин, 125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л),	0,6-1	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	69	1
	0,6-1	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	65	1
	0,6-1	Свекла сахарная и кормовая	Церкоспороз	То же	35	1-2

Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,5	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз, пасмо	То же	60	1
	0,8-1	Подсолнечник	Альтернариоз, белая и серая гниль, ржавчина	То же	50	1
	0,6-0,8	Сурепица озимая	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	42	1
	0,6-0,8	Соя	Церкоспороз, альтернариоз	То же	35	1
	0,8		Мучнистая роса			
РОНИЛАН, КС (азоксистробин, 150 г/л + дифеноконазол, 125 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,6-1	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	39	1-2
	0,6-1	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	39	1
	1-1,3	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	То же	25	3
Азоксистробин + дифеноконазол + тебуконазол						
МОЛЛИС 450, КС (азоксистробин, 200 г/л + дифеноконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), ООО ИННВИГО, Польша (Р), (П-З)	0,9-1	Пшеница озимая	Септориоз и фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	31	1
	0,9-1	Тритикале озимая	Септориоз колоса	То же	31	1
	0,9-1	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, гельминтоспоризм и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,8-1	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
	0,6-1	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	20	2
Азоксистробин + тебуконазол						
КУСТОДИЯ, КС (азоксистробин, 120 г/л + тебуконазол, 200 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	0,75-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,75-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспоризм	То же	30	1
	0,75-1	Пшеница яровая	Септориоз листьев, пиренофороз	То же	30	1
	0,75-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	1-1,2	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1-2
	1-1,2	Рапс яровой	То же	То же	30	1
	1-1,2	Кукуруза	Пузырчатая головня	То же	63	1
	1-1,2	Свекла сахарная и кормовая	Церкоспороз	То же	30	1
	1-1,2	Подсолнечник масличный	Альтернариоз, серая и белая гниль	То же	34	1
ТЕБАЗ ПРО, СК (азоксистробин, 200 г/л + тебуконазол, 250 г/л), ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-З)	0,5-0,75	Пшеница озимая	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,4-0,6	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	30	1
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5-0,75	Рапс озимый	Склеротиниоз, альтернариоз	То же	30	1
	0,25-0,3	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз, пасмо	То же	30	2

<i>Азоксистробин + флуазинам</i>						
ФЛАНОБИН, КС (азоксистробин, 200 г/л + флуазинам, 250 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,75	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	3
<i>Азоксистробин + ципроконазол</i>						
АВАТАР 280 КС (азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), INTERNACIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V., Мексика (Р), (П-З)	0,5-0,75	Пшеница ози- мая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,5-0,75	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса, септориоз, ринхос- пориоз, фузариоз ко- лоса	То же	20	1
	0,5-0,75	Пшеница яро- вая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	20	1
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость, темно-бурая пятнистость, рин- хоспориоз, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	20	1
	0,75-1	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	44	1
	1	То же	Склеротиниоз	То же		
	0,75-1	Рапс яровой	Альтернариоз, скле- ротиниоз	То же	44	1
	0,6	Свекла сахар- ная	Церкоспороз	То же	80	1
	0,5	Лен-долгунец (технические цели)	Антракноз, фузариоз	То же	30	1
	0,5-0,75	Пшеница ози- мая	Мучнистая роса, септориоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	56	1
АМИСТАР ЭКСТРА, СК (азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,5-0,75	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	56	
	0,5-0,75	Ячмень озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сет- чатая пятнистость, фузариоз и гельмин- тоспориоз колоса	То же	39	1
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	39	1
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Мучнистая роса	То же	39	1
	0,5-0,75	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз початков	То же	74	1
	0,75-1	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз	То же	50	1
	1	Рапс озимый	Склеротиниоз	То же		
	0,6	Свекла сахар- ная	Церкоспороз	То же	49	1
	0,5	Лен-долгунец	Антракноз, фуза- риоз, пасмо	То же	66	1
	1	Люпин узко- листный	Антракноз, бурая пятнистость, серая гниль, фузариоз	То же	54	1

	0,75	Подсолнечник	Склеротиниоз, пероноспороз, альтернариоз, ржавчина	То же	55	1
	20 мл/м ²	Сосна	Инфекционное поражение всходов и сеянцев	Полив почвы в очагах поражения 0,2% рабочей жидкостью при появлении первых признаков болезни. Расход жидкости 10 л/м ²		1
	0,5	Луковичные цветочные культуры	Серая гниль, фузариоз	Опрыскивание растений в период вегетации 0,2%-й рабочей жидкостью: 1-я обработка – в фазу отрастания, последующие с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости 250 л/га		4-5
АМИСТАР ЭКСТРА ГОЛД, МД (азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,5-0,75	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5-0,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
СКАЙСТАР, КС (азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,5-0,75	Пшеница озимая	Септориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	50	1
	0,5-0,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз и фузариоз колоса	То же	50	1
	0,5-0,75	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	50	1
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз колоса	То же	59	1
СТРОБИШАНС ПРО, СК (азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,5-0,75	Пшеница озимая	Септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	45	1
	0,5-0,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	45	1
	0,5-0,75	Ячмень озимый	Ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, септориоз листьев, мучнистая роса	То же	45	1
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	То же	51	1
	0,75-1	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	53	1
	0,75-1	Рапс яровой	То же	То же	50	1
	0,5-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	41	1
	0,45-0,5	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз, пасмо	То же	52	1
	0,75	Подсолнечник	Альтернариоз, белая и серая гниль	То же	71	1
ЧУГУР, СК	0,5-0,75	Пшеница озимая	Септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	42	1

(азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	0,5-0,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз колоса	То же	42	1
	0,5-0,75	Ячмень озимый	Ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, септориоз листьев, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	42	1
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	0,5-0,75	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,75-1	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	74	1
	1		Склеротиниоз			
	0,75-1	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	30	1
	0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	То же	30	1
	0,5-0,75	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз	То же	60	1
	0,75	Подсолнечник	Альтернариоз, белая и серая гниль, ржавчина	То же	48	1
Азоксистробин + протиоконазол						
ПРОТИО ПРО, КС (азоксистробин, 160 г/л + протиоконазол, 200 г/л), ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	0,3-0,45	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,45-0,6		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,3-0,45	Ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	То же	30	1
Азоксистробин + протиоконазол + дифеноконазол						
ПРОТАЗОКС, КС (азоксистробин, 200 г/л + протиоконазол, 125 г/л + дифеноконазол, 60 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	0,75-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	51	1
	0,75-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз и фузариоз колоса	То же	51	1
	0,75-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	51	1
	0,75-1	Рапс озимый (не более 1 л/га)	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	65	1
	0,5		То же	То же	65	2
Азоксистробин + ципроконазол + пропиконазол						
АМИСТАР ТРИО, КЭ (азоксистробин, 100 г/л + ципроконазол, 30 г/л + пропиконазол, 125 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	40	1
	0,8-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1

(Р), (П-З)	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	40	1
	0,8-1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	40	1
	0,8-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, фузариоз, альтернариоз колоса и гельминтоспориоз колоса	То же	30	2
Азоксистробин + эпоксиконазол						
ЗАРНИЦА, КС (азоксистробин, 200 г/л + эпоксиконазол, 187,5 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,5-0,75	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5-0,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса	То же	30	1
	0,75-1	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
	0,75-1	Подсолнечник	Альтернариоз, серая гниль, белая гниль	То же	68	1
СПИРИТ, СК (азоксистробин, 240 г/л + эпоксиконазол, 160 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,5-0,7	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,5-0,7	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	20	1
	0,5-0,7	Ячмень озимый	Мучнистая роса	То же	20	1
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	20	1
	0,5-0,7	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	20	1
	0,75-1	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
	0,8	Лук репчатый всех генераций (кроме лука на перо)	Пероноспороз	То же	39	2
	0,4-0,6	Лен-долгунец	Антракноз, пасмо	То же	69	1
	0,5	Хвойные	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание растений в питомниках и молодняках 0,1% рабочей жидкостью		4

	0,5	Лиственные	Мучнистая роса, пятнистости листьев	То же		3
	0,5	Роза открытого грунта	То же	Опрыскивание растений 0,1 % рабочей жидкостью		3
	0,5	Флокс	То же	То же		3
Аметоктрадин + диметоморф						
ОРВЕГО, КС (аметоктрадин, 300 г/л + диметоморф, 225 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-З)	0,8	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	7	3
	0,8	Лук репчатый	Пероноспороз	То же	17	3
	0,8	Огурец открытого грунта	То же	То же	5	3
Аммоний-медь-фосфат /АМФ/						
АЗОФОС, 50% к.с. (аммоний-медь-фосфат /АМФ/), РУП «Институт защиты растений», Беларусь (П-З)	6-7	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	20	3
	5	Голубика высокорослая	Рак стеблей, фомопсисное увядание ветвей	То же	74	2
	10	Яблоня	Парша	То же	20	2
	10	Груша	Парша, бактериоз	Опрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором	20	2
	5-7	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость, черная бактериальная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1500-2000 л/га	5	3
	4	Виноград	Милдью, антракноз, оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации 1% рабочим раствором	55	4
	4	Клюква крупноплодная	Монилиальный ожог, сухoverшинность побегов, годрония, гибберовая пятнистость, гнили ягод	То же	70	1
АЗОФОС, 65% пс. (аммоний-медь-фосфат /АМФ/), РУП «Институт защиты растений», Беларусь (П-З)	10	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	4-6	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз	То же	8	3
Бензойная кислота						
КАГАТНИК, ВРК (бензойная кислота (в виде триэтаноламинной соли), 300 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (П-З)	0,05-0,06	Свекла сахарная	Кагатная гниль	Опрыскивание корнеплодов во время закладки на хранение		1
	2	То же	Возбудители кагатной гнили при хранении корнеплодов	Опрыскивание в период вегетации за 2-4 недели до уборки корнеплодов. Расход рабочей жидкости – 300 л/га		1
	0,25-0,4	Картофель	Сухая фузариозная гниль, серебристая парша	Обработка семенных клубней перед закладкой на хранение		1
	0,8	Лук репчатый (севек)	Гнили луковок в период вегетации	Обработка перед посадкой		1

	0,25-0,4	Лук репчатый	Гнили луковок в период хранения	Обработка луковок перед закладкой на хранение		1
	0,8	Чеснок озимый	Гнили луковок в период вегетации	Обработка зубков перед посадкой		1
	0,5	Гладиолус, георгина, лилия	Фузариозная гниль	Обработка посадочного материала весной		1
	0,5	Ирис	Мягкая бактериальная гниль	То же		1
	0,4	Гладиолус, тюльпан	Фузариозная, пенициллезная гнили в период хранения	Обработка посадочного материала перед закладкой на хранение		1
	0,4	Георгина	Фузариозная гниль в период хранения	То же		1
	0,4	Нарцисс	Гнили в период хранения (фузариозная, пенициллезная)	То же		1
Бензовиндифлупир + пропиконазол						
ЭЛАТУС ЭЙС, КЭ (бензовиндифлупир, 40 г/л + пропиконазол, 250 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,5	Пшеница озимая	Септориоз листьев, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	35	1
	0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	То же	35	1
	0,5	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина, мучнистая роса	То же	35	1
	0,5	Пшеница яровая	Мучнистая роса, пиренофороз, септориоз листьев	То же	35	1
	0,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	35	1
Биксафен + протиоконазол						
СИЛТРА ХПРО, КЭ (биксафен, 60 г/л + протиоконазол, 200 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	0,8	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	0,7-0,8	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	30	1
	0,7-0,8	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		
	0,4-0,5	Рапс озимый	Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания	30	1
	0,6-0,8	То же	Альтернариоз, склеротиниоз	То же		
	0,6-0,8	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса	То же	30	1

	0,6-0,8	Соя	Церкоспороз, аскохитоз	То же	30	1
Биксафен + протиоконазол + тебуконазол						
СКАЙВЭЙ XPRO, КЭ (биксафен, 75 г/л + протиоконазол, 100 г/л + тебуконазол, 100 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,8-1,25	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	41	1
	0,8-1,25	Тритикале озимая	Фузариоз колоса	То же	41	1
	0,8-1	Ячмень озимый	Гельминтоспориоз колоса	То же	41	1
	0,8-1,25	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, фузариоз колоса	То же	42	1
	1-1,25		Септориоз колоса	То же		
	0,7-0,8	Ячмень яровой	Фузариоз колоса	То же	42	1
	0,8-1	Рапс озимый	Склеротиниоз	То же	30	1
	0,8-1	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	30	1
	0,7-0,8	Горох посевной	Аскохитоз	То же	30	1
Биксафен + тебуконазол						
ЗАНТАРА, КЭ (биксафен, 50 г/л + тебуконазол, 166 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,8-1	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	57	1
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз листьев, бурая ржавчина	То же	57	1
	0,8-1	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	57	1
	0,4-0,6	Картофель	Альтернариоз	То же	29	2
	0,4-0,6	Капуста белокочанная	То же	То же	28	2
Боскалид + дифеноконазол						
АРФА, КС (боскалид, 250 г/л + дифеноконазол, 50 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,4-0,5	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации	41	2
	0,5	То же	Склеротиниоз			
	0,4-0,5	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	41	1
	1	Яблоня	Парша, мучнистая роса	То же	30	4
	0,8-1	Голубика высококорослая	Антракноз, пятнистости листьев	То же	50	2
ЭКВИНОКС, КС (боскалид, 250 г/л + дифеноконазол, 150 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации	61	1-2
	0,6-0,8	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз, фомоз	То же	61	1-2
	0,6-0,8	Яблоня	Парша, пятнистости листьев, мучнистая роса, монилиоз	То же	20	3
Дидецилдиметиламмоний бромид						
ВИСТ-Супер, шашки насыпные (дидецилдиметиламмоний бромид, 16 г/кг), ООО «Фумигант-плюс», Россия	15 г/т	Картофель (семенной)	Ризоктониоз, серебристая парша, сухая фузариозная гниль	Фумигация складских помещений после загрузки клубней на хранение		1
Диметоморф + манкоцеб						

АКРОБАТ МЦ, ВДГ (диметоморф, 90 г/кг + манкоцеб, 600 г/кг), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,5% суспензией препарата. Первая обработка профилактическая – по прогнозу, последующие - с интервалом 10-14 дней	65	3
	1,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз	То же	20	3
	2	Томат защищенного грунта	То же	Опрыскивание в период вегетации 0,2% рабочим раствором: первая обработка – при первых признаках появления болезни; последующие – с интервалом 10-14 дней	3-5	3
	2	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – профилактическая, последующие – при появлении первых признаков болезни с интервалом 10-14 дней	28	3
	2	Клюква крупноплодная	Годрония, гибберовая пятнистость листьев, монилиальный ожог, твердая, концевая и липкая гнили плодов, суховершинность побегов	Опрыскивание в период вегетации в системе защиты посадок	74	4
Димоксистробин + боскалид						
ПИКТОР, КС (димоксистробин, 200 г/л + боскалид, 200 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-З)	0,4-0,5	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации, в т.ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 л/га	35	1
	0,5	Рапс озимый	Серая гниль	Опрыскивание в период вегетации		
	0,4-0,5	Подсолнечник	Склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации, в т.ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 л/га	38	1
	0,5	То же	Пероноспороз, альтернариоз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации		
Дитианон						
ГРЕННИ, КС (дитианон, 350 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	1-1,4	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	20	6

ДЕЛАН, ВГ (дитианон, 700 г/кг), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,5-0,7	Яблоня, груша	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации. Расход рабочей жидкости 1500 л/га	20	6
	0,5-0,7	Клюква крупно- плодная	Монилиоз, плодовые гнили, фомопсис	Опрыскивание в пе- риод вегетации	70	6
	0,7	Слива	Клястероспориоз, монилиоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации в си- стеме защиты сада: 1-е – в конце цветения; 2-е – в период роста плодов	39	2
ДЕЛАН ФЛО, КС (дитианон, 500 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,5-0,7	Яблоня	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	6
	0,5-0,7	Голубика высо- корослая	Антракноз, серая гниль, фомопсисное увядание стеблей, рак стеблей	То же	20	3
ДИФФЕРЕНТ, СЭ (дитианон, 350 г/л), ООО Группа Компаний «Землякофф», Россия (Р), (П-З)	1-1,5	Яблоня	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации	14	6
КАЛЬДЕРА, ВДГ (дитианон, 700 г/кг), ГЛОБАКЕМ НВ, Бель- гия (Р), (П-З)	0,5-0,7	Яблоня	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	6
Дифеноконазол						
ДАФНА 250, КЭ (дифеноконазол, 250 г/л), ООО ИННВИГО, Польша (Р), (П-З)	0,4-0,6	Пшеница ози- мая	Септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,4-0,5	Рапс озимый	Альтернариоз, фо- моз, росторегулиру- ющее действие, улучшающее перези- мовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 ли- стьев культуры	80	1-2
	0,4-0,5	То же	Росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образо- вания и развития бо- ковых побегов)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания		
	0,4	Свекла сахар- ная	Церкоспороз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	48	2
	0,2-0,3	Яблоня	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	3
	0,3	То же	Мучнистая роса	То же		
РАЁК, КЭ (дифеноконазол, 250 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,4	Свекла сахар- ная	Церкоспороз, мучни- стая роса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1-2
	0,15-0,2	Яблоня	Парша, мучнистая роса	То же	20	4
	0,15-0,2	Вишня	Коккомикоз, мони- лиальный ожог	То же	30	4
	0,2	Голубика высокорослая	Фомопсисное увяда- ние ветвей, рак стеб- лей	То же	20	2

	0,2	Клюква крупноплодная	Монилиальный ожог, суховершинность побегов, годрония, гиббера, филлостиктоз, гнили плодов	То же	30	4
	0,5	Лиственные	Мучнистая роса и пятнистости листьев	Опрыскивание листовых пород в питомниках и молодняках 0,1% рабочей жидкостью	-	2-3
	0,35	То же	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание с использованием БЛА сеянцев и саженцев в питомниках 1,75% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости - 20 л/га		2
	0,5	Хвойные	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации сеянцев и саженцев в питомниках молодняках 0,1% рабочей жидкостью	-	2-4
	0,35	То же	То же	Опрыскивание в период вегетации с использованием БЛА 1,75% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 20 л/га		6
	0,5	Лиственные лесные культуры	Инфекционный некроз ветвей	Опрыскивание растений 0,1% рабочей жидкостью	-	3
СКОР, КЭ (дифеноконазол, 250 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,4	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,2	Капуста белокочанная	Альтернариоз	То же	20	2
	0,15-0,2	Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации 0,015-0,02% рабочей жидкостью	20	4
	0,2	То же	Плодовая гниль	Опрыскивание культуры после цветения		
	0,2	Вишня	Коккомикоз, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации	30	4
	0,2	Груша	Парша, филлостиктоз, септориоз, плодовая гниль	То же	55	4
	0,2	Слива	Клястероспориоз, монилиоз	То же	60	4
	0,2	Голубика высокорослая	Рак стеблей, фомопсисное увядание ветвей	То же	35	2
	0,2	Клюква крупноплодная	Гиббера, монилиоз, фомопсис	Опрыскивание в период вегетации 0,02% рабочей жидкостью	20	4
	0,2	Смородина, крыжовник	Антракноз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – в период бутонизации; второе – сразу после цветения	70	2

	0,2	Липа	Черно-бурая пятнистость листьев	Опрыскивание растений в питомниках в период вегетации 0,02% рабочей жидкостью		3
	0,2	Каштан	Бурая пятнистость листьев	То же		3
	0,2	Клен	Черная пятнистость листьев	То же		3
ЭПСИЛОН, КЭ (дифеноконазол, 250 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,15-0,2	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	20	3-4
	0,2	То же	Плодовая гниль	То же		
<i>Дифеноконазол + изопиразам</i>						
ЭМБРЕЛИЯ ЭКСТРА, СК (дифеноконазол, 40 г/л + изопиразам, 100 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1,25-1,5	Яблоня	Парша, мучнистая роса, пятнистости листьев, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации	40	3
<i>Дифеноконазол + метконазол</i>						
ТЕБУМЕТ, КС (дифеноконазол, 100 г/л + метконазол, 50 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	28	1
	0,8-1	То же	Альтернариоз, фомоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры (снижение высоты растений и точки роста, увеличение диаметра корневой шейки)	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 листьев культуры		
<i>Дифеноконазол + паклобутразол</i>						
СЕТАР, СК (дифеноконазол, 250 г/л + паклобутразол, 125 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,3-0,5	Рапс озимый	Альтернариоз, корневая гниль, фомоз, росторегулирующее действие: улучшение перезимовки культуры, снижение высоты растений и образование большего количества боковых побегов	Опрыскивание осенью в фазу 4-х настоящих листьев культуры	79	1
	0,5	То же	Альтернариоз, корневая гниль, фомоз, росторегулирующее действие: снижение высоты растений и образование большего количества боковых побегов	Опрыскивание весной в фазу роста стебля культуры		1
		0,3-0,5	Рапс яровой	Фомоз, росторегулирующее действие	Опрыскивание в период вегетации	30
<i>Дифеноконазол + пропиконазол</i>						
БРОАДЕР, КЭ (дифеноконазол, 150 г/л + пропиконазол, 150 г/л),	0,4-0,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		

Агробест Груп Тарым Илачлары Тохумджулук Ималат Итхалат Ихраджат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети, Турция (Р), (П-3)	0,4-0,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,5	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		
	0,3	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	То же	19	1-2
Дифеноконазол + протиоконазол						
МАГАНИК, КЭ (дифеноконазол, 125 г/л + протиоконазол, 175 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8-1		Фузариоз и септориоз колоса			
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	49	1
	0,8-1	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	30	1
	0,6-1	То же	Склеротиниоз	То же		
	0,8-1	То же	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание осенью в фазу 4-5 листьев культуры		
Дифеноконазол + тетраконазол						
ГЕКАТА, КМЭ (дифеноконазол, 120 г/л + тетраконазол, 60 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,7	Яблоня	Парша листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	3
	0,7	То же	Парша, филлостиктоз			
	0,4-0,7	Смородина черная	Антракноз, септориоз	То же	30	2
Дифеноконазол + тирам						
ТИРАДА, СК (тирам, 400 г/л + дифеноконазол, 30 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	3	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	30	3
	1,5-2,5	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз	То же	30	4
	1,5-2,5	Груша	Ржавчина, парша	То же	30	4
Дифеноконазол + флутриафол						
ВИНТАЖ, МЭ (дифеноконазол, 65 г/л + флутриафол, 25 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная и кормовая	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	1-1,2	Рапс озимый	Фомоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-5 настоящих листьев культуры	30	1
	0,8-1	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз, пасмо	Опрыскивание в период вегетации	46	2
	1	Горох	Аскохитоз, мучнистая роса, серая гниль, фузариоз	То же	30	1
МЕДЕЯ, МЭ (дифеноконазол, 50 г/л + флутриафол, 30 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Яблоня	Парша, мучнистая роса, монилиоз, филлостиктоз	Опрыскивание в период вегетации	30	4
	1,2	Хвойные	Снежное и обыкновенное шютте, фомоз, кладоспориоз	Опрыскивание 0,24% рабочей жидкостью		4
	1,5	Лиственные	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание 0,3% рабочей жидкостью		3
	1,2	Сосна	Дотистромоз, склеродерриоз	Опрыскивание 0,24% рабочей жидкостью		4
Дифеноконазол + цифлутенамид						

ЦИДЕЛИ ТОП 140, ДК (дифеноконазол, 125 г/л + цифлутенамид, 15 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,8-1	Морковь столовая	Бурая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га	10	2
	0,8-1	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса, аскохитоз	Опрыскивание растений 0,08-0,1% рабочей жидкостью при появлении первых признаков болезни и повторно через 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	3	2
	0,5-0,7	Яблоня	Мучнистая роса, парша, плодовая гниль, филлостиктоз	Опрыскивание в период вегетации	14	2
Додин						
СИЛЛИТ, КС (додин, 400 г/л), Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СРЛ, Бельгия (Р), (П-З)	1,7-2	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	20	3
	2	Слива	Клястероспориоз	То же	40	3
	2	Вишня	Монилиальный ожог, коккомикоз	То же	26	4
Изофлуципир + протиоконазол + трифлуксиксиробин						
ДЕЛАРО ИВЛОН, КС (изофлуципир, 68 г/л + протиоконазол, 204 г/л + трифлуксиксиробин, 159 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	0,5-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, церкоспореллезная прикорневая гниль, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5-0,6	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,5-0,6	Ячмень озимый	Мучнистая роса, септориоз листьев, гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	0,5-0,6	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
Каптан						
АЗУМАКС, ВДГ (каптан, 800 г/кг), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	1,5-1,8	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	20	6
	1,5-1,8	Груша	То же	То же	20	6
КАПТАН, ВДГ (каптан, 800 г/кг), Ариста ЛайфСайенс С.А.С, Франция (Р), (П-З)	1,5-1,8	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	28	6
МЕРПАН, ВДГ (каптан, 800 г/кг), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	1,5-1,8	Яблоня, груша	Парша, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации	28	6
Карбендазим						
ЗИМ 500, КС (карбендазим, 500 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,5-0,6	Пшеница и тритикале озимые, ячмень озимый и яровой	Мучнистая роса, повышение устойчивости к корневой гнили	Опрыскивание в период вегетации	66	1
	0,5-0,6	Рожь озимая	Мучнистая роса	То же	66	1

	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	20	1-2
КРЕДО, СК (карбендазим, 500 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, корневая и прикорневая гнили	Опрыскивание в период вегетации	60	1
	0,6	Тритикале озимая	Мучнистая роса, повышение устойчивости к прикорневой гнили	То же	60	1
	0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, повышение устойчивости к прикорневой гнили	То же	60	1
	1	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз, пасмо	То же	20	2
ПОНЕЗИМ, КС (карбендазим, 500 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь; (Р), (П-З)	0,6	Тритикале озимая	Церкоспореллезная прикорневая гниль, повышение устойчивости к корневой гнили	Опрыскивание в период вегетации	47	1
	0,6	Пшеница и рожь озимые, пшеница яровая	Мучнистая роса, церкоспореллезная прикорневая гниль	То же	38	1
	0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, повышение устойчивости к корневой гнили	То же	47	1
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	24	1
	1	Лен-долгунец	Антракноз, пасмо	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» - фазу бутонизации	68	1-2
ФЕРАЗИМ, КС (карбендазим, 500 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,6	Пшеница озимая	Корневая гниль, церкоспореллезная прикорневая гниль	Опрыскивание в период вегетации	60	1
	0,6	Тритикале озимая	Мучнистая роса, корневая гниль, церкоспореллезная прикорневая гниль	То же	60	1
	1	Лен масличный	Антракноз, пасмо	Опрыскивание в период вегетации	57	2
Карбендазим + азоксистробин						
АЗОРРО, КС (карбендазим, 300 г/л + азоксистробин, 100 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, повышение устойчивости к корневой гнили	Опрыскивание в период вегетации	60	1
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, корневая гниль	То же	60	1
	0,8-1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, корневая гниль	То же	60	1
	0,8-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, пиренофороз, септориоз листьев, бурая ржавчина, корневая гниль	То же	60	1

	0,8-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, корневая гниль	То же	60	1
	1,25-1,5	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	62	1
	1,25-1,5	Сурепица озимая	Альтернариоз	То же	59	1
	0,8-1	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса	То же	60	1
	0,8-1	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	60	1-2
	0,8-1	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	То же	20	3
Карбендазим + ципроконазол						
КАРБЕНАЗОЛ, КС (карбендазим, 300 г/л + ципроконазол, 66 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, корневая гниль	То же	30	1
	0,6-0,8	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,8-1	Пшеница и ячмень яровые	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,6-0,8	Тритикале яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,6-0,8	Овес	Септориоз листьев, красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	30	1
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	То же	30	1
Крезоксим-метил						
СТРОБИ, ВГ (крезоксим-метил, 500 г/кг), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (П-З)	0,15-0,2	Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации	30	4
	0,4	Роза защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,05 % рабочей жидкостью		2
Крезоксим-метил + пириметанил						
ДИККАРТ, КС (крезоксим-метил, 125 г/л + пириметанил, 475 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,6-0,8	Яблоня	Парша, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации	30	4
	0,6-0,8	Голубика высокорослая	Антракноз, пятнистости листьев	То же	50	2
Крезоксим-метил + эпоксиконазол + дифеноконазол						
ТЕРАПЕВТ ПРО, КС (крезоксим-метил, 125 г/л + эпоксиконазол, 125 г/л + дифеноконазол, 80 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-З)	0,5-0,7	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	74	1
	0,5-0,7	Тритикале озимая	Бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз	То же	74	1
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, фузариоз колоса	То же	52	1

	0,5-0,7	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость	То же	52	1
	0,7-0,9	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	То же	40	1
	0,15	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса, антракноз	Опрыскивание в период вегетации 0,015% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	2	2
	0,5-0,6	Яблоня	Парша, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации	30	1-3
Мандипропамид						
РЕВУС, СК (мандипропамид, 250 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,6	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	30	3
	0,6	Лук репчатый	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – профилактическая, последующие – при появлении первых признаков болезни с интервалом 7-14 дней	49	3
	0,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	3	3
	0,6	Томат защищенного грунта	То же	То же	5	3
Мандипропамид + дифеноконазол						
РЕВУС ТОП, СК (дифеноконазол, 250 г/л + мандипропамид, 250 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,5-0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	30	3
Мандипропамид + оксатиапипролин						
ОРОНДИС УЛЬТРА, СК (мандипропамид, 250 г/л + оксатиапипролин, 30 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,5-0,6	Лук репчатый	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации	7	3
	0,4	Томат защищенного грунта	Фитофтороз	То же	1	3
Манкоцеб						
ДИТАН НЕО ТЕК 75, ВДГ (манкоцеб, 750 г/кг), ООО «ЮПЛ», Россия (Р), (П-З)	2-3	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	18	4
	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	То же	20	3
	1,2-1,6	Томат открытого грунта	То же	То же	20	3
ТРАЙДЕКС (ПЕННКОЦЕБ), ВДГ (манкоцеб, 750 г/кг), UPL EUROPE LTD, Великобритания	1,6-1,7	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание при первых признаках болезни	44	1
	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	40	5

(Р), (П-З)	2-2,5	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка профилактическая, последующие обработки при появлении первых признаков болезни с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости 300 л/га	12	3
	1,6	Томат защищенного грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	14	3
	2	Яблоня	Парша, плодовая гниль	То же	19	7
	2	Голубика высокорослая	Рак стеблей, фомосное увядание ветвей	То же	35	2
ФИТОЦЕБ , ВДГ (манкоцеб, 750 г/кг), ООО «ФортисАгро», Беларусь (Р), (П-З)	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	40	5
	1,2-1,6	Томат открытого грунта	Фитофтороз	То же	20	3
ЭФФИКУР , ВДГ (манкоцеб, 750 г/кг), Agri Sciences Ltd., Турция (Р), (П-З)	1,6-1,7	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз	То же	30	5
	2-3	Яблоня	Парша	То же	20	4
Манкоцеб + металаксил						
МЕТАКСИЛ , СП в водорастворимых пакетах (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	55	3
	2-2,5	Томат открытого грунта	То же	То же	7	3
	2-2,5	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	То же	11	3
МЕТАМИЛ МЦ , СП в водорастворимых пакетах (манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	30	3
	2-2,5	Лук репчатый	Пероноспороз	То же	28	3
	2-2,5	Чеснок озимый	То же	То же	20	3
	5	Смородина черная	Септориоз	То же	72	1
Металаксил М + манкоцеб						
СИНЕКУРА , СТС (металаксил-М, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), ФАДЕР АЛЪЯНС ПОЛЬША, ООО, Польша (Р), (П-З)	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	43	3
Металаксил-М + флуазинам						
ДАРИУС , КЭ (металаксил-М, 120 г/л + флуазинам, 180 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,8	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	34	3
Метирам						
ПОЛИДОК , ВДГ (метирам, 700 г/кг),	2,25	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	60	4

ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	2,25	Груша	Парша, ржавчина	То же	60	4
	2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	То же	20	4
ПОЛИРАМ ДФ , в.д.г. (метирам, 700 г/кг), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-З)	2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	14	5
	2,25	Яблоня	Парша	То же	20	2
Метконазол						
КАРАМБА , КЭ (метконазол, 60 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	1-1,5	Пшеница ози- мая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	1,5	То же	Церкоспореллез	То же		
	1,5	Тритикале ози- мая	Фузариоз и септо- риоз колоса	То же	30	1
	1,25-1,5	То же	Церкоспореллез, корневые гнили	Опрыскивание посевов в фазу выхода в трубку (ст. 31-32)		
	1,25-1,5	То же	Мучнистая роса	Опрыскивание в пе- риод вегетации		
	1,25	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	1,5	То же	Фузариоз и септо- риоз колоса	То же		
	1,25-1,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость, фузариоз и альтернариоз колоса	То же	30	1
	0,8	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	20	1
	0,8	Рапс озимый	Снежная плесень, корневая гниль, росторегулирующее действие, улучшаю- щее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4 настоящих ли- стьев культуры	28	1-3
	0,8	То же	Альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации		
	0,8-1	То же	Росторегулирующее действие (снижение высоты растений рапса, образование большого количе- ства боковых побе- гов)	Опрыскивание весной в фазу роста стебля (стадия 30) культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.		
	0,6-0,8	Капуста белоко- чанная (маточ- ные растения)	Серая гниль	Опрыскивание в фазу 4-6 листьев и перед за- кладкой на хранение		2
МЕТЗОЛ , ВРК (метконазол, 60 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	1-1,5	Пшеница ози- мая	Септориоз и фуза- риоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	1,25-1,5	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса, септориоз, ринхос- пориоз, фузариоз ко- лоса	То же	30	1
	1,25-1,5	Пшеница яро- вая	Мучнистая роса, пи- ренофороз, септо- риоз, фузариоз ко- лоса	То же	30	1
	1,25-1,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,8	Рапс озимый	Альтернариоз,	То же	30	1

	0,8-1		Росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания		
	0,8	Рапс яровой	Альтернариоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов)	Опрыскивание в фазу 4-х настоящих листьев или в фазу стеблевания культуры	30	1
Метрафенон						
ФЛЕКСИТИ, КС (метрафенон, 300 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-З)	0,3	Пшеница, тритикале, рожь озимые	Мучнистая роса, церкоспореллезная прикорневая гниль	Опрыскивание в период вегетации	71	1
	0,15-0,2	Ячмень озимый	Мучнистая роса, церкоспореллезная прикорневая гниль	То же	30	1
	0,3	Огурец защищенного грунта (минеральная вата)	Настоящая мучнистая роса	Последовательные обработки 0,03% рабочей жидкостью: - первая при первых признаках болезни; - последующие с интервалом 7- 10 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	3	3
	0,3	Роза защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,04% рабочей жидкостью с интервалом 7-10 дней.		2
Мефеноксам + манкоцеб						
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ (мефеноксам, 40 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	14	3
	2-2,5	Лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	То же	14	2
	2,5	Томат открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	То же	7	3
Мефентрифлуконазол						
РЕВИОНА, КС (мефентрифлуконазол, 75 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	1-1,5	Картофель	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	51	1
	1-1,25	То же	То же	То же	44	2
	1,5-2	Яблоня	Мучнистая роса, парша, плодовая гниль	То же	21	3
	1-1,5	Черешня	Клястероспориоз, коккомикоз, гнили плодов	Опрыскивание в период вегетации	21	3
Мефентрифлуконазол + боскалид						
КАНТУС ТОП, КС (мефентрифлуконазол, 100 г/л + боскалид, 200 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,4	(не более 0,8 л/га)			30	2
	0,6	Рапс яровой	То же	То же	30	1
Мефентрифлуконазол + крезоксим-метил						

ДАКСУР, КС (мефентрифлуконазол, 100 г/л + крезоксим-метил, 150 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,4-0,6	Пшеница озимая	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,4-0,6	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	0,4-0,5	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,5	Ячмень яровой	То же	То же	30	1
	0,4	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	30	1
	0,4	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	То же	30	1
	0,3	Лен-долгунец	Антракноз, полиспороз, пасмо	То же	30	1
Мефентрифлуконазол + протиоконазол						
НАВУРА, КЭ (мефентрифлуконазол, 50 г/л + протиоконазол, 100 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Септориоз, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,6	Ячмень озимый	Мучнистая роса, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,6	Рожь озимая	Ринхоспориоз	То же	30	1
	0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	30	1
Мефентрифлуконазол + фенпропиморф						
КЕЙРА, СЭ (мефентрифлуконазол, 150 г/л + фенпропиморф, 400 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,4-0,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, церкоспореллезная прикорневая гниль	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,4-0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, церкоспореллезная прикорневая гниль	То же	30	1
	0,4-0,5	Ячмень озимый	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,4-0,5	Рожь озимая	Ринхоспориоз	То же	30	1
	0,4	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	29	1
	0,4	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	29	1
	0,4	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1
Пенконазол						
ТОПАЗ, КЭ (пенконазол, 100 г/л),	0,125-0,15	Огурец открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	4	2

Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,5-0,75	Огурец защищенного грунта	То же	Последовательные обработки 0,05-0,075% рабочей жидкостью: первая – при первых признаках развития болезни; последующие – с интервалом 7-10 дней	3	3
	0,3-0,4	Яблоня	То же	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,2-0,4	Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков болезни; последующие – с интервалом 7-10 дней	20	4
	0,3-0,6	Малина (максимальное количество обработок – 2)	Антракноз, пурпуровая пятнистость, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,4		Мучнистая роса	То же	20	1
	0,3-0,5	Земляника садовая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – до цветения; второе – после сбора урожая	30	2
	0,75	Роза защищенного грунта	То же	Опрыскивание в период вегетации 0,1% раствором с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 750 л/га		3
Пидифлуметофен						
МИРАВИС, СК (пидифлуметофен, 200 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,75-1	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации	35	2
	0,2-0,25	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	Последовательные обработки 0,02-0,025% рабочей жидкостью: первая – при первых признаках развития болезни; повторно – через 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	3	2
	0,375-0,5		Аскохитоз	Последовательные обработки 0,0375-0,05% рабочей жидкостью: первая – при первых признаках развития болезни; повторно – через 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га		
	0,25-0,35	Капуста белокочанная	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	10	2
	0,25-0,35	Морковь столовая	Бурая пятнистость листьев	То же	15	2

	1		Белая гниль	Последовательные об- работки: первая – опрыскивание в пе- риод вегетации; вторая – за 15 дней до уборки		
	0,35-0,5	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Стемфилиоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	14	2-3
	1	(максимальное количество об- работок – 3)	Гнили луковиц	То же	14	3
	0,2-0,25	Яблоня	Парша, мучнистая роса	То же	15	2
Пидифлуметофен + азоксистробин + дифеноконазол						
МИРАВИС ГОЛД, СК (пидифлуметофен, 75 г/л + азоксистробин, 125 г/л + дифенокона- зол, 125 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,75-1,2	Рапс озимый	Альтернариоз, скле- ротиниоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	66	1
	0,75-1,2	Рапс яровой	То же	То же	59	1
	0,75-1	Свекла сахар- ная	Церкоспороз	То же	35	2
	0,75-1	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль	То же	63	2
Пидифлуметофен + пропиконазол						
МИРАВИС ЭЙС, СЭ (пидифлуметофен, 150 г/л + пропи-кона- зол, 125 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница ози- мая	Септориоз листьев	Опрыскивание в пе- риод вегетации	43	1
	0,8-1		Фузариоз и септо- риоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Тритикале ози- мая	Септориоз листьев, мучнистая роса	То же	43	1
	0,8-1	То же	Фузариоз и септо- риоз колоса			
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Септориоз листьев, ринхоспориоз, сет- чатая пятнистость	То же	43	1
	0,8-1	То же	Фузариоз и гельмин- тоспориоз колоса			
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость, мучнистая роса	То же	37	1
	0,8-1	То же	Фузариоз и гельмин- тоспориоз колоса			
Пидифлуметофен + флудиоксонил						
МИРАВИС ПРАЙМ, СК (пидифлуметофен, 150 г/л + флудиоксо- нил, 250 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,75-1	Томат защи- щенного грунта	Серая гниль	Опрыскивание в пе- риод вегетации	3	2
	0,8-1	Земляника садо- вая	Мучнистая роса, пятнистости ли- стьев, гнили ягод	Опрыскивание в пе- риод вегетации: первое – до цветения; второе – после сбора урожая	14	2
	0,75-1	Голубика высо- корослая	Пятнистости ли- стьев, серая гниль	Опрыскивание в фазу цветения	42	1
	0,5			Опрыскивание в фазу начала образования ягод		
	0,5	Клюква крупно- плодная (не более 1 л/га)	Годрония, гибберо- вая пятнистость ли- стьев, монилиоз, гнили ягод	Последовательные об- работки: первая – в фазу начала цветения; вторая – в фазу образо- вания завязи – начало роста плодов	70	1-2

	0,75			Опрыскивание в фазу образования завязи – начало роста плодов		
Пикоксистробин + ципроконазол						
АКАНТО ПЛЮС, КС (пикоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ООО «Кортева Агриса-енс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,6	Пшеница озимая и яровая (не более 1 л/га)	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в пе-риод вегетации	30	1
	0,5		То же	То же	30	2
	0,6	Тритикале озимая (не более 1 л/га)	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сеп-ториоз, фузариоз ко-лоса, бурая ржав-чина	То же	30	1
	0,5		То же	То же	30	2
	0,6	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,6	Ячмень яровой (не более 1 л/га)	Сетчатая пятни-стость, фузариоз ко-лоса	То же	30	1
	0,5		То же	То же	30	2
	0,6	Овес	Красно-бурая пятни-стость, септориоз, корончатая ржав-чина	То же	30	1
	0,7	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз початков	То же	58	1
	0,5-0,7	Рапс озимый	Альтернариоз, скле-ротиниоз	То же	55	1
	0,5-0,7	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	55	1
	0,5-0,6	Свекла сахар-ная	Церкоспороз, мучни-стая роса, фомоз	То же	20	1
Пиракlostробин + боскалид						
БЕЛЛИС, ВДГ (пираклостробин, 128 г/кг + боскалид, 252 г/кг), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	0,8	Морковь столо-вая	Буря пятнистость листьев	Опрыскивание в пе-риод вегетации	10	2
	0,8	Лук репчатый	Переноспороз	То же	34	1
	0,8	Яблоня	Мучнистая роса	То же	5	2
	0,8	(максимальное количество об-работок – 2)	Гнили плодов при хранении	Опрыскивание в пе-риод созревания пло-дов	5	1
	0,8	Голубика высо-корослая (максимальное количество об-работок – 2)	Антракноз побегов, фомопсисное увяда-ние стеблей, рак стеблей	Опрыскивание в пе-риод вегетации	3	2
	0,8		Гнили ягод	Опрыскивание в пе-риод созревания ягод	3	1
	0,5	Лиственные	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание 0,1% жидкостью, в т.ч. в пи-томниках		3
ПИКТОР АКТИВ, КС (боскалид, 150 г/л + пи-раклостробин, 250 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	0,4	Рапс озимый	Склеротиниоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,4	То же	То же	То же	30	2
	0,4	Рапс яровой	Фомоз, альтернариоз	То же	30	1
	0,4	Свекла сахар-ная	Церкоспороз	То же	21	1-2
	0,4	Горох	Аскохитоз, мучни-стая роса, ржавчина	То же	30	1
	0,4	Бобы кормовые	Шоколадная пятни-стость, ржавчина, мучнистая роса	То же	45	1-2

	0,3	Картофель	Альтернариоз	То же	29	2
	0,4	Подсолнечник	Альтернариоз, белая и серая гниль	То же	31	1
Пиракlostробин+ метконазол						
ОПТИМО ДУО, КЭ (пираклостробин, 130 г/л + метконазол, 80 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	28	1-3
	0,8		Фомоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры (снижение высоты растений, образование большего количества боковых побегов)	Опрыскивание осенью в фазу 4-5 настоящих листьев культуры		
	0,8		Росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу роста стебля культуры		
	0,8	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз, фомоз, серая гниль	То же	30	1
	0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	31	1-2
Пиракlostробин + мефентрифлуконазол						
БАЛАЯ, КЭ (пираклостробин, 100 г/л + мефентрифлуконазол, 100 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-3)	0,75	Пшеница озимая	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	28	1
	0,6	(не более 1,2 л/га)	То же	То же	28	2
	0,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз колоса	То же	28	1
	0,6	(не более 1,2 л/га)	То же	То же	28	2
	0,6	Рожь озимая	Ринхоспориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина	То же	28	1
	0,6	Ячмень озимый	Ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	28	1
	0,6	Пшеница яровая	Септориоз, мучнистая роса, фузариоз колоса	То же	28	1
	0,75	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	28	1

	0,6-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	31	1
Пиракlostробин + пропиконазол + флуксапироксад						
ПРИАКСОР МАКС, КЭ (пираклостробин, 200 г/л + пропиконазол, 125 г/л + флуксапироксад, 30 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-3)	0,5	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1-2
	0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз листьев	То же	30	1-2
	0,5	(максимальное количество обработок – 2)	Бурая ржавчина, септориоз колоса	То же	30	1
	0,5	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	0,5	Рожь озимая	Ринхоспориоз	То же	30	1
	0,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость	То же	30	1-2
Пиракlostробин+флуксопироксад						
ХАРВИГА, КЭ (пираклостробин, 150 г/л + флуксапироксад, 75 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	0,5-0,75	Пшеница озимая	Септориоз листьев, церкоспореллезная прикорневая гниль	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5-0,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, церкоспореллезная прикорневая гниль	То же	30	1
	0,5-0,75	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса	То же	30	1
	0,5	(максимальное количество обработок – 2)	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	30	2
	0,5-0,75	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,5	(максимальное количество обработок – 2)	То же	То же	30	2
	0,5	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз	То же	30	1
	0,5-0,75	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	30	1
	0,5	(максимальное количество обработок – 2)	То же	То же	30	2
	0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость	То же	30	1
	0,5-0,75	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
	0,5-0,75	Рапс яровой	То же	То же	30	1
	0,5	Горох	Аскохитоз	То же	33	2
	0,5	Бобы кормовые	Шоколадная пятнистость	То же	33	2
	0,5	Соя	Фузариоз, аскохитоз, септориоз, церкоспороз	То же	36	1
	0,5	Подсолнечник	Альтернариоз, белая и серая гниль	То же	30	2
Пиракlostробин + ципроконазол						
КВИНТА, КЭ (пираклостробин, 200 г/л + ципроконазол, 100 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь	0,4-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,4-0,6	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	67	1

(Р), (П-З)	0,4-0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	То же	67	1
	0,5-0,7	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	36	1
	0,4-0,6	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса	То же	36	1
	0,6-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	86	1
Пириметанил						
ПИРУС, КС (пириметанил, 400 г/л), Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СРЛ, Бельгия (Р), (П-З)	0,75-1	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	30	4
Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид						
ПРИАЛИН, ВР (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, 20%), ЧП «ЭталонБио», Беларусь (Р), (П-З)	0,06	Горох овощной (на семена)	Аскохитоз, переноспороз	Опрыскивание в период вегетации	47	1
	0,03 л/т	Свекла сахарная	Возбудители кагатной гнили	Опрыскивание корнеплодов во время закладки на хранение	62	1
	0,3	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	42	4
	0,2	Бобы кормовые	Шоколадная пятнистость, аскохитоз, пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации	26	2
	1,5-3	Огурец защищенного грунта (минеральная вата)	Аскохитоз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое – при первых признаках болезни; последующие – с интервалом 7-14 дней	3	3
	1,5-3	Томат защищенного грунта (минеральная вата)	Белая и серая гниль	То же	3	3
Полисульфиды натрия						
Препарат фунгицидно-акарицидный «ПСК 25% водный раствор» (полисульфиды натрия), ЧПУП «Биохим», Беларусь (П-З)	2-4	Горох	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	4	1
	8	Огурец и томаты защищенного грунта	То же	Опрыскивание в период вегетации 0,8% рабочей жидкостью: первая обработка – при появлении первых признаков болезни, последующие – с интервалом 7-10 дней	4	4
	2-4	Яблоня	То же	То же	4	4
	2-4	Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	4	3
Проквиназид						
ТАЛИУС, КЭ (проквиназид, 200 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-З)	0,15-0,25	Пшеница, тритикале и рожь озимые, пшеница и ячмень яровые	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	40	1
	0,2-0,25	Пшеница, тритикале и рожь озимые	То же	Опрыскивание в период вегетации осенью		
Пропамокарб + фосэтил						

ПРЕВИКУР ЭНЕР-ДЖИ, ВК (пропамокарб, 530 г/л + фосэтил, 310 г/л), Байер АГ, Германия (П-4)	3 мл/м²	Огурец защищенного грунта на минеральной вате и почвогрунте	Корневые гнили, пероноспороз	Последовательное при- менение: - полив субстрата пе- ред или после высева семян 0,15 % рабочим раствором препарата. Расход рабочей жидко- сти – 2 л/м²; - полив рассады под корень через 14 дней после высева семян 0,15 % рабочим рас- твором препарата. Рас- ход рабочей жидкости – 2 л/м²; - полив (капельный) растений под корень 0,15 % рабочим рас- твором препарата че- рез 2-3 дня после вы- садки рассады на по- стоянное место. Расход рабочей жидкости – 2000 л/га; - повторный полив (ка- пельный) - 0,15 % -м рабочим раствором препарата через 14 дней после первого по- лива. Расход рабочей жидкости – 2000 л/га; - профилактический полив (капельный) растений под корень в период вегетации с ин- тервалом в 14 дней 0,15 % рабочим рас- твором. Расход рабо- чей жидкости – 2000 л/га	1	1
	3 мл/м²	Томат защищенного грунта на минеральной вате и почвогрунте	Корневые гнили, фитофтороз		1	
	3 л/га				1	
	3 л/га				1	
	3 л/га				2	
Пропамокарб-гидрохлорид						

[illegible]

ПРОКСАНИЛ, КС (пропамокарб-гидро-хлорид, 400 г/л + цимоксанил, 50 г/л), Ариста ЛайфСайенс Бенилюкс СРЛ, Бельгия (Р), (П-З)	2,5	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	20	4
	2,5	Томат защищенного грунта	Фитофтороз	То же	3	3
Пропиконазол						
ПРИЗМА 250 КЭ (пропиконазол, 250 г/л), INTERNACIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V., Мексика (Р), (П-З)	0,5	Пшеница озимая	Септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	0,5	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
ТИТУЛ 390, ККР (пропиконазол, 390 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,26	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации	31	1
	0,26	Тритикале озимая	Септориоз, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина, фузариоз колоса	То же	31	1
	0,26	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, ржавчина, септориоз	То же	31	1
	0,26	Ячмень яровой	Мучнистая роса	То же	31	1
	0,26	Овес	Ржавчина, красно-бурая пятнистость	То же	31	1
	0,26	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз	То же	66	1
	0,26	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	30	1
	0,25	Крыжовник	Американская мучнистая роса	То же	30	1
	0,26	Малина	Антракноз, септориоз, пурпуровая пятнистость	То же	30	1
	0,26	Многолетние цветочные культуры (ирисы, пионы)	Пятнистости листьев	То же		3
	0,26	Лилия	Пятнистости листьев, серая гниль	То же		3
	0,26	Роза	Мучнистая роса, пятнистости листьев	То же		3
ЭХИОН, КЭ (пропиконазол, 250 г/л),	0,5	Рожь и тритикале озимые	Мучнистая роса, ржавчина, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез	Опрыскивание в период вегетации	30	1

ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси», Беларусь (Р), (П-З)	0,5	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, ржавчина, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5	Ячмень озимый и яровой	Мучнистая роса, ржавчина, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	0,5	Райграс пастбищный, кострец безостый, овсяница луговая (семенники)	Гельминтоспориоз	То же	30	1
	1	Клевер луговой (второго года жизни)	Антракноз, аскохитоз, бурая пятнистость	Опрыскивание в фазу стеблевания 0,2% рабочей жидкостью		1
	1,5	Смородина черная (маточники)	Американская мучнистая роса, антракноз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации 0,15% рабочей жидкостью	30	1
	0,4-0,5	Смородина черная (маточники, питомники)	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,05% рабочей жидкостью		4
	0,5	Мята перечная	Ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,5	Рапс яровой (на технические цели)	Альтернариоз, мучнистая роса	Опрыскивание в конце цветения культуры		1
	0,75-1	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации	31	1
Пропиконазол+азоксистробин						
БАЛИЙ, КМЭ (пропиконазол, 180 г/л + азокси-стробин, 120 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, септориоз листьев	То же	30	1
	0,6-0,8	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз и пиренофороз листьев	То же	30	1
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,6-0,8	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	31	1
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	31	1-2
	0,6	Лен-долгунец	Полиспороз, фузариоз, пасмо	То же	30	1
	0,5-0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	То же	25	3
	0,8-1	Подсолнечник	Альтернариоз, серая и белая гниль	То же	30	1
Пропиконазол + прохлораз						
ГРИТОЛЬ ЭКСТРА, КЭ	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	63	1

(пропиконазол, 90 г/л + прохлораз, 400 г/л), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь; Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, Китай (Р), (П-3)	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	63	1
	0,8-1	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	63	1
	0,8-1	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	63	1
	0,8-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	56	1
	0,8-1	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, фузариоз колоса	То же	56	1
	0,8-1	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	46	1
	0,8-1	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	40	1
Пропиконазол + тебуконазол						
КОЛОСАЛЬ Про, КМЭ (пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,4	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз	То же	30	1
	0,4	То же	Фузариоз колоса	То же		
	0,3-0,4	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз, фузариоз колоса, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,3-0,4	Тритикале яровая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,4	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,3-0,4	Ячмень озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,4	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,4	То же	Фузариоз колоса	То же		
	0,3	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,3	Овес	Красно-бурая пятнистость, септориоз, корончатая ржавчина	То же	30	1
	0,4-0,6	Рапс яровой и озимый	Альтернариоз	То же	30	1
	0,4-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	45	1
	0,3-0,5	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса	То же	30	1

	0,5	Хвойные	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации сеянцев и саженцев в питомниках, 0,1% рабочей жидкостью.		2
	0,5	Лиственные	Мучнистая роса и пятнистости листьев	Опрыскивание листовых культур в т.ч. в питомниках, 0,1% рабочей жидкостью.		3
ПРОПИШАНС УНИ-ВЕРСАЛ, КМЭ (пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,4	Пшеница озимая	Септориоз, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	50	1
	0,3-0,4	Тритикале озимая	Септориоз, мучнистая роса, фузариоз колоса	То же	50	1
	0,3-0,4	Ячмень озимый	Ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, септориоз листьев, мучнистая роса	То же	57	1
	0,3-0,4	Рожь озимая	Ринхоспориоз	То же	50	1
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Септориоз, пиренофороз, мучнистая роса, фузариоз колоса	То же	57	1
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	57	1
	0,3-0,4	Тритикале яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	То же	57	1
	0,4		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,3	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	52	1
	0,4-0,6	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	40	1
	0,25-0,32	То же	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание осенью в фазу 4-х настоящих листьев	40	1
	0,4-0,6	Рапс яровой	То же	Опрыскивание в фазу 4-х настоящих листьев	40	1
	0,3-0,5	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	49	1
	0,4-0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	41	1
ТИТУЛ ДУО, ККР (пропиконазол, 200 г/л + тебуконазол, 200 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,25-0,32	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,25-0,32	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,25-0,32	Рожь озимая	Ринхоспориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,25-0,32	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1

	0,25-0,32	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	0,25-0,32	Овес	Красно-бурая пятнистость листьев и метелки, корончатая ржавчина	То же	30	1
	0,25-0,32	Рапс озимый	Альтернариоз, корневая гниль, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4 настоящих листьев культуры	30	1
	0,25-0,32	То же	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации		
	0,32	Рапс яровой	То же	То же	30	1
	0,25-0,32	Свекла сахарная и кормовая	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	30	1
	0,32	Горох, горох овощной	Аскохитоз	То же	16	1
	0,32	Соя	То же	То же	43	1
	5-6 мл/м ²	Хвойные	Инфекционное поражение всходов и сеянцев	Полив почвы в очагах болезни 0,1 % рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 5-6 л/м ²		1-2
	0,5		Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации сеянцев и саженцев в питомниках и молодняках, 0,1% рабочей жидкостью		4
	0,5	Лиственные	Мучнистая роса и пятнистости листьев	Опрыскивание листовых пород в питомниках и молодняках 0,1% рабочей жидкостью		2-3
	0,32	Дуб черешчатый (сеянцы первого и второго года выращивания)	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,04% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 800 л/га		2
Пропиконазол + тебуконазол + эпоксиконазол						
ТРИАДА, ККР (пропиконазол, 140 г/л + тебуконазол, 140 г/л + эпоксиконазол, 72 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,5-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5-0,6	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз	То же	30	1
	0,5-0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая и темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5-0,6	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	30	1

	0,5	Многолетние цветочные культуры	Пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью		3
	0,5	Луковичные цветочные культуры	Серая гниль, фузариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью: первое – в фазу массового отрастания; последующие – с интервалом 2-3 недели		3-5
	0,5	Роза	Мучнистая роса, черная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью: первое – при появлении первых признаков болезни; последующие – с интервалом 2-3 недели		3
	0,5	Ирис	Гетероспориоз	Опрыскивание в период вегетации 0,1% рабочей жидкостью: – фаза отрастания; – фаза бутонизации; – после цветения		3
Пропиконазол + флутриафол + дифеноконазол						
КАПЕЛЛА, МЭ (пропиконазол, 120 г/л + флутриафол, 60 г/л + дифеноконазол, 30 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	1	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	0,8-1	Пшеница яровая	Септориоз листьев, пиренофороз	То же	30	1
	1	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	0,8-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса	То же	30	1
	1	То же	Гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же		
	1	Хвойные декоративные растения (туя, можжевельник, тис)	Инфекционный некроз побегов, шютте	Опрыскивание 0,2% рабочей жидкостью		4
	1	Сосна	Дотистромоз, обыкновенное шютте, склеродерриоз	То же		4
Пропиконазол + ципроконазол						
АЛИОТ, КЭ (пропиконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,4	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Наземное и авиационное опрыскивание растений, в т.ч. методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5-10 л/га	30	1
	0,4	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1

	0,4	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,4	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	30	1
	0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	20	1
	0,4	Лен	Антракноз, фузариоз, пасмо	Опрыскивание в период вегетации	56	2
	0,75	Хвойные	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание в период вегетации сеянцев и саженцев в питомниках, 0,15% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости – 500 л/га		2
АЛЬКОР СУПЕР, КЭ (пропиконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	40	1
	0,4-0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз и фузариоз колоса	То же	40	1
	0,4	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	44	1
	0,5-0,7	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1-2
АЛЬТО СУПЕР, КЭ (пропиконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,4	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, септориоз, ржавчина, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации, в т. ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 л/га	30	1
	0,4	Тритикале озимая	Септориоз, ржавчина	То же	30	1
	0,4	Рожь озимая	Бурая ржавчина, ринхоспориоз, мучнистая роса, церкоспореллез, септориоз	То же	30	1
	0,4	Ячмень яровой и озимый	Ринхоспориоз, мучнистая роса, септориоз, сетчатая пятнистость, ржавчина, гельминтоспориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,4	Рапс яровой	Альтернариоз	Опрыскивание в фазу конец цветения, в т. ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 л/га	30	1
	0,4	Рапс озимый	То же	Опрыскивание в период вегетации	39	1
	0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	20	1-2
	0,5	Дуб черешчатый (сеянцы, саженцы)	Мучнистая роса дуба, септориоз	То же		1
	0,4	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
ЛАЭРТ, КЭ (пропиконазол, 250 г/л + ципроконазол,	0,4	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1

80 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-З)	0,4	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,4	Ячмень озимый	Мучнистая роса, септориоз листьев, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,4	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина,	То же	30	1
	0,4	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз	То же	30	1
	0,4	Ячмень яровой	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	50	1
	0,5-0,75	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	20	2
Пропинеб						
АНТРАКОЛ, ВДГ (пропинеб, 700 г/кг), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	1,75	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	5
	1,5	Томат открытого грунта	То же	То же	7	4
	2	Томат защищенного грунта	То же	То же	7	3
	1,75-2,25	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	То же	18	3
	2-2,5	Яблоня	Парша	То же	20	4
Протиоконазол + паклобутразол						
РОБУСТ, КЭ (протиоконазол, 125 г/л + паклобутразол, 60 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,6-1	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания	31	1
	0,6-1		Фомоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 настоящих листьев	31	1
	0,6-1	Рапс яровой	Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания	31	1
Протиоконазол + пикоксистробин						
ЛАНЦЕЯ, КМЭ (протиоконазол, 125 г/л + пикоксистробин, 100 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,8-1	Пшеница озимая	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
Протиоконазол + пираклостробин						
ПИЛАРВИВА, КС (протиоконазол, 170 г/л + пираклостробин, 170 г/л),	0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,8-1		Фузариоз колоса		30	1

Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	2
СИНТРОН, КЭ (протиоконазол, 120 г/л + пираклостробин, 90 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	0,8-1,2	Пшеница озимая	Септориоз листьев, мучнистая роса, церкоспореллезная прикорневая гниль	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8-1,2	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	30	1
	1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	0,8-1,2	Горох посевной	Аскохитоз	То же	49	1
	0,4-0,5	Лен-долгунец	Пасмо, фузариоз	То же	52	1
Протиоконазол + проквиназид						
ВЕРБЕН, КЭ (протиоконазол, 200 г/л + проквиназид, 50 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,75	Пшеница озимая (максимальное количество обработок - 2)	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	35	1-2
	0,75-1		Септориоз и фузариоз колоса			1
	0,6-0,75	Тритикале озимая (максимальное количество обработок - 2)	Септориоз листьев, мучнистая роса	То же	35	1-2
	0,75-1		Септориоз и фузариоз колоса			1
	0,6-0,75	Рожь озимая	Ринхоспориоз	То же	35	1
	0,6-0,75	Пшеница яровая	Септориоз листьев, пиренофороз, мучнистая роса	То же	35	1
	0,75-1	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,6-0,75	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость	То же	35	1
	0,75-1	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		
Протиоконазол + тебуконазол						
БН-003, КЭ (протиоконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», Беларусь (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина, церкоспореллезная прикорневая гниль, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	30	1
	0,8-1		Гельминтоспориоз и фузариоз колоса			
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз, бурая ржавчина	То же	51	1
	0,8-1		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 настоящих листьев	40	1
ВИТАЗОЛ ЭКСТРА, ВДГ	0,2-0,3	Пшеница озимая	Септориоз листьев, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	49	1

(протиоконазол, 300 г/кг + тебуконазол, 300 г/кг), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,3-0,4		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,2-0,3	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	49	1
	0,3-0,4		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,2-0,3	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	49	1
	0,3-0,4		Гельминтоспориоз и фузариоз колоса			
	0,2-0,3	Пшеница яровая	Мучнистая роса	То же	50	1
	0,3-0,4	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,25-0,33	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание осенью в фазу 4-х настоящих листьев	40	1
ДОГОДА ПРО, КЭ (протиоконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Септориоз листьев, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	55	1
	0,8-1		Фузариоз колоса			
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	55	1
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	55	1
	0,8-1		Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,6-1	Ячмень озимый	Ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, мучнистая роса, темно-бурая пятнистость	То же	55	1
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	55	1
	0,8-1	То же	Гельминтоспориоз колоса	То же	55	1
	0,8	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	41	1
	0,8	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса, пероноспороз	То же	52	1
	0,8	Бобы кормовые	Шоколадная пятнистость	То же	52	1
	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	27	1
КРЕСТРАЖ, КЭ (протиоконазол, 80 г/л + тебуконазол, 160 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	То же	27	1
	1-1,5	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,8-1	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	27	1
	0,8-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, пиренофороз, септориоз листьев, бурая ржавчина	То же	27	1
	1-1,5	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		

	0,8-1	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	27	1
	1-1,5	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		
	0,7-0,9	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	31	1
	0,7-0,9		Фомоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-5 листьев культуры		
	0,7-0,9		Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция роста боковых побегов)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания		
	0,7-0,9	Рапс яровой	Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция роста боковых побегов)	То же	31	1
НОРТОН ПРО, СЭ (протиокназол, 100 г/л + тебуконазол, 200 г/л), ООО Группа Компаний «Землякофф», Россия (Р), (П-3)	0,5-0,7	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септриоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	56	1-2
	0,7-0,9		Фузариоз колоса			
	0,7-0,9 + 100 мл/га ПАВ Флюид-42, ВК		Фузариоз и септориоз колоса	Опрыскивания БПЛА в период вегетации. Норма расхода рабочего раствора 10 л/га в смеси с 1% ПАВ Флюид-42, ВК	58	1
	0,5-0,7	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	То же	56	1
	0,7-0,9		Гельминтоспориоз и фузариоз колоса			1
	0,5-0,7	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	36	1
	0,7-0,9		Септориоз и фузариоз колоса			1
	0,7-0,9 + 100 мл/га ПАВ Флюид-42, ВК	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз	Опрыскивания БПЛА в период вегетации. Норма расхода рабочего раствора 10 л/га в смеси с 1% ПАВ Флюид-42, ВК	58	1
	0,5-0,7	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	36	1
	0,7-0,9		Гельминтоспориоз и фузариоз колоса			1
	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 3-4 листьев культуры	52	1-2

	0,6-0,8		Альтернариоз, фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и образования стручков)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания		
	0,6-0,8		Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	61	1
	0,6-0,8	Рапс яровой	Фомоз, росторегулирующее действие (стимуляция образования боковых побегов)	Опрыскивание посевов в фазу стеблевания	50	1
	0,6-0,8		Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации		
	0,8 + 100 мл/га ПАВ Флюид-42, ВК		Альтернариоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов)	То же	58	1
ПИЛАРЗОРРО, КС (протиокназол, 230 г/л + тебуконазол, 230 г/л), ПИЛАРКВИМ (ШАН-ХАЙ) КО., ЛТД., Китай (Р), (П-3)	0,45-0,55	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,45-0,55	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	2
ПРОЗАРО, КЭ (протиокназол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8-1		Септориоз и фузариоз колоса			1
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина и септориоз листьев	То же	30	1
	0,8-1		Септориоз и фузариоз колоса	То же		1
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,8-1		Фузариоз колоса	То же		1
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1		Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		1
	0,6-0,8	Тритикале яровая	Септориоз листьев	То же	30	1
	0,8-1		Фузариоз колоса	То же		1
	0,8-1	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз	То же	30	1
	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз, корневые гнили, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 листьев культуры	30	1
	0,6-0,8		Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период цветения		

	0,6-0,8	Рапс яровой	То же	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8	Горох посевной	Аскохитоз	То же	64	1
	0,8	Люпин узколистный	Антракноз, бурая пятнистость	То же	64	1
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	20	1
СИЗАРО, КЭ (протиокназол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), ДВА Агро ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	0,8	Пшеница озимая	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	30	1
	1		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,8	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	1		Фузариоз колоса			
	0,8	Ячмень яровой	Мучнистая роса	То же	30	1
	1		Фузариоз и гельминтоспориоз колоса			
	0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз	То же	30	1
	1	Пшеница и тритикале яровые	Септориоз и фузариоз колоса			
	0,8	Тритикале яровая	Септориоз листьев	То же	30	1
	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание растений осенью в фазу 4-6 настоящих листьев	30	1
			Альтернариоз, склеротиниоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации		
	0,8	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	30	1
	0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1
	1	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз	То же	30	1
	0,8	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса	То же	40	1
СТРИМ, КЭ (пропиконазол, 200 г/л + тебуконазол, 200 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,25-0,32	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,25-0,32	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,25-0,32	Ячмень озимый	Мучнистая роса, септориоз листьев, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,25-0,32	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,25-0,32	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	30	1

	0,25-0,32	Ячмень яровой	Мучнистая роса, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,25-0,32	Тритикале яровая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,25-0,32	Овес	Красно-бурая пятнистость	То же	30	1
	0,25-0,32	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз	То же	30	1
	0,25-0,32	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1
ТИЛМОР, КЭ (протиоконазол, 80 г/л + тебуконазол, 160 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,7-0,9	Рапс озимый	Фомоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры (снижение высоты растений, образование большего количества боковых побегов)	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 настоящих листьев культуры и весной в фазу стеблевания	40	1-2
	0,7-0,9	Рапс яровой	Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания	40	1
	0,7-0,9	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
ФЕЯ, КЭ (протиоконазол, 125 г/л + тебуконазол, 125 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Септориоз листьев, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,6-0,8	(максимальное количество обработок – 2)	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	0,8-1		Септориоз и фузариоз колоса			1
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	30	2
	0,6-0,8		Мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1		Септориоз и фузариоз колоса			1
	0,6-0,8	Ячмень озимый (максимальное количество обработок – 2)	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	30	2
	0,6-0,8		Мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1		Гельминтоспориоз и фузариоз колоса			1
	0,6-0,8	Пшеница яровая (максимальное количество обработок – 2)	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз, бурая ржавчина	То же	30	2
	0,6-0,8		Мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1		Гельминтоспориоз и фузариоз колоса			1
	0,6-0,8	Ячмень яровой (максимальное количество обработок – 2)	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	То же	30	2
	0,6-0,8		Мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1		Гельминтоспориоз и фузариоз колоса			1

	0,6-0,8	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
	0,6-0,8		Фомоз			
	0,6-0,8	Рапс яровой	Альтернариоз	То же	30	1
	0,8-1	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз	То же	30	1
	0,8	Горох посевной	Аскохитоз	То же	64	1
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	20	1
Протиоконазол + тебуконазол + спироксамин						
ПЕРЕГРИН, КЭ (спироксамин, 224 г/л + тебуконазол, 148 г/л + протиоконазол, 53 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,6-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8-1		Фузариоз колоса			
	1		Септориоз колоса			
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз и ринхоспориоз листьев	То же	30	1
	1		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	0,6-0,8	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,6-0,8	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
СОЛИГОР, КЭ (протиоконазол, 53 г/л + тебуконазол, 148 г/л + спироксамин, 224 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,6-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8-1	То же	Фузариоз колоса, церкоспореллезная корневая гниль			
	1	То же	Септориоз колоса			
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз листьев	То же	30	1
	1	То же	Фузариоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Рожь озимая	Ринхоспориоз, мучнистая роса	То же		
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	0,8	Тритикале яровая	Септориоз листьев	То же	30	1
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	То же	30	1
	0,8-1	То же	Фузариоз колоса			
	0,6-0,8	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
	0,4	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз	То же	30	2
	0,8	Горох посевной	Аскохитоз	То же	30	1
	0,8	Люпин узколистный	Антракноз, бурая пятнистость	То же	30	1

	0,6-0,8	Бобы кормовые	Альтернариоз, фузариоз, черноватая пятнистость, ржавчина, шоколадная пятнистость, ложная мучнистая роса	То же	40	2
Протиоконазол + флуксапироксад						
ПИЛАРКАДИС, КС (флуксапироксад, 200 г/л + протиоконазол, 280 г/л), ПИЛАРКВИМ (ШАН-ХАЙ) КО., ЛТД., Китай (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	45	2
	0,3-0,5		Фузариоз колоса	То же	45	1
Спироксамин + тебуконазол + триадеминол						
ПРОФЕССОР МИКС, КЭ (спироксамин, 250 г/л + тебуконазол, 167 г/л + триадеминол, 43 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,5-0,6	Пшеница озимая	Септориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	73	1
	0,5-0,6	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	73	1
	0,6		Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,5-0,6	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	73	1
	0,5	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	73	1
Прохлораз + тебуконазол						
ЗАМИР, ЭМВ (прохлораз, 267 г/л + тебуконазол, 133 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1-1,2	Пшеница озимая	Септориоз, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1-1,2	Тритикале озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	1-1,2	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	1,2	Ячмень озимый	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	1,2-1,5	Пшеница яровая	Септориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	1-1,2	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,75-1,2	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	30	1
	1,2-1,5	То же	Склеротиниоз	То же		
	1,2-1,5	То же	Альтернариоз, росторегулирующее действие, улучшение перезимовки культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 настоящих листьев культуры		

	1,2-1,5	То же	Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов)	Опрыскивание весной в фазу роста стебля культуры		
Прохлораз марганца						
ПРОМЕКС, П (прохлораз марганца, 500 г/кг), ООО «БОНШЕ», Беларусь	3 г/м ²	Шампиньоны закрытого грунта	Белая и сухая гниль	Полив стеллажей с грибным субстратом на 4-е сутки после загрузки. Расход рабочей жидкости 1 л/м	16	1
Сера						
СЕРА 400, КС (сера, 400 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	7-8	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации		4
ТОПАЗИО, ВДГ (сера, 800 г/кг), СТИ Солфотекника Италиана С.п.А., Италия (П-З)	3-4	Пшеница яровая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30	3
	4	Яблоня	Мучнистая роса, парша	То же	30	3
ФЛОСУЛ, СК (сера, 800 г/л), СМЛ Лимитед, Индия (Р), (П-З)	3-5	Яблоня	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	1	3
Сера + тебуконазол						
БРАМБИ, ВДГ (сера, 700 г/кг + тебуконазол, 45 г/кг), ЮПЛ Холдинг Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-З)	3,5-4,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	3,5-4,5	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	30	1
	3,5-4,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	1,5-2	Лен-долгунец	Фузариоз, антракноз, пасмо	То же	30	2
	4-4,5	Яблоня	Парша, мучнистая роса	То же	40	3
Спироксамин + тебуконазол + азоксистробин						
КОАЛИЦИЯ, КЭ (спироксамин, 150 г/л + тебуконазол, 125 г/л + азоксистробин, 110 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	71	1
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз колоса	То же	71	1
	0,8-1	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	71	1
	0,8-1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, септориоз листьев, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	71	1

	0,8-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, переноспороз, бурая ржавчина, фузариоз и септориоз колоса	То же	47	1
Спироксамин + протиокназол + проквиназид						
ИНПУТ ТРИО , КЭ (спироксамин, 200 г/л + протиокназол, 160 г/л + проквиназид, 40 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	40	1
	0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	40	1
	0,7-0,8		Церкоспореллезная прикорневая гниль			
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	40	1
Сульфат меди						
ИНДИГО , КС (меди сульфат трехосновной, 345 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (П-З)	3-5	Яблоня	Парша, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации	15	3
	3-5	Вишня	Монилиальный ожог, коккомикоз, гнили плодов	То же	7	3
	5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	То же	18	3
	5	Лук репчатый	Пероноспороз	То же	15	4
КУМИР , СК (сульфат меди трехосновной, 345 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	5	Яблоня	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации	31	1-4
КУПРОКСАТ , КС (сульфат меди трехосновной, 345 г/л), Нуфарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия (П-З)	5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	30	3
	5	Томат открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание растений при появлении первых признаков болезни, последующие обработки проводят с интервалом 7-10 дней	5	3
	5	Томат защищенного грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	7	3
	5	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	То же	5	3
	5	Огурец защищенного грунта	То же	Опрыскивание растений при появлении первых признаков болезни, последующие обработки проводят с интервалом 7-10 дней	5	3
	5	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	90	3
Тебуконазол						
БУКАТ 500 , КС (тебуконазол, 500 г/л), ООО ИННВИГО, Польша (Р), (П-З)	0,4-0,5	Пшеница озимая	Септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	31	1
	0,4-0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз и фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	31	1
	0,4-0,5	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4 листьев культуры	80	1-2

	0,4-0,5		Росторегулирующее действие (стимуляция роста боковых побегов)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания		
КОЛОСАЛЬ, КЭ (тебуконазол, 250 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	1	Рожь озимая	Ринхоспориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	30	1
	1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, фузариоз колоса	То же	30	1
	1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,7-1	Рапс озимый	Альтернариоз, корневые гнили, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4 настоящих листьев культуры	21	1-2
	0,5-0,9		Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания		
СИЛЬВЗОЛ, КЭ (тебуконазол, 250 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, септориоз листьев, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	1	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	30	1
	1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
ТЕЗИС, КС (тебуконазол, 500 г/л), ООО «Альфа Сمارт Агро», Украина (Р), (П-3)	0,5	Пшеница озимая	Септориоз листьев, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1

ТИТАНИУМ 250 ВЭ (тебуконазол, 250 г/л), INTERNACIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V., Мексика (Р), (П-3)	1	Пшеница ози- мая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	1	Тритикале озимая	Ринхоспориоз, септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,8-1	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость, ринхоспо- риоз	То же	30	1
	1	То же	Фузариоз колоса	То же	20	1
	0,75-1	Рапс озимый	Альтернариоз	То же		
	0,75-1		Альтернариоз, кор- невая гниль, росто- регулирующее дей- ствие, улучшающее перезимовку куль- туры	Опрыскивание осенью в фазу 4 настоящих листьев культуры		
	0,75-1	Рапс яровой	Альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	1
Тебуконазол + дифеноконазол						
ДОГОДА, КЭ (тебуконазол, 125 г/л + дифеноконазол, 125 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	1	Пшеница озимая	Фузариоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,8-1	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса, септориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,8-1	Ячмень озимый	Ринхоспориоз, сет- чатая пятнистость	То же	30	1
	0,8-1	Рожь озимая	Ринхоспориоз	То же	30	1
	0,8-1,0	Пшеница яро- вая	Септориоз листьев	То же	50	1
	0,8-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса	То же	50	1
	0,8-1	Рапс озимый	Альтернариоз, скле- ротиниоз	То же	57	1
	0,8-1		Фомоз, росторегули- рующее действие, улучшение перези- мовки культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 настоящих листьев культуры		
	1	Рапс яровой	Альтернариоз, скле- ротиниоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	57	1
	1	Лен-долгунец	Антракноз, пасмо, фузариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	56	1
	1	Горох посевной	Аскохитоз, пероно- спороз, мучнистая роса	То же	51	1
	0,8-1	Клевер луговой (семенные по- севы)	Антракноз, аскохи- тоз, мучнистая роса, фузариоз	То же		1
	0,5	Лиственные (питомники)	Мучнистая роса, ха- ларовый некроз ясеня	Опрыскивание 0,1% рабочей жидкостью		3
	0,5	Хвойные (питомники)	Фомоз	То же		3
МАГНЕЛЛО, КЭ (дифеноконазол, 100 г/л + тебуконазол, 250 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,8-1	Пшеница ози- мая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,8-1	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, фуза- риоз и септориоз ко- лоса	То же	30	1

	0,8-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
Дифеноконазол + тебуконазол + пираклостробин						
МИСТЕРИЯ, МЭ (дифеноконазол, 40 г/л + тебуконазол, 80 г/л + пираклостробин, 80 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	1-1,25	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	30	1-2
	1-1,25	Рапс яровой	То же	То же	30	1
	1-1,25	Соя	Аскохитоз, склеротиниоз	То же	71	1
	1-1,25	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	52	1-2
	1-1,25	Подсолнечник	Альтернариоз, белая и серая гнили	То же	55	1
Тебуконазол + крезоксим-метил						
БОЛИВАР ФОРТЕ, КС (тебуконазол, 240 г/л + крезоксим-метил, 125 г/л), ООО «Альфа Сمارт Агро», Украина (Р), (П-З)	0,5-0,75	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,75		Фузариоз колоса			
Тебуконазол + метконазол						
БАКЛЕР, КМЭ (тебуконазол, 200 г/л + метконазол, 50 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1		Фузариоз и септориоз колоса			
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	1		Фузариоз и септориоз колоса			
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1		Фузариоз колоса			
	0,8-1	Пшеница яровая	Септориоз листьев, пиренофороз	То же	30	1
	1		Фузариоз и септориоз колоса			
	0,8-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	1		Фузариоз и гельминтоспориоз колоса			
	0,6-0,8	Рапс озимый	Фомоз, росторегулирующее действие, улучшающее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 листьев	40	1-2
	0,6-0,8		Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания		

	0,6-0,8	Рапс яровой	Фомоз, альтернариоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания	40	1
	0,5	Лиственные лесные культуры	Инфекционный некроз ветвей	Опрыскивание растений 0,1% рабочей жидкостью		3
	0,35	Лиственные	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание с использованием БЛА сеянцев и саженцев в питомниках 1,75% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 20 л/га		2
	0,35	Хвойные	Обыкновенное и снежное шютте	Опрыскивание в период вегетации с использованием БЛА 1,75% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости 20 л/га		6
	0,5	Сосна	Искривление побегов (сосновый вертун)	Опрыскивание с использованием БЛА несомкнувшихся лесных культур и молодых побегов в период линейного роста молодых побегов 2,5% рабочей жидкостью. Расход рабочей жидкости – 20 л/га		1
Тебуконазол + пираклостробин						
ОСКАР, КЭ (тебуконазол, 125 г/л + пираклостробин, 125 г/л), ООО Группа Компаний «Землякофф», Россия (Р), (П-З)	0,8-1,2	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	75	1
	0,8-1,2	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	То же	75	1
	0,8-1,2	Пшеница яровая	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, септориоз листьев, фузариоз колоса	То же	36	1
	0,8-1,2	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость	То же	36	1
	0,8-1,2	Рапс озимый	Альтернариоз, фомоз	То же	64	1
	0,8-1,2	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз, фомоз	То же	64	1
	0,8-1,2	Горох посевной	Аскохитоз	То же	56	1
Тебуконазол + пираклостробин + протиоконазол						
ЭЙС, ККР	0,6-0,8	Пшеница озимая	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1

(тебуконазол, 160 г/л + пираклостробин, 80 г/л + про-тиоконзол, 40 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,8-1	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, септориоз листьев, мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1	То же	Гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,8-1	То же	Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1	То же	Гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же		
	0,9-1,1	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	41	1
	0,9-1,1		Росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу роста стебля культуры		
	0,9-1,1	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	41	1
Тебуконазол + пропиконазол + ципроконазол						
ТИТУЛ ТРИО, ККР (тебуконазол, 160 г/л + пропиконазол, 80 г/л + ципроконазол, 80 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,6	Пшеница озимая	Септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5-0,6	То же	Септориоз и фузариоз колоса			
	0,4-0,6	Тритикале озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,5-0,6	То же	Септориоз и фузариоз колоса			
	0,4-0,6	Ячмень озимый и яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	0,5-0,6	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса			
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,5-0,6	То же	Септориоз и фузариоз колоса			
	0,4-0,6	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз	То же	44	1
	0,4-0,6	Рапс озимый	Цилиндроспориоз, росторегулирующее действие, улучшение перезимовки культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4 настоящих листьев культуры	44	1
Тебуконазол + триадименол + спироксамин						

ФАЛЬКОН, КЭ (тебуконазол, 167 г/л + триадибензол, 43 г/л + спироксамин, 250 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,5-0,6	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, септориоз, ржавчина, фузариоз колоса, пиренофороз	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,6	Тритикале озимая	Септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5-0,6	То же	Мучнистая роса, бурая ржавчина	То же		
	0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	30	2
	0,5-0,6	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз, ржавчина, фузариоз колоса, сетчатая пятнистость	То же	30	2
	0,4	Чеснок озимый	Черная плесень	То же	25	2
Тебуконазол + триадибензол						
АЗИМУТ, КЭ (тебуконазол, 125 г/л + триадибензол, 100 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	1	Пшеница озимая и яровая, тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	1	Люпин узколистный	Бурая пятнистость, серая гниль, фузариоз	То же	45	2
	0,75-1	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	57	1
	0,8-1		Росторегулирующее действие улучшающие перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-5 листьев культуры		
	0,75-1	Рапс яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	57	1
	0,5	Лиственные (питомники)	Мучнистая роса и пятнистости листьев	Опрыскивание 0,1% рабочей жидкостью		2-3
	0,5	Хвойные (питомники)	Снежное и обыкновенное шютте, фомоз	То же		2-4
Тебуконазол + ципроконазол						
ФАРГО, КС (тебуконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,4-0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,4	Рожь озимая	Ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,4-0,5	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	30	1

	0,4-0,5	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз	То же	30	1
	0,5		Септориоз и фузариоз колоса			
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса	То ж	30	1
	0,5		Гельминтоспориоз и фузариоз колоса			
	0,4-0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость	То ж	30	1
	0,6-0,8	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
	0,6-0,8		Фомоз, росторегулирующее действие (снижение высоты растений, стимуляция образования боковых побегов)			
	0,5-0,8	Горох посевной	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	21	1
	0,5-0,8	Бобы кормовые	Черноватая пятнистость, шоколадная пятнистость	То же	30	1
	0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	31	2
0,5-0,8	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль	То же	56	2	
Тиабендазол + циперметрин						
БОМБЕР, ДШ (тиабендазол, 300 г/кг + циперметрин, 130 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р)	5 г/20 м ³	Пустые парники, теплицы	Возбудители грибных и бактериальных болезней	Фумигация пустых помещений перед посадкой рассады. Экспозиция – 3 суток. Дегазация – 2 суток		1
Тиофанат-метил						
ТИОМЕКС, КС (тиофанат-метил, 420 г/л), СООО «БОНШЕ», Беларусь	3 г/м ²	Шампиньоны закрытого грунта	Белая и сухая гниль	Полив стеллажей с грибным субстратом на 4 сутки после загрузки. Расход рабочей жидкости 1,5 л/м	17	1
ТОПСИН М, КС (тиофанат-метил, 500 г/л), ООО «Саммит Агро», Россия (Р), (П-3)	1,5	Яблоня (максимальное количество обработок – 3)	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20	3
	1,5		Антракноз коры	То же	20	2
Тиофанат-метил + флутриафол						
ФОРМАТ ЭКСТРА, КС (тиофанат-метил, 310 г/л + флутриафол, 187 г/л), ООО «Альфа Смарт Агро», Украина (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
Тиофанат-метил + ципроконазол						

КАРБЕНАЗОЛ НЕО, КС (тиофанат-метил, 225 г/л + ципроконазол, 66 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,8-1	Пшеница озимая	Септориоз листьев, церкоспореллезная прикорневая гниль, повышение устойчивости к корневой гнили	Опрыскивание в период вегетации	88	1
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, фузариозная прикорневая гниль	То же	88	1
	0,8-1	Рожь озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	88	1
	0,8-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	49	1
	0,8-1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	То же	88	1
	0,8-1	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	49	1
	0,8-1	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	72	1
	0,8-1	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1
Тирам						
ГРАНУФЛО, ВДГ (тирам, 800 г/кг), Таминко БВ, дочернее предприятие EAST-MAN CHEMICAL COMPANY, Бельгия (Р), (П-З)	2-3	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации	20	4
Трифлуксистробин						
ЗАТО, ВДГ (трифлуксистробин, 500 г/кг), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	0,14-0,15	Яблоня	Мучнистая роса, парша, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации	14	3
Трифлуксистробин + каптан						
ЗАТО ПЛЮС, ВДГ (трифлуксистробин, 40 г/кг + каптан, 600 г/кг), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	1,5-1,8	Яблоня	Парша, мучнистая роса, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации	20	3
	1,4-1,6	Смородина черная	Антракноз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – до начала цветения; второе – сразу после цветения	23	2
Фамоксадон + оксатиапипролин						
ЗОРВЕК ЭНКАНТИЯ, СЭ (фамоксадон, 300 г/л + оксатиапипролин, 30 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-З)	0,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	15	4
	0,5-0,6	Лук репчатый	Пероноспороз	То же	5	1-3
	0,4-0,5	Огурец открытого грунта	То же	То же	1	1-3
Фамоксадон + цимоксанил						
ТАНОС, ВДГ (фамоксадон, 250 г/кг + цимоксанил, 250 г/кг),	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Применять для первых профилактических опрыскиваний	5	3

ООО «Кортева Агриса-енс Рус», Россия (Р), (П-З)	0,6	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первая обработка – профилактическая, последующие – при появлении первых признаков болезни с интервалом 10-14 дней	21	4
ТАНОШАНС , ВДГ (фамоксадон, 250 г/кг + цимоксанил, 250 г/кг), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	5	3
УЛИС , ВДГ (фамоксадон, 250 г/кг + цимоксанил, 250 г/кг), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	55	3
Фенамидон + пропамокарб гидрохлорид						
КОНСЕНТО ТОП , КС (фенамидон, 75 г/л + пропамокарб гидрохлорид, 375 г/л), Гован Кроп Протекшн Лимитед, Англия (Р), (П-З)	1,5-2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	4
	1,5-2	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	То же	14	3
Фенпропидин + пропиконазол						
ТИЛТ ТУРБО , КЭ (фенпропидин, 450 г/л + пропиконазол, 125 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина, церкоспореллез	Опрыскивание в период вегетации	40	1
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз листьев, бурая ржавчина, церкоспореллез	То же	40	1
	0,8-1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость	То же	40	1
	0,8-1	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	40	1
	0,8-1	Тимофеевка	Гетероспориоз	То же	32	1
	0,8-1	Фестулолиум	Гельминтоспориоз	То же	32	1
	Фенпропидин + прохлораз + тебуконазол					
КАНТИК , КЭ (фенпропидин, 150 г/л + прохлораз, 200 г/л + тебуконазол, 100 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	0,8-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,8-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	То же	30	1-2
	0,8-1	Ячмень озимый	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1	Рожь озимая	Ринхоспориоз, мучнистая роса	То же	30	1
	0,8-1	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	То же	30	1-2
	0,8-1	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость	То же	30	1
	0,5	Лиственные (питомники)	Мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание 0,1% рабочей жидкостью		2-3

	0,5	Хвойные (питомники)	Снежное и обыкновенное шютте, фомоз	То же		2-4
Фенпропидин + эпоксиконазол						
ЛИНДЕР ТОП, КЭ (фенпропидин, 100 г/л + эпоксиконазол, 40 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	2-2,25	Пшеница озимая	Септориоз, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	46	1
	2-2,25	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	То же	46	1-2
	1,75-2	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	То же	30	1-2
	1,75-2	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, фузариоз колоса	То же	30	1
Флуазинам						
ЗУММЕР, КС (флуазинам, 500 г/л), Кеминова А/С, Дания (Р), (П-З)	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	8	4
	0,5-0,75	Яблоня	Парша	То же	20	4
ПРЕГАРД, КС (флуазинам, 500 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	4
	0,5-0,75	Яблоня	Парша	То же	20	4
НАНДО 500, КС (флуазинам, 500 г/л), Нуфарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия (Р), (П-З)	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	14	5
ШИРЛАН, 50% с.к. (флуазинам), ИСК Биосаенсис Юроп ЭС Эй, Бельгия (Р), (П-З)	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	5
ШИРМА, КС (флуазинам, 500 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,4	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	5
	0,5-0,75	Яблоня	Парша	То же	20	4
Флуазинам + диметоморф						
БАНДЖО ФОРТЕ, КС (флуазинам, 200 г/л + диметоморф, 200 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия. (Р), (П-З)	0,8-1	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	3
	0,8-1	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	То же	20	4
ИНСАЙД, СК (диметоморф, 200 г/л + флуазинам, 200 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,8-1	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	24	3
Флудиоксонил						

ГЕОКС, ВДГ (флудиоксонил, 500 г/кг), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (П-З)	0,4	Яблоня	Гнили плодов при хранении	Опрыскивание в период созревания плодов	3	3
КЛЕЙМОР, СК (флудиоксонил, 200 г/л), АО «Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	1	Яблоня	Гнили плодов при хранении	Опрыскивание в период созревания плодов	3	2-3
Флудиоксонил + ципродинил						
ИНСИГНИЯ, МД (ципродинил, 150 г/л + флудиоксонил, 140 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	1	Яблоня	Гнили плодов при хранении	Опрыскивание в период созревания плодов: 1-е – за 20 дней до сбора урожая, 2-е – через 7-10 дней после первого	3	2
СВИТЧ, ВДГ (флудиоксонил, 250 г/кг + ципродинил, 375 г/кг), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	1	Томат и огурец защищенного грунта (минеральная вата)	Серая гниль, аскохитоз	Последовательные обработки 0,1% рабочей жидкостью: - первая обработка профилактическая; - последующие при появлении первых признаков болезни с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	3	3
	1	Земляника садовая	Мучнистая роса, пятнистости листьев, гнили ягод	Опрыскивание в период вегетации	5	2
	1	Голубика высокорослая	Гнили ягод	То же	7	1
	1	Клюква крупноплодная	Монилиальный ожог, годрония, греберная пятнистость, гнили ягод	То же	7	2
Флуксапироксад						
СЕРКАДИС, КС (флуксапироксад, 300 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-З)	0,2-0,25	Огурец защищенного грунта (минеральная вата) (не более 3-х обработок за ротацию)	Аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации	3	2
	0,2-0,25		Мучнистая роса	То же	3	3
	0,25	Яблоня	Парша, мучнистая роса, плодовая гниль	То же	26	3
Флуксапироксад + дифеноконазол						
СЕРКАДИС ПЛЮС, КС (флуксапироксад, 75 г/л + дифеноконазол, 50 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-З)	0,7-1	Морковь столовая	Бурая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации	15	2
	0,6-1	Голубика высокорослая	Антракноз, фомопсисное увядание, рак стеблей, пятнистости листьев	Опрыскивание до начала образования ягод	30	2
				Опрыскивание после сбора урожая		1
	0,6	Яблоня	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	30	3

	0,6-1	То же	Парша, пятнистости листьев	То же		
Флуксапироксад + мефентрифлуконазол						
РЕВИСТАР ТОП, КЭ (флуксапироксад, 50 г/л + мефентрифлуконазол, 100 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-3)	0,75-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	32	1
	0,6	(не более 1,2 л/га)				2
	0,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз колоса	То же	32	1
	0,75	Ячмень озимый	Ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, септориоз листьев	То же	32	1
	0,6	(не более 1,2 л/га)				2
	0,75	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса	То же	30	1
	0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1-2
Флуксапироксад + мефентрифлуконазол + пираклостробин						
РЕКС ТРИО, КЭ (флуксапироксад, 40 г/л + мефентрифлуконазол, 30 г/л + пираклостробин, 200 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-3)	0,3-0,4	Пшеница и тритикале озимые	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,4	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса	То же	30	1
	0,3	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,3	Пшеница яровая	Септориоз листьев, мучнистая роса	То же	29	1
	0,3	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, мучнистая роса	То же	29	1
	0,3	Овес	Красно-бурная пятнистость, корончатая ржавчина	То же	29	1
	0,3	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	То же	30	1-2
	0,3	Лен-долгунец	Антракноз, полиспороз, фомоз	То же	30	1
Флуоксастробин + тебуконазол						
ЭВИТО Т, КС (флуоксастробин, 180 г/л + тебуконазол, 250 г/л), Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (Р), (П-3)	0,7-1	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,7-1	Тритикале озимая	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,5-0,6	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, карликовая ржавчина	То же	30	1
	0,7-1	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	0,5-1	Рапс озимый	Склеротиниоз, альтернариоз	То же	70	1
	0,8-1	Яблоня	Парша, мучнистая роса, плодовая гниль	То же	30	2
Флуопиколид + пропамокарб-гидрохлорид						
ИНФИНИТО, КС (флуопиколид, 62,5 г/л + пропамокарб-гидрохлорид, 625 г/л), Байер АГ, Германия	1,2-1,6	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	7	4
	1,2-1,6	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Пероноспороз	То же	7	3

(Р), (П-З)	1,4-1,6	Томат защищенного грунта	Фитофтороз	Опрыскивание растений в период вегетации 0,14-0,16% раствором: первое – профилактическая обработка или при первых признаках болезни; последующие – с интервалом 7-14 дней	4	3
Флуопиколид + флуоксаипролин						
КАМБАЛИО СМАРТ, КС (флуопиколид, 200 г/л + флуоксаипролин, 30 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	0,4-0,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	3
Флуопирам + пираклостробин						
ПИЛАРЛУНА, КС (флуопирам, 114 г/л + пираклостробин, 228 г/л), ПИЛАРКВИМ (ШАН-ХАЙ) КО., ЛТД., Китай (Р), (П-З)	0,9-1,1	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	Опрыскивание в период вегетации	40	1
	0,7-1,1	Яблоня (максимальное количество обработок – 4)	Парша, мучнистая роса, плодовая гниль	То же	20	4
	0,7-1,1		Гнили плодов при хранении	Опрыскивание в период вегетации за 20 дней до сбора урожая	20	1
Флуопирам + пириметанил						
ЛУНА ТРАНКВИЛИТИ, КС (флуопирам, 125 г/л + пириметанил, 375 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	1-1,6	Огурец и томаты защищенного грунта (минеральная вата)	Серая гниль	Опрыскивание растений в период вегетации 0,1-0,16% раствором: первое – профилактическая обработка или при первых признаках болезни; последующие – с интервалом 10-14 дней	3	3
	0,8-1	Яблоня (максимальное количество обработок – 4)	Парша, мучнистая роса, пятнистости листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	4
	0,8-1		Гнили плодов при хранении	Опрыскивание в период вегетации за 20 дней до сбора урожая	20	1
	0,8-1	Слива	Клястероспориоз	Опрыскивание в период вегетации	60	3
	0,8-1	Земляника садовая	Пятнистости листьев, серая гниль	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая	19	2
Флуопирам + протиоконазол						
ПРОПУЛЬС, СЭ (флуопирам, 125 г/л + протиоконазол, 125 г/л), Байер АГ, Германия (П-З)	0,6-0,8	Пшеница и тритикале озимые	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	67	1
	0,6-0,8	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	67	1
	0,6-0,8	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	0,8-1	Рапс озимый	Альтернариоз, склеротиниоз	То же	30	1
	0,8	Рапс яровой	То же	То же	65	1
	0,6-0,8	Горох посевной	Аскохитоз, мучнистая роса	То же	31	2

	0,8-1	Свекла сахарная и кормовая	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	20	1
	0,8	Соя	Альтернариоз, аскохитоз, септориоз, церкоспороз	То же	30	1
	0,8	Подсолнечник	Альтернариоз, белая и серая гниль	То же	30	1
	0,3-0,5	Картофель	Альтернариоз	То же	25	2
Флуопирам + тебуконазол						
ЛУНА ЭКСПИРИЕНС, КС (флуопирам, 200 г/л + тебуконазол, 200 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,5-0,75	Яблоня (максимальное количество обработок – 4)	Мучнистая роса, плодовая гниль	Опрыскивание в период вегетации	20	3
	0,75		Парша	То же		
	0,75		Гнили плодов при хранении	Опрыскивание за 20 дней до уборки урожая	20	1
	0,75-1	Капуста кочанная (максимальное количество обработок – 2)	Альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	25	1-2
	1		Болезни кочанов во время хранения	Последовательные обработки: - опрыскивание в фазу формирования кочана; - за 25 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкости 400 л/га	25	2
	0,5-0,75	Морковь столовая	Бурая пятнистость листьев	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,75		Болезни корнеплодов во время хранения	Последовательные обработки: первая - опрыскивание в период вегетации; вторая - за 20 дней до уборки. Расход рабочей жидкости 300 л/га		
	0,5-0,6	Огурец защищенного грунта	Мучнистая роса	Последовательные обработки 0,05-0,06%-ой рабочей жидкостью: первая – при первых признаках развития болезни; последующие – с интервалом 7-14 дней. Расход рабочей жидкости – 1000 л/га	3	3
	0,5-0,75	Малина	Антракноз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации	20	2
	0,5-0,6	Голубика	Рак стеблей	То же	20	2
0,6	Фомопсисное увядание стеблей					
Флутриафол						
АБАРОНЦА, СК (флутриафол, 250 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	0,5	Пшеница озимая	Септориоз, мучнистая роса, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5	Тритикале озимая	Септориоз листьев, ринхоспориоз, мучнистая роса, септориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1

	0,5	Пшеница яровая	Септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1
	0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость, септориоз, корончатая ржавчина	То же	30	1
	0,25-0,5	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	30	1
	0,5	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	30	1
	0,5	Рапс яровой	То же	То же	30	1
	0,5	Люпин узколистный	Антракноз, бурая пятнистость, серая гниль, фузариозное увядание	То же	44	2
	0,1-0,15	Яблоня	Мучнистая роса	То же	40	4
АДВАНС, ВДГ (флутриафол, 800 г/кг), ООО Группа Компаний «Землякофф», Россия (Р), (П-3)	0,15-0,2	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	63	1-2
	0,15-0,2 + ПАВ Биотон 100 мл/га	То же	То же	То же		
	0,15-0,2	Тритикале озимая	Бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз	То же	63	1-2
	0,15-0,2 + ПАВ Биотон 100 мл/га	То же	То же	То же		
	0,15-0,2	Ячмень озимый	Мучнистая роса	То же	63	1-2
	0,15-0,2 + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	То же		
	0,15-0,2	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	50	1-2
	0,15-0,2 + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	Мучнистая роса, фузариоз колоса	То же		
	0,15-0,2	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	То же	50	1-2
	0,15-0,2 + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса	То же		
	0,15-0,2	Рапс озимый	Мучнистая роса, альтернариоз	То же	50	1-2

	0,15-0,2 + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	То же		
	0,2	Рапс яровой	Мучнистая роса, альтернариоз, фомоз	То же	50	1-2
	0,2 + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	То же		
	0,1	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	57	2
	0,08 + 100 мл/га ПАВ Биотон	(максимальное количество обработок – 2)	То же	То же	57	1-2
	0,2	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз початков	То же	60	1
	0,1-0,15	Яблоня	Мучнистая роса, парша	То же	107	4
	0,1-0,15 + 100 мл/га ПАВ Биотон, ВК	То же	То же	То же	107	4
ИМПАКТ, КС (флутриафол, 250 г/л), Кеминова А/С, Дания (Р), (П-3)	0,5	Пшеница озимая	Септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	31	1
	0,5	Рожь и тритикале озимые	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, гельминтоспориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз, серая гниль	То же	30	2
	0,25-0,5	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1
	0,5	Люпин узколистный	Мучнистая роса, фомосис, антракноз, бурая пятнистость	То же	30	2
	0,1-0,15	Яблоня	Мучнистая роса, парша	То же	40	4
СТРАЙК, КС (флутриафол, 250 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (П-3)	0,5	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, ржавчина, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1-2
	0,5	Тритикале озимая	Септориоз, ринхоспориоз, мучнистая роса, ржавчина, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, ринхоспориоз, фузариоз колоса	То же	30	2

	0,5	Ячмень озимый и яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина, фузариоз и альтернариоз колоса	То же	30	1
	0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	30	1
	0,5	Рапс озимый и яровой	Альтернариоз	Опрыскивание в фазу конец цветения - начало образования стручков	30	1
	0,25-0,5	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5	Люпин узколиственный	Мучнистая роса, фомопсис, антракноз, бурая пятнистость	Опрыскивание при первых признаках появления болезни	30	1
	0,1-0,15	Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации	40	4
Флутриафол + карбендазим						
ИМПАКТ ЭКСКЛЮЗИВ, КС (флутриафол, 117,5 г/л + карбендазим, 250 г/л), Кеминова А/С, Дания (Р), (П-3)	0,5	Пшеница озимая	Септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	31	1
	0,5	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	53	1
	0,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	53	1
	0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость, корончатая ржавчина	То же	53	1
	0,5	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	65	1
	0,5	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса	То же	65	1
	0,5	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса	То же	45	1
	1	Люпин узколиственный	Антракноз, бурая пятнистость, серая гниль	То же	50	2
	0,5	Лен	Антракноз, фузариоз, пасмо	То же	47	2
Флутриафол + тебуконазол						
АБАРОНЦА СУПЕР, КС (флутриафол, 75 г/л + тебуконазол, 225 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	0,7-0,9	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,7-0,9	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, септориоз и фузариоз колоса	То же	30	1
	0,7-0,9	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,7-0,9	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	30	1
	0,7-0,9	Тритикале яровая	Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	30	1

	0,7-0,9	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость, темно-бурая пятнистость, рин- хоспориз, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	30	1	
	0,6-0,8	Овес	Красно-бурая пятни- стость, септориоз, корончатая ржав- чина	То же	30	1	
	1	Рапс озимый	Альтернариоз, фо- моз, росторегулиру- ющее действие, улучшающее пере- зимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-х настоящих листьев культуры	30	1	
	0,5-1	Рапс яровой	Альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1	
	0,5-1	Люпин узко- листный	Антракноз, бурая пятнистость, серая гниль, фузариозное увядание	То же	30	1-2	
ИМПАКТ СУПЕР, КС (флутриафол, 75 г/л + тебуконазол, 225 г/л), Кеминова А/С, Дания (Р), (П-3)	0,7-0,9	Пшеница ози- мая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в пе- риод вегетации	45	1-2	
	0,6-0,8	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	45	1-2	
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхос- пориоз, бурая ржав- чина, фузариоз ко- лоса	То же	45	1-2	
	0,7-0,9	Пшеница яро- вая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	То же	45	1-2	
	0,7-0,9	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость, мучнистая роса, фузариоз и альтернариоз колоса	То же	45	1-2	
	0,6-0,8	Овес	Красно-бурая пятни- стость листьев и ме- телки, корончатая ржавчина	То же	45	1-2	
	0,5-1	Люпин узко- листный	Антракноз, бурая пятнистость, серая гниль	То же	51	2	
	0,75-1	Рапс озимый	Альтернариоз	То же	30 (стручк и), 50 (масло)	1	
	0,75-1	То же	Альтернариоз, росторегулирующее действие, улучшаю- щее перезимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4 -5 настоящих листьев культуры	30 (струч- ки), 50 (масло)	1	
	0,5-1	Рапс яровой	Альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	38	1-2	
	СТРАЙК ФОРТЕ, КС (тебуконазол, 225 г/л + флутриафол, 75 г/л),	0,75-0,9	Пшеница ози- мая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в пе- риод вегетации	71	1
		0,9	То же	Фузариоз и септо- риоз колоса	То же		

ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	0,75-0,9	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость	То же	30	1
	0,9	То же	Фузариоз и гельмин- тоспориоз колоса	То же		
	0,5-1	Рапс озимый	Альтернариоз, скле- ротиниоз	То же	29	1
	0,4-0,6		Фомоз, росторегули- рующее действие, улучшающее пере- зимовку культуры	Опрыскивание осенью в фазу 4-6 ли- стьев культуры		
	0,6-0,8		Фомоз, росторегу- лирующее действие (снижение высоты растений, стимуля- ция образования бо- ковых побегов и стручков)	Опрыскивание весной в фазу стеблевания		
Хлорат натрия						
АРМЕКС 5, Ж (хлорат натрия, 12,5%) + активатор (лимонная кислота 35%, П), МЕХЕО, Польша	0,00056 л/м² + 0,00056 г/м² (актива- тор) + 0,999 л/м² (вода)	Шампиньоны закрытого грунта	Грибные и бактери- альные болезни	Полив, расход рабочей жидкости 1 л/м². В ре- зультате реакции ком- понентов образуется диоксид хлора. Экспозиция 1 сутки, допуск людей после полного проветрива- ния		1-2
Хлорокись меди						
АБИГА-ПИК, ВС (хлорокись меди, 400 г/л), ООО Торговый Дом «Сельхозхимия», Россия (П-3)	2,9-3,8	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	4
	1,8	Ель	Ржавчина шишек	Опрыскивание в пе- риод вегетации 1% рабочей жидкостью.		3
АЗОФОС ФОРТ, 30% к.с. (хлорокись меди), ЧПУП «Биохим», Беларусь (Р), (П-2)	4	Картофель	Фитофтороз, альтер- нариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	3
	2,5	Морковь столо- вая	Бурая листовая пят- нистость	То же	20	2
	15	Огурец защи- щенного грунта (минеральная вата) (максимальное количество об- работок – 5)	Корневые гнили	Полив растений под корень: -полив через 3-5 дня после высадки расте- ния; -последующие – с ин- тервалом 14 дней. Рас- ход рабочей жидкости – 200 мл/ растение	5	5
	3-5		Аскохитоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации при появлении первых признаков болезни и через 10-14 дней. Рас- ход рабочей жидкости – 1000 л/га	5	2
	6	Яблоня	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации в си- стеме защиты сада	20	2
	6	Вишня	Монилиальный ожог, коккомикоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	4

	6	Смородина	Антракноз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации: -первое – в период бутонизации; -второе - сразу после цветения; -третье - после сбора урожая	20	3
Хлороталонил						
БРАВО, СК (хлороталонил, 500 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-2)	3-6	Огурец защищенного грунта	Пероноспороз	Последовательные обработки 0,3-0,6% рабочей жидкостью: первая – при первых признаках развития болезни; последующие – с интервалом 7-14 дней.	3	3
	2,2-3	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	10	3
	2,2-2,7	Огурец открытого грунта	Пероноспороз	То же	5	3
	3,3	Лук репчатый	Пероноспороз	То же	10	3
ГРЭММИ, КС (хлороталонил, 500 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	2,2-3	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	4
Хлороталонил + боскалид						
БЕЛУДЖИ, КС (хлороталонил, 450 г/л + боскалид, 30 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	1,8-2,3	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	3
Хлороталонил + пираклостробин						
ПИРУЭТ, КС (хлороталонил, 500 г/л + пираклостробин, 55 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	1,5-2	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	20	3
Циазофамид						
ВИНТАГА, КС (циазофамид, 100 г/л + флуазинам, 300 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,5-0,8	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации	20	2
ЛИБЕРТАДОР, СК (циазофамид, 160 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации	9	3
Цимоксанил + мандипропамид						

КАРИАЛ ФЛЕКС, ВДГ (цимоксанил, 180 г/кг + мандипропамид, 250 г/кг), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,5	Картофель	Фитофтороз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	14	4
Цимоксанил + хлорокись меди						
ОРДАН, СП в водорас- творимых пакетах (цимоксанил, 42 г/кг + хлорокись меди, 689 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	2,5-3	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	20	3
	2,5-3	Томат откры- того грунта	Фитофтороз	То же	15	3
	2,5-3	Огурец откры- того грунта	Пероноспороз	То же	5	3
	2,5-3	Огурец защи- щенного грунта (торфяной суб- страт)	То же	Опрыскивание до по- явления болезни. При первых признаках - с интервалом 7-10 дней	3	3
Ципродинил						
ПЛАНТЕНОЛ Нео, ВДГ (ципродинил, 500 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,3	Яблоня	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации	16	1-4
ПРИАМ, КЭ (ципродинил, 250 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,6	Яблоня	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации	15	2
	0,6	Вишня	Коккомикоз, мони- лиальный ожог, кля- стероспориоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	15	3
ХОРУС, ВДГ (ципродинил, 750 г/кг), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,2-0,3	Бобы кормовые	Альтернариоз, фуза- риоз, черноватая пятнистость, шоко- ладная пятнистость, ржавчина	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,2	Яблоня	Парша	Опрыскивание в пе- риод вегетации	15	4
	0,2	Вишня	Коккомикоз, мони- лиальный ожог	То же	42	3
	0,2	Черная смородина	Септориоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации: первое – в период бу- тонизации; второе – сразу после цветения	69	2
	0,2	Крыжовник	Антракноз	То же	69	2
	0,7	Земляника	Пятнистости ли- стьев, гнили ягод	Опрыскивание до цве- тения и после сбора урожа	32	2
	0,2	Клюква крупно- плодная	Годрония, гибберо- вая пятнистость ли- стьев, монилиаль- ный ожог, твердая, концевая и липкая гнили плодов, сухо- вершинность побе- гов	Опрыскивание в пе- риод вегетации в си- стеме защиты посадок	76	2
Ципроконазол + пропиконазол						

АЛТО ТУРБО, КЭ (ципроконазол, 160 г/л + пропиконазол, 250 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,4-0,5	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30	2
	0,4-0,5	Рожь озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	51	1
	0,4-0,5	Ячмень озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	51	1
	0,4-0,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, фузариоз и альтернариоз колоса, гельминтоспориоз колоса	То же	30	2
	0,4-0,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз колоса	То же	30	2
	0,4-0,5	Тритикале яровая	Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз листьев, желтая и бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	50	1
	0,4-0,5	Овес	Красно-бурая пятнистость, септориоз, корончатая ржавчина	То же	50	1
	0,4-0,5	Рапс озимый	Альтернариоз	Опрыскивание в фазу конец цветения – образование стручков (ст. 70) культуры	47	1
	0,4-0,5	Свекла сахарная	Церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации	64	1-2
	0,5	Лиственные	Мучнистая роса, пятнистости и другие болезни листьев	Опрыскивание растений в питомниках и молодняках 0,1%-м раствором рабочей жидкости. Расход жидкости 500 л/га		3
	0,5	Хвойные	Болезни хвои	То же		4
	0,5	То же	Диплодиоз	То же		2
Ципроконазол + пропиконазол + бензовиндифлупир						
ЭЛАТУС РИА, КЭ (ципроконазол, 66,67 г/л + пропиконазол, 208,33 г/л + бензовиндифлупир, 83,33 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,5-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	0,5-0,6	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,5-0,6	Ячмень озимый	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,5-0,6	Пшеница яровая	Септориоз листьев, пиренофороз листьев	То же	30	1
	0,5-0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз	То же	30	1

	0,4	Бобы кормовые	Альтернариоз, фузариоз, черноватая пятнистость, шоколадная пятнистость, ржавчина	То же	71	1
Ципроконазол + эпоксиконазол						
РАКУРС, СК (ципроконазол, 160 г/л + эпоксиконазол, 240 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,4	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	20	1
	0,3-0,4	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз, ринхоспориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	20	1
	0,3-0,4	Ячмень озимый	Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	20	1
	0,3-0,4	Рожь озимая	Ринхоспориоз	То же	20	1
	0,3-0,4	Ячмень яровой	Сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, ринхоспориоз, фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же	20	1
	0,3-0,4	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	20	1
	0,4-0,5	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1
	0,5-0,7	Яблоня	Парша, мучнистая роса	То же	30	4
	0,5-0,7	Груша	Ржавчина, парша	То же	30	4
	0,4	Хвойные	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание растений в питомниках и молодняках 0,1% рабочей жидкостью		4
	0,4	Лиственные	Мучнистая роса, пятнистости листьев	То же		2- 3
	0,4	Роза открытого грунта	То же	Опрыскивание растений 0,08 % рабочей жидкостью		3
	0,4	Флокс	То же	То же		3
	0,6-0,8	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	20	1
ФЛИНТ, ВСК (эпоксиконазол, 120 г/л + ципроконазол, 80 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,8	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	20	1
	0,8	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	20	1
	0,8	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		

	0,6	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость, темно-бурая пятнистость, мучни- стая роса	То же	20	1
	0,8	То же	Фузариоз и гельмин- тоспориоз колоса	То же		
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1
Эпоксиконазол + метконазол						
ОСИРИС, КЭ (эпоксиконазол, 37,5 г/л + метконазол, 27,5 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-3)	1-1,5	Пшеница озимая (не более 2 л/га)	Септориоз листьев, бурая ржавчина	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	1,5-2		Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	1		Септориоз, бурая ржавчина, фузариоз колоса	То же	30	2
	1-1,5	Тритикале ози- мая (не более 2 л/га)	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сеп- ториоз листьев, бу- рая ржавчина	То же	30	1
	1,5-2		Септориоз и фузариоз колоса	То же		
	1		Мучнистая роса, ринхоспориоз, сеп- ториоз, бурая ржав- чина, фузариоз ко- лоса	То же	30	2
	1-1,5	Пшеница яро- вая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	1,5-2	То же	Септориоз и фуза- риоз колоса	То же		
	1-1,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость	То же	30	1
	1,5-2		Фузариоз и гельмин- тоспориоз колоса	То же		
Эпоксиконазол + пираклостробин						
АБАКУС ПРАЙМ, СЭ (эпоксиконазол, 62,5 г/л + пираклостро- бин, 85 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	0,8-1,2	Пшеница ози- мая	Септориоз листьев, церкоспореллезная прикорневая гниль	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	0,8-1,2	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса, церкоспореллезная прикорневая гниль	То же	30	1
	1	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сет- чатая пятнистость, ринхоспориоз	То же	30	1
	0,8-1	Пшеница яро- вая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз	То же	31	1
	0,8	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость, мучнистая рос	То же	31	1
	0,8-1	Овес	Красно-бурая пятни- стость	То же	31	1
	0,8	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	30	1-2
	0,8	Подсолнечник	Альтернариоз, белая и серая гниль	То же	31	1
АБАКУС УЛЬТРА, СЭ	1-1,5	Пшеница ози- мая и яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1

(эпоксиконазол, 62,5 г/л + пираклостробин, 62,5 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	1-1,5	Тритикале озимая	Септориоз листьев, ринхоспориоз бурая ржавчина, мучнистая роса	То же	30	1
	1-1,5	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость, ринхоспориоз	То же	30	1
	1-1,5	Ячмень яровой	Сетчатая и темно-бурая пятнистость, мучнистая роса	То же	30	1
	1-1,5	Кукуруза	Пузырчатая головня, гельминтоспориоз, фузариоз початков	То же	30	1
	1-1,5	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	То же	75	1
	0,5	Лен-долгунец	Фузариоз, пасмо	То же	30	1
ПРИРАСТАР ПЛЮС, СЭ (эпоксиконазол, 62,5 г/л + пираклостробин, 62,5 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1-1,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1-1,5	Тритикале озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев, ринхоспориоз	То же	30	1
	1-1,5	Ячмень озимый	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	1-1,5	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз, бурая ржавчина	То же	30	1
	1-1,5	Ячмень яровой	Мучнистая роса	То же	30	1
	0,5	Лен-долгунец	Фузариоз, пасмо	То же	30	1
	1-1,5	Кукуруза	Пузырчатая головня, фузариоз початков	То же	30	1
	1-1,5	Свекла сахарная	Церкоспороз	То же	50	1
	<i>Эпоксиконазол + прохлораз</i>					
МАРАКАС, КЭ (эпоксиконазол, 50 г/л + прохлораз, 225 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1,25-1,75	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	30	1
	1,5-1,75	То же	Мучнистая роса, фузариоз и септориоз колоса			
	1,25-1,75	Тритикале озимая	Мучнистая роса, ринхоспориоз	То же	30	1
	1,5-1,75	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	1,25-1,75	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз листьев	То же	30	1
	1,5-1,75	То же	Фузариоз и септориоз колоса	То же		
	1,25-1,75	Ячмень яровой	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	1,5-1,75	То же	Фузариоз и гельминтоспориоз колоса	То же		
<i>Эпоксиконазол + тиафанат-метил</i>						
РЕКС ДУО, КС (эпоксиконазол, 187 г/л + тиафанат-метил, 310 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия	0,4-0,6	Пшеница озимая	Мучнистая роса, ржавчина, септориоз, церкоспореллез	Опрыскивание в период вегетации	21	1
	0,6	То же	Фузариоз и альтернариоз колоса			
	0,6	Тритикале озимая	Септориоз, ржавчина, ринхоспориоз, фузариоз колоса	То же	21	1

	0,6	То же	Церкоспореллез, корневые гнили	Опрыскивание посевов в фазу выхода в трубку (ст. 31-32)		
	0,6	Рожь озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации	21	1
	0,6	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сетчатая пятнистость	То же	21	1
	0,6	Пшеница яровая	Мучнистая роса, ржавчина, септориоз, фузариоз и альтернариоз колоса	То же	21	1
	0,6	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ринхоспориоз, сетчатая пятнистость, ржавчина, фузариоз и альтернариоз колоса	То же	21	1
	0,6	Овес	Красно-бурая пятнистость	То же	21	1
	0,6	Горох	Аскохитоз, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни	20	1
	0,5	Свекла сахарная (не более 1 л/га)	Церкоспороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20	1-2
	0,6		Возбудители кагатной гнили при хранении корнеплодов	То же	30	
	0,6		Рамуляриоз	То же	20	
	0,6	Лен-долгунец	Антракноз, фузариоз, пасмо	То же	72	1
Эпоксиконазол + фенпропиморф						
РЕКС ПЛЮС, СЭ (эпоксиконазол, 84 г/л + фенпропиморф, 250 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-З)	0,75	Пшеница озимая (не более 1,5 л/га)	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в период вегетации	39	2
	1-1,25		Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	0,75	Тритикале озимая (не более 1,5 л/га)	Мучнистая роса	То же	39	2
	1,0-1,25		Мучнистая роса, септориоз листьев, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	1-1,25	Ячмень озимый	Церкоспореллезная прикорневая гниль, мучнистая роса, ринхоспориоз, темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость	То же	30	1
	1,25	Рожь озимая	Ринхоспориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина	То же	30	1
	1,5	Пшеница яровая	Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	1-1,25	Ячмень яровой	Мучнистая роса, ржавчина, темно-бурая и сетчатая пятнистости	То же	30	1

	0,75-1	Рапс яровой	Альтернариоз	Опрыскивание в фазу конец цветения	20	1
	1,25-1,5	Свекла сахарная	Церкоспороз, фомоз	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	1,25	Райграс паст- бищный	Гельминтоспориоз, пиренофороз	То же	30	1
	1,25	Овсяница луго- вая	Пиренофороз, септо- риоз метелки	То же	30	1
	1,25	Клевер луговой	Аскохитоз, пероно- спороз, антракноз	То же	30	1
Эпоксиконазол + фенпропиморф+ метрафенон						
КАПАЛО, СЭ (эпоксиконазол, 62,5 г/л + фенпропи- морф, 200 г/л + метра- фенон, 75 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	1-1,5	Пшеница озимая	Мучнистая роса, септориоз листьев	Опрыскивание в пе- риод вегетации	30	1
	1-1,5	Тритикале ози- мая	Мучнистая роса, септориоз листьев, ринхоспориоз, бурая ржавчина	То же	30	1
	1-1,5	Ячмень озимый	Мучнистая роса, сет- чатая пятнистость	То же	30	1
	1-1,5	Пшеница яро- вая	Мучнистая роса, септориоз листьев, бурая ржавчина	То же	30	1
	1-1,5	Ячмень яровой	Сетчатая пятни- стость, темно-бурая пятнистость	То же	30	1