

ГЕРБИЦИДЫ (для субъектов хозяйствования)

2

2,4-Д.....	21
*2,4-Д кислота.....	21
*2,4-Д кислота + дикамба кислота.....	21
*2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира + флуроксипир + флорасулам.....	15
2М-4Х 750.....	116
*2-ЭГЭ 2,4-Д кислота.....	12
*2-ЭГЭ 2,4-Д кислота + пиклорам + флорасулам.....	14
*2-ЭГЭ 2,4-Д кислота + флорасулам.....	15
*2-ЭГЭ 2,4-Д кислота + хлорсульфурон.....	21
*2-ЭГЭ 2,4-Д кислоты + никосульфурон + флорасулам.....	14
*2-ЭГЭ 2,4-Д-кислота + амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил /антидот/.....	12
*2-ЭГЭ 2,4-Д-кислота + аминопиралид + флорасулам.....	13
*2-ЭГЭ 2,4-Д-кислота + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил /антидот/.....	13
*2-ЭГЭ 2,4-Д-кислота + йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + мефенпир-диэтил /антидот/.....	14

А

АВАНТИКС ТУРБО.....	163
АВРОРА.....	23
АВСЕНЬ.....	149
АГРИТОКС.....	113
АГРОН.....	90
АГРОШАНС.....	114
АДВАЙЗЕР.....	141
АДЕНГО.....	148
АЙМОКС.....	90
АКВИЛОН.....	67
АКЕБОНО.....	142
АКЗИФОР.....	121
АККУРАТ ЭКСТРА.....	150
АКРИС.....	66
АКСИАЛ 50.....	124
АКСИАЛ КРОСС.....	126
АЛГОРИТМ.....	88
АЛИГАТОР.....	140
АЛИСТЕР ГРАНД.....	79
АЛХИМИК.....	162
АЛЬТАИР.....	78
АМАДЕУС ФОРТЕ.....	142
*Амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил (антидот).....	22
*Амикарбазон + мезотрион.....	23
*Амикарбазон + мезотрион + никосульфурон + аминопиралид.....	23
*Аминопиралид + флорасулам.....	23
АНТАРЕОН.....	148
АПРОВАТОР.....	125
АПРОВАТОР УЛЬТРА.....	87
АПСТЕЙДЖ.....	88
АРГАМАК.....	154
АРГО ПРИМ.....	162
АРГУМЕНТ.....	32
АРГУМЕНТ СТАР.....	41
АРИСТОКРАТ СУПЕР.....	42
АРКАДЕ.....	134
АССОЛЮТА.....	15
АССОЛЮТА ПРАЙМ.....	15
АСТЭРИКС.....	16
АТЛЕТИК.....	14
АТРИБУТ.....	133
АШИТАКА.....	153

Б

БАЗАГРАН.....	23
БАЗАГРАН М.....	28
БАЗАГРАН ПРО.....	24
БАЗИС.....	140

БАЛАНСИР	134
БАЛЕРИНА	16
БАЛЕРИНА СУПЕР	17
БАЛЕРИНА ФОРТЕ	14
БАЛЛИСТА	97
БАНДУР ФОРТЕ	167
БАСТА	55
БЕКАНО	77
БЕЛКАР 58	28
БЕЛКАР ФЛЕКС	28
БЕЛЬВЕДЕР	56
БЕЛЬВЕДЕР ФОРТЕ	56
БЕНИТО	25
*Бентазон	23
*Бентазон + имазамокс	26
*Бентазон + МЦПА	28
БЕТАНАЛ МАКСПРО	61
БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ	56
БЕТАРЕН МАКС	57
БЕТАРЕН СУПЕР МД	57
БЕТАРЕН ЭКСПРЕСС АМ	57
БЕТАШАНС ТРИО	58
БЕТРИСАН	58
БИНОМ	78
БИОЛАН СУПЕР	21
БИТЕКС	58
БИФОР ПРОГРЕСС	59
БИЦЕПС гарант	59
БН-001	17
БОКСЕР	133
БОМБА	157
БРИГ	127
БРИС	90
БРУСИЯ ЭКСТРА	120
БУНТ	25
БУТИЗАН АВАНТ	102
БУТИЗАН ДУО	101
БУТИЗАН СТАР	101
БУЦЕФАЛ	81

В

ВЕНИК	145
ВЕНТО	18
ВЕРСИЯ	132
ВЕРСУС	95
ВИЗИОН	23
ВИКИНГ	61
ВОЖДЬ	143
ВОЛЬНИК	44
ВОЛЬНИК ДУО	55
ВОЛЬНИК СМАРТ	49
ВОЛЬНИК СУПЕР	50
ВЫБОР	81

Г

ГАВАНЬ ПЛЮС	98
*Галаксифен-метил + пиклорам	28
*Галаксифен-метил + флорасулам + клоквинтосет	28
ГАЛАКТИОН	29
ГАЛЕРА СУПЕР 364	96
ГАЛИОН	95
ГАЛЛОН	29
*Галоксифон-Р-метил	29
ГАЛОШАНС	30
ГАЛС	89
ГАЛС СУПЕР	102
ГАМБИТ	127
ГАРДО ГОЛД	143
ГАРОНЖ	26

ГЕЗАГАРД	128
ГЕРБИСАН	144
ГЕРБИТОКС	114
ГЕРМЕС	176
ГЕТМАН	120
ГИФФТРОН	103
ГЛИПРОФИ	32
*Глифосат, 360 г/л	32
*Глифосат, 450 г/л	37
*Глифосат, 480 г/л	38
*Глифосат, 500 г/л	39
*Глифосат, 540 г/л	41
*Глифосат, 545 г/л	49
*Глифосат, 550 г/л	50
*Глифосата кислота + 2,4-Д кислота	54
*Глифосата кислота, 687 г/кг	54
*Глифосата кислоты + клопиралид	55
ГЛИФОШАНС СУПЕР	43
ГЛОБАЛ	69
ГЛОК	163
*Глюфосинат аммония	55
ГОАЛ 2Е	121
ГОЛДЕН РИНГ	65
ГОЛТИКС	103
ГОЛТИКС ГОЛД	103
ГРАНАТ	154
ГРАНД	155
ГРАУНД 540	44
ГРЕЙДЕР	75
ГРИМС	134
ГРОЗА	32
ГРОЗА УЛЬТРА	52
ГРОМ	67
ГУСАР АКТИВ ПЛЮС	14
ГУСАР СТАР	80
ГУСАР ТУРБО	78

Д

ДЕЙМОС	61
ДЕЛИК СУПЕР 240	30
ДЕПРИМО	147
*Десмедифам + фенмедифам	55
*Десмедифам + фенмедифам + этофумезат	56
*Десмедифам + фенмедифам + этофумезат + ленацил	61
ДИАМАКС	21
ДИАНАТ	62
ДИВА	18
*Дикамба кислота	61
*Дикамба кислота + никосульфурон	62
*Дикамба кислота + никосульфурон + римсульфурон	63
*Дикамба кислота + римсульфурон	63
*Дикамба кислота + топрамезон	63
*Дикамба кислота + флорасулам	63
*Дикамба кислоты + хлорсульфурон	64
ДИКАСОРН	22
ДИКБАН	62
*Дикват	65
Дикопур Топ	22
*Диметахлор + напропамид + кломазон	65
*Диметенамид-П	65
*Диметенамид-П + тербутилазин	66
*Дифлюфеникан + метрибузин	66
*Дифлюфеникан + метрибузин + флорасулам	66
*Дифлюфеникан + флорасулам + пеноксулам	66
*Дифлюфеникан + флуфенацет + метрибузин	66
ДРОТИК	12
ДУАЛ ГОЛД	141
ДУБЛОН	118
ДУБЛОН Голд	120

Е

ЕНОТ 100	170
----------------	-----

З

ЗЕЛЛЕК СУПЕР	30
ЗЕНКОР УЛЬТРА	107
ЗЕНКОШАНС	107
ЗЕНКОШАНС ГОЛД	134
ЗЕППОС	80
ЗОНТРАН	108

И

*Изопротурон + дифлюфеникан	67
ИЛИОН	96
*Имазамокс	69
*Имазамокс + квинмерак	74
*Имазамокс + метазахлор	75
*Имазамокс + тифенсульфулон-метил	75
*Имазамокс+ аминопирилат + квинмерак	74
*Имазатир	75
*Имазетатир	76
ИМАЗОШАНС	70
*Индазифлам	77
ИРВИН	143

Й

*Йодосульфурон-метил-натрий + дифлюфеникан + мефенпир-диэтил /антидот/	79
*Йодосульфурон-метил-натрий + мезосульфурон-метил + дифлюфеникан + мефенпир-диэтил /антидот/	79
*Йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил (антидот)	78
*Йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + мефенпир-диэтил /антидот/	80
*Йодосульфурон-метил-натрий + мезосульфурон-метил + мефенпир-диэтил /антидот/	80

К

КАЙЕН ТУРБО	151
КАЙМАН ФОРТЕ	54
КАЛАРИС	99
КАЛАШ	142
КАЛИФ	89
КАЛИФ МЕГА	103
КАМАРО	18
КАМЕЛОТ	143
КАМЕЛОТ ТУРБО	144
КАПЕЛЬ	115
КАПРЕНО	147
КАРДИНАЛ 500 КС	99
КАРИ-МАКС	160
КАРИ-МАКС ФЛЮИД	160
*Карфентразон-этил	81
КАССИУС	135
КВИКСТЕП	85
КЕЛЬВИН ПЛЮС	119
КЕНТАВР	165
КИАНИТ	59
КИАНИТ КВАДРО	142
КИЛЕО	54
КИПКОРН	118
КИРАЙ	95
*Клетодим	81
*Клетодим + галоксифоп-Р-метил	85
КЛИОМЕКС ВР	91
*Клодинафоп-пропаргил	87
*Клодинафоп-пропаргил + пиноксаден + клоквиносет-мексил (антидот)	87
*Клодинафоп-пропаргил + флукарбазон натрия + клоквиносент-мексил (антидот)	87
*Кломазон	88
*Клопиралид	90
*Клопиралид + галаксифен-метил	95
*Клопиралид + пиклорам	95

<i>*Клопиралид + пиклорам + аминопиралид</i>	96
<i>*Клопиралид, в виде 2-ЭГЭ + имазамокс</i>	96
КЛОРИТ	91
КЛОФОЦЕТ	88
КОЛЗОР ТРИО	65
КОМПЛИТ ФОРТЕ	67
КОМРАД	60
КОНВИЗО 1	148
КОНДОР	160
КОНДОР ФОРТЕ	160
КОРЛЕОНЕ	62
КОРНЕГИ	148
КОРРСАН	140
КОРСАР СУПЕР	27
КОРТИК	115
КОРУМ	27
КРЕЙЦЕР	121
КРУЦИФЕР	95
КСИОР	166
КУНИЦА	68
КУПАЖ	149

Л

ЛАВИНА	104
ЛАДОН ПРО.....	131
ЛАЗУРИТ	108
ЛАЗУРИТ СУПЕР	109
ЛАЗУРИТ УЛЬТРА	109
ЛАЙФЛАЙН.....	55
ЛАНЦЕЛОТ 450	23
ЛАСТИК ЭКСТРА	160
ЛАУРУК	22
ЛЕКСУС	145
<i>*Ленацил</i>	97
ЛЕОПАРД	170
ЛЕРАШАНС	96
ЛИБРА	151
ЛИДЕР	60
ЛИНТУР	153
ЛИРА	96
ЛОНГАН	91
ЛОНТАГРО	91
ЛОНТЕРР	92
ЛОНТРЕЛ 300	92
ЛОНТРЕЛ ГРАНД.....	92
ЛОРНЕТ	92
ЛЮМАКС	145

М

МАГНАТ	110
МАГНУМ	112
МАИС	135
МАЙОР 300	93
МайсТер Пауэр.....	167
МАКСИ ЗЛАК	81
МАЛИБУ 104 КЭ	31
МАРАФОН	123
МАРАФОН ПЛЮС	124
МАРИУС	104
МАССИФ	68
МАТТЕРА	28
<i>*Мезосульфурон-метил + флуметсулам + флорасулам + мефенпир-диэтил</i>	97
<i>*Мезотрион</i>	98
<i>*Мезотрион + никосульфурон</i>	98
<i>*Мезотрион + никосульфурон + пиклорам</i>	99
<i>*Мезотрион + никосульфурон + тифенсульфурон-метил</i>	99
<i>*Мезотрион + тербутилазин</i>	99
МЕРИНДО	80
<i>*Метазахлор</i>	99

*Метазахлор + аминопиралид + пиклорам	100
*Метазахлор + диметенамид-П	101
*Метазахлор + квинмерак	101
*Метазахлор + квинмерак + диметенамид-П	102
*Метазахлор + кломазон	102
МЕТАМИКС	107
*Метамитрон	103
*Метамитрон + ленацил	106
*Метамитрон + хлорпрофам	107
МЕТАРОН	104
МЕТАТРОН	105
МЕТАФОЛ	105
МЕТЕОР	18
*Метрибузин	107
*Метрибузин + трибенурон-метил	111
МЕТРИБУТ	110
*Метсульфурон-метил	111
*Метсульфурон-метил + трибенурон-метил	113
МИЛАГРО ПЛЮС	63
МИЛАНО	118
МИСТРАЛЬ ТОП	110
МИТРОН	105
МИУРА	171
МОДЕРН ЛЮКС	14
МОДЕРН ПРЕМИУМ	119
МОЛБУЗИН	111
МОМУС	116
МОРИОН	68
МОХОФФ	121
*МЦПА кислота	113

Н

НАНОШАНС	26
НАЦЕТО 3Д	167
НЕРТА	69
НИКОС	118
НИКОСТАР 40 КС	118
*Никосульфурон	118
*Никосульфурон + дикамба + дифлуфензопир	119
*Никосульфурон + римсульфурон	120
*Никосульфурон + тифенсульфурон-метил	120
*Никосульфурон + толпиралат	120
*Никосульфурон + трибенурон-метил + римсульфурон + флорасулам	120
*Никосульфурон + флорасулам + тифенсульфурон-метил	121
*Никосульфурон + флорасулам	121
НОПАСАРАН	75
НОПАСАРАН УЛЬТРА	74
НОПАСАРАН ФЛЕКС	74

О

ОВСЮГЕН СУПЕР	161
ОДИССЕЙ	91
*Оксифлуорфен	121
ОКТАВА	121
ОРЛАН	101
ОЦЕЛОТ	161
ОЦЕЛОТ ПЛЮС	162

П

ПАЛЛАС 45	126
ПАЛЛАС ЭКСТРА 317	126
ПАНТЕРА	168
ПАРАДОКС	71
*Пеларгоновая кислота	121
*Пендиметалин	122
*Пендиметалин + изопротурон	123
*Пендиметалин + пиколинафен	124
*Пендиметалин + тербутилазин	124

*Пендиметалин + хлоротолурон + дифлюфеникан.....	124
ПЕНДИФОРС	122
ПИКСЕЛЬ.....	152
ПИЛАРАУНД ЭКСТРА.....	53
ПИЛАРЛЮКС	99
ПИЛОТ	106
ПИЛОТ ПЛЮС.....	106
*Пиноксаден	124
*Пиноксаден + флорасулам + клоквинтосет-мексил (антидот).....	125
*Пироксулам	126
*Пироксулам + галаксифен-метил + клоквинтосет	126
ПИТОН.....	131
ПЛУГГЕР.....	113
ПОПТРИН	129
ПРЕФЕКТ	136
ПРИМА.....	18
ПРИМА ФОРТЕ 195.....	13
ПРИМАДОННА.....	19
ПРИШАНС	19
ПРИШАНС СУПЕР	15
ПРОМЕТРЕКС ФЛО	129
*Прометрин	127
ПРОНИТ	132
*Пропаквизафон	130
*Пропизохлор.....	131
*Пропизохлор + кломазон	132
*Пропизохлор + тербутилазин	132
*Пропоксикарбазон натрия.....	133
ПРОПОНИТ ДУО.....	132
*Просульфокارب.....	133
*Просульфокارب + метрибузин	134
ПУЛЬСАР	72
ПУЛЬСАР ФЛЕКС.....	73

Р

РАЙДЕР.....	177
РАПУЗИ 500	100
РАССЕЛ 100	163
РАУНДАП МАКС ПЛЮС	37
РАУНДАП ФЛЕКС	38
РАУНДАП ЭКСТРА.....	45
РЕЙСЕР.....	167
РЕПЕР ТРИО	96
*Римсульфурон	134
*Римсульфурон + тифенсульфурон-метил	139
*Римсульфурон+ никоссульфурон+ мезотрион	139
РИФ МАКС.....	140
РОДИМИЧ.....	73
РОДИМИЧ ДУО	75
РОНДО	82

С

САЛЬСА ПРО	176
САМСОН 4 СК.....	119
САМСОН ЭКСТРА	119
САНВОРД ПЛЮС.....	148
САНКОР.....	139
САРМАТ	129
САТИР	136
САТИР ПЛЮС.....	140
САТУРН	119
САТУРН ДУО	98
СЕДИМ 120.....	82
СЕКАТОР ПЛЮС	12
СЕКАТОР ТУРБО.....	22
СЕЛЕКТ	84
СЕРИАЛ.....	97
СИРИУС.....	100
СИРИУС КВИН	102

СКАТ.....	168
СКРИН	106
С.ЛАН 125.....	95
*С-Металахлор.....	141
*С-Металахлор + десмедифам + фенмедифам + этофумезат	142
*С-металахлор + квинмерак.....	142
*С-металахлор + кломазон.....	142
*С-Металахлор + мезотрион	142
*С-Металахлор + тербутилазин.....	143
*С-Металахлор + тербутилазин + мезотрион	144
*С-металахлор+ изоксафлютол	141
СМИЛОДОН	125
СОЙЛ ФЛЮИД	111
СПАРТА	150
СПИКЕР	64
СПЛИТ	66
СПРУТ ЭКСТРА.....	46
СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 330	166
СТАТУС ГРАНД.....	157
СТАТУС КРОС.....	126
СТАТУС ФЛО.....	20
СТЕДФАСТ	120
СТЕДФАСТ ПЛЮС	63
СТЕЛЛАР СТАР.....	63
СТИНГРЕЙ	125
СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ	122
СУЛТАН.....	100
СУЛТАН ТОП.....	102
*Сульфометурон-метил кислота	145
СУПЕРКОРН	99
СУПРАГРАС	20
СУХОВЕЙ.....	65

Т

ТАВАС	66
ТАЛЛЕР	156
ТАМЕРОН СУПЕР.....	111
ТАМЕТ ПЛЮС	157
ТАПИР	76
ТАРАН НЕО	141
ТАРГЕТ СУПЕР	173
*Темботрион + йодосульфурон-метил-натрий + ципросульфамид (антидот).....	147
*Темботрион + тиенкарбазон-метил + изоксадифен-этил /антидот/	147
*Тербутилазин + 2-ЭГЭ 2,4-Д кислота + никосульфурон	148
ТЕРМЕК	145
ТЕРРСАН.....	146
ТЕСПИАН.....	125
*Тиенкарбазон-метил + изоксафлютол + ципросульфамид (антидот).....	148
*Тиенкарбазон-метил + никосульфурон + ципросульфамид	148
*Тиенкарбазон-метил + форамсульфурон	148
ТИМСПРЕЙ	20
ТИНАК	177
ТИТУС	137
ТИТУС ПЛЮС	63
*Тифенсульфурон-метил	149
*Тифенсульфурон-метил + амидосульфурон	149
*Тифенсульфурон-метил + метсульфурон-метил.....	150
*Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил	150
*Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил + флорасулам	151
*Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил + флуметсулам.....	151
*Тифенсульфурон-метил + флуметсулам + флорасулам.....	152
*Толтиралам	153
ТОПКАМА.....	111
ТОПМАЗИН ПЛЮС.....	63
ТОРНАДО	33
ТОРНАДО 500	39
ТОРНАДО 540	48
ТОТАЛ.....	33
ТОТАЛ 480.....	39
ТРАНС Супер	102

ТРЕЙСЕР	90
*Триасульфурон + дикамба	153
ТРИАТЛОН	151
*Трибенурон-метил	154
*Трибенурон-метил + метрибузин + дифлюфеникан	156
*Трибенурон-метил + флорасулам	157
*Трибенурон-метил + флорасулам + метсульфурон-метил	159
ТриБУН	156
ТРИВАЛЬДИ	101
ТРИК-П	124
ТРИНИТИ	124
ТРИУМФ	60
*Трифлусульфурон-метил	160
ТРИЦЕПС	160
ТРОПИНГ 700	159
ТЮДОР 114	121

У

УНИКО	166
УРАГАН ФОРТЕ	40

Ф

ФАЭТОН ТУРБО	120
ФЕМИДА	21
ФЕНИЗАН	64
ФЕНИКС	87
*Феноксапроп-П-этил	160
*Феноксапроп-П-этил + клодинафон-пропаргил + клоквинтосет-мексил (антидот)	162
*Феноксапроп-П-этил + флукарбазон + клоквинтосет-мексил (антидот)	163
ФИКСИТ	66
*Флорасулам	163
*Флорасулам + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-этил (антидот)	163
*Флуазифон-П-бутил	164
*Флукарбазон натрия	165
*Флуметсулам + флорасулам	166
ФЛУОРОН	160
*Флуроксипир + флорасулам	166
*Флуроксипир кислота	166
*Флуорохлоридон	166
*Флуфенацет + аклонифен	167
*Флуфенацет + дифлюфеникан	167
ФОКСТРОТ	162
ФОМДОС	167
*Форамсульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + ципросульфамид	167
ФОРВАРД	174
ФОРКАСТ	79
ФОРТЕКС	49
ФОРТИССИМО	13
ФОРУС	76
ФРАНКОРН	98
ФРЕЙСОРН	33
ФРОНТЬЕР ОПТИМА	65
ФУЛТАЙМ	99
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ	164

Х

ХАКЕР	93
ХАКЕР 300	94
ХАММЕР ДУО	21
ХВАСТОКС 750	117
ХВАСТОКС ЭКСТРА	117
*Хизалофон-П-тефурил(квизалофон-П-тефурил)	168
*Хизалофон-П-этил (квизалофон -П-этил)	170
*Хизалофон-П-этил + имазамокс	176
ХИЛЕР	169
ХИМЕРА	175
ХОРС	119
ХОРС Д	63

Ц	
ЦЕНТУРИОН	83
Ч	
ЧИСТОГРЯД	37
Ш	
ШАНСГАРД	129
ШАНСТАР ПЛЮС	159
ШАНСТРЕЛ 300	94
ШАНТУС	138
ШОГУН	130
Э	
ЭВЕРЕСТ	165
ЭВОКАТ	169
ЭГИДА	98
ЭКЛАТ	141
ЭКСПЕРТ КВАДРО ОФ	61
ЭКСТРАКОРН	144
ЭЛЛАЙ ЛАЙТ	113
ЭЛЮМИС	99
ЭМБАРГО	100
ЭМБОДИ СЕНС	120
ЭНДИМИОН	12
ЭСКВАЙР	149
ЭСКУДО	139
ЭСТАМП	123
ЭСТЕРОН 600	12
ЭСТОК	177
*Этаметсульфурон-метил	176
*Этаметсульфурон-метил + клопиралид + пиклорам	177
ЭФФЕКТ	160
Ю	
ЮНИМАРК	111

Примечание: * - действующее вещество средства защиты растений

ГЕРБИЦИДЫ						
<i>Торговое название, препаративная форма, действующее вещество, заявитель</i>	<i>Норма расхода препарата, л/га, кг/га</i>	<i>Культура, обрабатываемые объекты</i>	<i>Сорная и нежелательная растительность</i>	<i>Способ, время обработки, ограничения</i>	<i>Срок последней обработки (в днях до сбора урожая)</i>	<i>Кратность обработок</i>
2-ЭГЭ 2,4-Д кислота						
ДРОТИК, ККР (2,4-Д кислота, 400 г/л в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 600 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,6-0,8	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		1
	0,6-0,8	Пшеница и ячмень яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		1
	0,8	Кукуруза (кроме семенных посевов)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
	0,6-0,8	Яблоня	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (одуванчик лекарственный, мышиный горошек, хвощ полевой)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период активного роста (при условии защиты культуры)	60	1
ЭНДИМИОН, КЭ (2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 564 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-З)	0,6-0,8	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	60	1
	0,6-0,8	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	60	1
ЭСТЕРОН 600, КЭ (2-ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 600 г/л), Дау АгроСаенсес ВмбХ, Австрия (Р), (П-З)	0,6-0,8	Пшеница озимая и яровая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кушения - выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		1
	0,8	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
2-ЭГЭ 2,4-Д-кислота + амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил (антидот)						
СЕКТОР ПЛЮС, МД (2-ЭГЭ 2,4-Д-кислоты, 433 г/л + амидосульфурон, 25 г/л + йодосульфурон-метил-натрий,	0,3-0,5	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		1
	0,3-0,5	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		1

6,25 г/л + мефенпир-диэтил /антидот/, 62,5 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Ячмень яровой	Однолетние двудольные	То же		1
2-ЭГЭ 2,4-Д-кислота + аминопиралид + флорасулам						
ПРИМА ФОРТЕ 195, СЭ (2-ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 180 г/л + аминопиралид, 10 г/л + флорасулам, 5 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,5	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой)	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	0,5	Тритикале озимая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	То же		1
	0,5	Пшеница, тритикале и ячмень яровые, овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		1
	0,5	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев культуры		1
ФОРТИССИМО, МД (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 200 г/л + аминопиралид, 10 г/л + флорасулам, 5 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,6	Тритикале озимая	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	60	1
	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, бодяк полевой	То же	30	1
	0,4-0,6	Ячмень озимый	Однолетние двудольные, осот полевой	То же	30	1
	0,4-0,6	Рожь озимая	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения выход в трубку (1-2 междоузлия) культуры	30	1
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	60	1
	0,4-0,6	Тритикале яровая	Однолетние двудольные	То же	60	1
	0,4-0,6	Ячмень яровой	То же	То же	30	1
	0,4-0,6	То же	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов в фазу выхода в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		
	0,4-0,6	Овес	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев - кущение культуры	30	1
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
2-ЭГЭ 2,4-Д-кислота + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил (антидот)						

АТЛЕТИК, МД (2,4-Д кислота, 150 г/л в виде сложного 2-этилгексилового эфира + йодосульфурон-метил-натрий, 10 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 30 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и злаковые, осот полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	0,8	Тритикале озимая	Однолетние двудольные и злаковые	То же		1
	1	То же	Однолетние двудольные и злаковые и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	То же		
	0,8-1	Рожь озимая	Однолетние двудольные и злаковые	То же		1
2-ЭГЭ 2,4-Д-кислота + йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + мефенпир-диэтил (антидот)						
ГУСАР АКТИВ ПЛЮС, МД (2-ЭГЭ 2,4-Д-кислоты, 300 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 10 г/л + тиенкарбазон-метил, 7,5 г/л + мефенпир-диэтил /антидот/, 30 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,6-1	Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	30	1
	0,6-1	Тритикале озимая	Однолетние двудольные, метлица обыкновенная, бодяк полевой	То же	30	1
	0,6-1	Рожь озимая	Однолетние двудольные	То же	30	1
	0,4-0,5	Пшеница яровая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
2-ЭГЭ 2,4-Д кислоты + никосульфурон + флорасулам						
МОДЕРН ЛЮКС, СЭ (2-ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 407 г/л + никосульфурон, 140 г/л + флорасулам, 10,1 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
2-ЭГЭ 2,4-Д кислота + пиклорам + флорасулам						
БАЛЕРИНА ФОРТЕ, СЭ (2,4-Д-кислота, 300 г/л в виде сложного 2-этилгексилового эфира + пиклорам, 37,5 г/л + флорасулам, 10 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница и тритикале озимые, пшеница, ячмень и тритикале яровые	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот)	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	0,3-0,5	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры		1
	0,3-0,5	Рожь озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения-выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		1

	0,3-0,5	Просо	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
	0,3-0,4	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
	0,3-0,5	Сенокосы и пастбища	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (дрема, осот полевой)	Опрыскивание вегетирующих сорняков	30	1
2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира + флуроксипир + флорасулам						
ПРИШАНС СУПЕР, СЭ (2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 285 г/л + флуроксипир, 30,5 г/л + флорасулам, 11,5 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,6	Пшеница, тритикале и ячмень озимые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	30	1
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
	0,4-0,6	Кукуруза	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
2-ЭГЭ 2,4-Д кислота + флорасулам						
АССОЛЮТА, МК (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 300 г/л + флорасулам, 5,35 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		1
	0,6	Пшеница озимая	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу выхода в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		
	0,4-0,6	Пшеница и ячмень яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		1
	0,4-0,6	Кукуруза (кроме семенных посевов)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
АССОЛЮТА ПРАЙМ, МК (2,4-Д кислота в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 410 г/л + флорасулам, 15 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,4	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	166	1
	0,3-0,4	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,3-0,4	Тритикале и ячмень озимые	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения - выхода в трубку (до стадии двух 2-х междоузлий)		

	0,3-0,4	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов в фазу кушения		1
	0,3-0,4	Тритикале и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные	То же		1
	0,3-0,4	Просо	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
	0,3	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
АСТЭРИКС, СЭ (2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница озимая	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		1
	0,4-0,6	Тритикале озимая	Однолетние двудольные	То же		1
	0,4-0,6	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		1
	0,4-0,6	Кукуруза (кроме семенных посевов)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
БАЛЕРИНА, СЭ (2,4-Д кислота, 410 г/л в виде сложного эфира + флорасулам, 7,4 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		1
	0,3-0,5	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения - выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		
	0,3-0,5	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры		1
	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые, овес, просо	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		1
	0,3-0,5	Тритикале яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения – выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		1
	0,3-0,5	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
	0,3-0,5	Газоны (злаковые)	То же	Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам после укоса		1

	0,3-0,5	Райграс пастбищный, тимopheевка луговая и фестулолиум при покровном и беспокровном посеве	То же	Опрыскивание в фазу кушения покровной культуры или начиная с фазы 1-2 листьев культуры при беспокровном посеве		1
	0,3-0,5	Бекмания обыкновенная при беспокровном посеве	То же	Опрыскивание начиная с фазы 1-2 листьев культуры при беспокровном посеве		1
	2-4	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Борщевик Сосновского	Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см.		2
БАЛЕРИНА СУ-ПЕР, СЭ (2,4-Д кислота, 410 г/л в виде сложного 2-этилгексилового эфира + флорасулам, 15 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,4	Пшеница и тритикале озимые, пшеница яровая	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		1
	0,3-0,4	Тритикале и ячмень яровые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		1
	0,3	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
БН-001, СЭ (2,4-Д кислоты в виде 2-этилгексилового эфира, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л), РУП «Производственное объединение «Белоруснефть», Беларусь (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры	30	1
	0,3-0,5	Тритикале озимая	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	30	1
	0,3-0,5	Рожь озимая	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	30	1
	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые, овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
	0,3-0,5	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
ВЕНТО, СЭ (2,4-Д 2-этилгексильный эфир, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л),	0,3-0,5	Пшеница, тритикале, рожь и ячмень озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры	30	1

Ардент Агро Лтд., Болгария (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница, ячмень и тритикале яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	0,3-0,5	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
ДИВА, СЭ (2,4-Д кислоты в виде 2-этилгексилового эфира, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ООО «Техноэкспорт», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	0,4-0,6	Пшеница, ячмень и тритикале яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения		1
	0,4-0,6	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев		1
КАМАРО, СЭ (2,4-Д, 300 г/л в виде 2-ЭГЭ, 452,4 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной или осенью в фазу кущения культуры		1
	0,6	Рожь и ячмень озимые	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры		1
	0,4-0,6	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		
	0,4-0,6	Пшеница яровая, овес	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		1
	0,4-0,6	Тритикале и ячмень яровые, просо посевное	Однолетние двудольные	То же		1
	0,4-0,6	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
МЕТЕОР, СЭ (2,4-Д кислоты в виде 2-ЭГЭ, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры	30	1
	0,5	Ячмень озимый	То же	То же		
	0,4-0,6	Пшеница, тритикале и ячмень яровые, овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		1
	0,4-0,6	Кукуруза (кроме семенных посевов), сорго сахарное (на зеленую массу)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
ПРИМА, СЭ (2-ЭГЭ 2,4-Д кислоты, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые, пшеница, тритикале и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения - выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		1
	0,4-0,6	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-7 листьев культуры		1

ПРИМАДОННА, СЭ (2,4-Д кислоты в виде 2-этилгексилового эфира, 200 г/л + флорасулам, 3,7 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница, тритикале и рожь озимые, пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения - выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры	30	1
	0,6-0,8	Пшеница, тритикале, рожь и ячмень озимые	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		
	0,6-0,8	Кукуруза (кроме семенных посевов)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	56	1
ПРИШАНС, СЭ (2,4-Д кислоты в виде сложного 2-этилгексилового эфира, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	30	1
	0,4-0,6	То же	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	56	1
	0,6	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		
	0,4-0,6	Рожь озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры	56	1
	0,6	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		
	0,4-0,6	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	56	1
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	56	1
	0,6	То же	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов в фазу выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		
	0,4-0,6	Ячмень яровой	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	56	1
	0,6	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		

	0,4-0,6	Овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры -выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры	30	1
	0,4-0,6	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
СТАТУС ФЛО, СЭ (2-ЭГЭ 2,4-Д кислота, 418 г/л + флорасулам, 12 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения или весной в фазу кущения культуры - выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий)		1
	0,3-0,5	Тритикале, рожь и ячмень озимые	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры - выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий)		1
	0,3-0,5	Пшеница, тритикале и ячмень яровые, овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	29	1
	0,3-0,5	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
СУПРАГРАС, СЭ (2,4-Д кислота в виде 2-этилгексилового эфира, 300 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	104	1
	0,4-0,6	Пшеница, ячмень и тритикале яровые, овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	0,4-0,6	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
ТИМСПРЕЙ, СЭ (2,4-Д кислота 300 г/л в виде 2-этилгексилового эфира, 452,4 г/л + флорасулам, 6,25 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	104	1
	0,4-0,6	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	0,4-0,6	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
ХАММЕР ДУО, СЭ (2,4-Д-2 этилгексильный эфир, 491,5 г/л + флорасулам, 8,5 г/л), ООО «Альфа Смарт Агро», Украина (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения		1
2-ЭГЭ 2,4-Д кислота + хлорсульфурон						

ФЕМИДА, МД (2,4-Д кислоты, 320 г/л в виде 2-этил- гексилового эфира, + хлорсульфурон, 4,2 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,7-0,8	Пшеница, три- тикале и яч- мень озимые	Однолетние и не- которые много- летние двудоль- ные (осот поле- вой, бодяк поле- вой)	Опрыскивание посе- вов осенью или вес- ной в фазу кущения культуры		1
	0,7-0,8	Пшеница яро- вая	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры		
	0,7-0,8	Ячмень яровой	Однолетние дву- дольные, осот по- левой	То же		
2,4-Д кислота						
2,4-Д, 720 г/л, в.р.к. (2,4-Д кислоты, 720 г/л), Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-З)	1-1,2	Пшеница, три- тикале и рожь озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры	30	1
	0,8-1,2	Пшеница яро- вая	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры		
	1-1,2	Ячмень яровой	То же	То же		
	1-1,2	Кукуруза	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры	60	1
2,4-Д кислота + дикамба кислота						
БИОЛАН СУПЕР, ВР (2,4-Д кислоты, 447 г/л + дикамба кислоты, 156 г/л (ди- метиламинные соли)), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,38-0,54	Пшеница и рожь озимые	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры		1
	0,38-0,46	Пшеница и яч- мень яровые	То же	То же		1
	0,75-1,15	Кукуруза	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры		1
ДИАМАКС, ВР (2,4-Д кислоты, 344 г/л + дикамба кислоты, 120 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-З)	0,5-0,7	Пшеница, три- тикале и рожь озимые	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры	30-48 (зеле- ная масса) 94 (зерно)	1
	0,4-0,5	Пшеница ози- мая	Падалица рапса	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу кущения культуры		
	0,5-0,6	Пшеница яро- вая, ячмень, овес	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры	49 (зеле- ная масса) 74 (зерно)	1
	1-1,5	Кукуруза	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры	48 (зеле- ная масса) 121 (зерно)	1
ДИКАСОРН, ВР (2,4-Д кислоты, 344 г/л + дикамба кислоты, 120 г/л), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь;	0,5-0,7	Пшеница и тритикале ози- мые	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов весной фазу ку- щения культуры		1
	0,5-0,6	Пшеница и яч- мень яровые, овес	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры		1

Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd., Китай (Р), (П-3)	1-1,5	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
Дикопур Топ , ВР (2,4-Д, 344 г/л + дикамба кислоты, 120 г/л), Нуфарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия (Р), (П-3)	0,5-0,7	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	0,5-0,6	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		1
	1-1,5	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
	2	Газоны	То же	Опрыскивание травостоя в фазу кущения газонной травы весной в ранние фазы развития сорных растений		1
ЛАУРУК , ВР (2,4-Д кислоты, 344 г/л + дикамба кислоты, 120 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	0,5-0,7	Тритикале и пшеница озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	81	1
	0,5-0,6	Пшеница и ячмень яровые, овес	То же	То же	81	1
	1-1,5	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	95	1
Амидосульфурон + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил (антидот)						
СЕКТОР ТУРБО , МД (амидосульфурон, 100 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 25 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 250 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,1-0,125	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью с фазы 2 листьев – кущения культуры	30	1
	0,075-0,1	То же	То же	Опрыскивание посевов весной до конца кущения культуры		
	0,1-0,125	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью с фазы 2 листьев – кущения культуры	30	1
	0,075-0,1	Пшеница и ячмень яровые	То же	Опрыскивание посевов с фазы 2 листьев – кущения культуры	30	1
	0,075-0,1	Тритикале яровая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов с фазы 2-х листьев - кущения культуры	30	1
	0,1	Просо	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листа культуры	30	1
	0,075-0,1	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев кукурузы (против мари белой в фазу не более 2-х настоящих листьев сорняка)	60	1

	0,05-0,1	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры (в фазу не более 2-х настоящих листьев мари белой)	75	1
Амикарбазон + мезотрион						
ВИЗИОН , ВДГ (амикарбазон, 280 г/кг + мезотрион, 288 г/кг), Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (Р), (П-З)	0,25-0,3 кг/га + 1 л/га ПАВ Амиго Стар	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
Амикарбазон + мезотрион + никосульфурон + аминопиралид						
АВРОРА , МД (мезотрион, 100 г/л + амикарбазон, 80 г/л + никосульфурон, 60 г/л + аминопиралид, 5 г/л) АО «ФМРус», Россия (Р), (П-З)	1	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры	60	1
Аминопиралид + флорасулам						
ЛАНЦЕЛОТ 450 , ВДГ (аминопиралид, 300 г/кг + флорасулам, 150 г/кг), Дау АгроСаенсес ВмбХ, Австрия (Р), (П-З)	30-33 г/га	Тритикале и рожь озимые, пшеница яровая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот, бодяк)	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры. Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		1
	30-33 г/га	Пшеница озимая, ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения – 2-ое междоузлия культуры включительно. Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		1
	33 г/га	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-5 листьев культуры		1
Бентазон						
БАЗАГРАН , ВР (бентазон, 480 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-З)	2-4	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	2-4	Зерновые с подсевом клевера	То же	Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения зерновых)		1
	2	Зерновые с подсевом люцерны	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазу кущения зерновых)		1

	3	Горох	То же	Опрыскивание посевов в фазу 5-6 листьев культуры		1
	3	Горох овощной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры		1
	0,4	Фасоль спаржевая	То же	Двукратное опрыскивание: первое – в фазу 2-3 настоящих листьев культуры, второе – по мере появления новых всходов сорняков		2
	2-3	Клевер полевой 1-го и 2-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10-15 см)		1
	2	Люцерна 1-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		1
	2	Люцерна посевная второго и последующих лет вегетации	То же	Опрыскивание посевов в фазу стеблевания культуры (высота растений 10-15 см)		1
	2	Галега восточная	То же	Опрыскивание посевов первого года вегетации в фазу 2-3 листьев культуры		1
	1-2	Валериана лекарственная (на сырье)	То же	Опрыскивание плантаций после высадки рассады (в фазу 3-4 листьев культуры) в ранние фазы роста сорняков		1
БАЗАГРАН ПРО, ВР (бентазон, 480 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	1,5-2,5	Пшеница озимая с подсевом клевера	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатого листа клевера (в фазу кущения пшеницы)	30	1
	1,5-2	Горох посевной	Однолетние двудольные, в т.ч. падалица рапса Clearfield	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	43	1
	1,5-2	Соя	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры и ранние фазы развития сорных растений	32	1
	1,5-2	Люцерна первого года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы развития сорных растений	30	1

	1,5-2	Люцерна 2-го и последующих лет вегетации	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов при высоте люцерны 10-15 см	30	1
БЕНИТО , ККР (бентазон, 300 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	2-4	Пшеница, тритикале и рожь озимые с подсевом клевера	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной после развития первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения зерновых)	92	1
	2-4	Ячмень яровой с подсевом клевера	То же	Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения ячменя)		1
	2	Ячмень яровой с подсевом люцерны	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения ячменя и в фазу 1-2 листьев люцерны		1
	2	Бобы кормовые	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры		1
	2	Горох посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 5 листьев культуры		1
	2-3	Горох овощной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры		1
БУНТ , ВР (бентазон, 480 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	2-4	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	94	1
	2-4	Ячмень яровой с подсевом клевера	То же	Опрыскивание посевов после развития первого – второго тройчатого листа клевера (в фазу кущения ячменя)		1
	2	Ячмень яровой с подсевом люцерны	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазу кущения ячменя)		1
	2	Горох посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
	2	Бобы кормовые	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры	79	1
	2-3	Соя	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	30	1
	2-4	Клевер 1-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры	30	1

	3-4	Клевер 2-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры	30	1
	2	Люцерна 1-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры		1
ГАРОНЖ, ВРК (бентазон, 480 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	2	Горох посевной	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
НАНОШАНС, ВР (бентазон, 480 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	2-4	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	86	1
	2-4	Пшеница и ячмень яровые с подсевом клевера	То же	Опрыскивание посевов в фазу первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения зерновых)	30	1
	2	Пшеница и ячмень яровые с подсевом люцерны	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 листьев люцерны (в фазу кущения зерновых)	30	1
	2	Горох посевной	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев культуры	60	1
	3	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу 5-6 листьев культуры		
	2-3	Клевер луговой 1-го и 2-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в период весеннего отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10-15 см)	30	1
Бентазон + имазамокс						
КОРУМ, ВРК (бентазон, 480 г/л + имазамокс, 22,4 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-3)	1-1,5 + 1 л/га ПАВ ДАШ, КЭ	Горох посевной, бобы кормовые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев). На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолинонам		1

	1-1,5 + 1 л/га ПАВ ДАШ, КЭ	Горох овощной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры. На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолиномам	41	1
	1,5 + 1 л/га ПАВ ДАШ, КЭ	Соя	Однолетние двудольные, просо, куриное	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолиномам	35	1
КОРСАР СУПЕР, ВРК (бентазон, 400 г/л + имазамокс, 25 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	1,2-1,6	Горох посевной, бобы кормовые, соя	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев). На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолиномам		1
	1,2-1,6	Клевер 1-го года вегетации	Однолетние двудольные, мятлик, однолетний	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков	31	1
	1,2-1,6	Люцерна 1-го года вегетации	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 1-4 тройчатых листьев культуры и в ранние фазы роста сорняков		1
Бентазон + МЦПА						
БАЗАГРАН М, ВР (бентазон, 250 г/л + МЦПА, 125 г/л),	2,5-3	Ячмень с подсевом клевера	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов после развития первого тройчатого листа клевера (в фазу кущения зерновых)		1

БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	3	Горох посевной	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-3 ли- стьев культуры	30	1
	3	Горох овощной	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-3 ли- стьев культуры		1
	2,5-3	Клевер луговой и ползучий 1-го и 2-го года ве- гетации	То же	Опрыскивание посе- вов в период весен- него отрастания до начала стеблевания культуры (высота 10-15 см)		1
Галаксифен-метил + пиклорам						
БЕЛКАР 58, КЭ (галаксифен-метил, 10 г/л + пиклорам, 48 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,25	Рапс озимый	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2-4 листьев культуры		1
Галаксифен-метил + пиклорам + аминопириалд						
БЕЛКАР ФЛЕКС, КЭ (галаксифен-метил, 10 г/л + пиклорам, 48 г/л + аминопира- лид, 32 г/л), ООО «Кортева Агри- саенс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,2-0,3	Рапс озимый	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2- 4 настоящих листьев культуры		1
Галаксифен-метил + флорасулам + клокви́нтосет						
МАТТЕРА, ВДГ (галаксифен-метил, 104 г/кг + флорасу- лам, 100 г/кг + кло- кви́нтосет, 70,8 г/кг), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	50-60 г/га + 1 л/га ПАВ Серфер, ВРК	Пшеница и яч- мень озимые и яровые	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры		1
	60 г/га + 1 л/га ПАВ Серфер, ВРК	Пшеница ози- мая	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу выхода в трубку		1
	60 г/га + 1 л/га ПАВ Серфер, ВРК	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу выхода в трубку - флаг- листа куль- туры		1
	50-60 г/га + 0,2 л/га ПАВ Виволт, Ж	Пшеница и тритикале ози- мые	Однолетние дву- дольные, бодяк полевой	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры	69	1

	50-60 г/га + 0,2 л/га ПАВ Виволт, Ж	То же	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов весной в фазу выход в трубку куль- туры		
Галоксифоп-Р-метил						
ГАЛАКТИОН, КЭ (галоксифоп-Р-метил, 104 г/л), ООО Группа Компа- ний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,5	Свекла сахар- ная	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев сорняков		1
	1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,5	Рапс озимый и яровой, карто- фель	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-6 ли- стьев сорняков		1
	1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,4	Горох	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев у сорняков		1
	1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
ГАЛЛОН, КЭ (галоксифоп-Р-метил, 104 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,5	Лен-долгунец, рапс яровой	Просо куриное	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев у однолетних сорняков	62 (се- мена, масло -	1
	1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см	лен- долгу- нец) 81 (се- мена, масло -	
	0,5	Свекла сахар- ная	Просо куриное	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев у однолетних сорняков	рапс яро- вой)	1
	1	Рапс озимый, свекла сахарная	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
ГАЛОШАНС, КЭ (галоксифоп-Р-метил, 104 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,5	Рапс озимый	Однолетние зла- ковые в т.ч. пада- лица зерновых	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев у сорняков	60	1
	1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		

	0,5	Рапс яровой, свекла сахарная, подсолнечник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у сорняков		1
	1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,5	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у сорняков		1
	0,5	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у сорняков	75	1
	1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
ДЕЛИК СУПЕР 240, КЭ (галооксифоп-Р-метил, 240 г/л), ДВА Агро ГмбХ/ DVA Agro GmbH, Германия (Р), (П-З)	0,3	Картофель, свекла сахарная и кормовая	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,3	Рапс озимый	Падалица зерновых	Опрыскивание посевов в фазу кущения зерновых		1
	0,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,3	Рапс яровой	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев сорняков		1
	0,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
ЗЕЛЛЕК СУПЕР, КЭ (галооксифоп-Р-метил, 104 г/л), Дау Агро Саенсес, Австрия (Р), (П-З)	0,5	Картофель, рапс яровой	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у сорняков		1
	1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	1	Свекла сахарная	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	0,5	Лен-долгунец	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у сорняков		1
	1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		

	0,4	Горох (семенные посевы)	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у сорняков		1
	1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
МАЛИБУ 104 КЭ (галооксифоп-Р-метил, 104 г/л), INTERNACIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V., Мексика (Р), (П-3)	0,5	Гречиха	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков	20	1
	1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,5	Рапс озимый и яровой	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков	40	1
	1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,5	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у сорняков	138	1
	1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,5	Свекла столовая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у сорняков	20	1
	1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4	Горох посевной	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у сорняков	20	1
	1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,5	Подсолнечник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков	60	1
	1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,5	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков	63	1

	1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
Глифосат, 360 г/л						
АРГУМЕНТ, ВР (глифосата кислоты, 360 г/л в виде изопропиламинной соли, 480 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	2-3	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
ГЛИПРОФИ, ВР (калийная соль N-(фосфонометил) глицина, 441 г/л или глифосата кислоты, 360 г/л), Bayer Agriculture BV, Бельгия (П-З)	2	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	4	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	То же		
ГРОЗА, ВР (глифосат, 360 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (П-З)	2-4	Яблоня	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)		1
	4-8	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	4-6	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		

	3-6	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо - и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние	То же		1
ТОРНАДО, ВР (глифосата кислоты /в виде изопропиламинной соли/, 360 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	4-6	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
ТОТАЛ, ВР (глифосата кислоты /в виде изопропиламинной соли/, 360 г/л), ООО «Агро Эксперт-Груп», Россия (Р), (П-3)	2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	4-6	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
ФРЕЙСОРН, ВР (глифосата кислоты, 360 г/л), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь; Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd, Китай (Р), (П-3)	2-5	Свекла сахарная, кукуруза	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры		1
	1,5-2	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры		1
	3-4	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий и двудольные	То же		
	0,6-0,8	Люцерна	Повилика тонкостебельная	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса		1
	2-4	Плодовые, виноград	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)		1

	4-8	Плодовые	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	4	Виноград	То же	Двукратное опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры)		2
	2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста, в т. ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5-6 л/га		1
	4-6	То же	Многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста, в т. ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5-6 л/га		
	6-8	То же	Бодяк полевой, вьюнок полевой	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		
	3-6	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	2-8	То же	Все виды сорняков, листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива и др.)	Наземное и авиационное опрыскивание растений в июне-августе		
	8-10	Открытая коллекторно-дренажная и оросительная системы	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (рогоз, тростник и др.)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле-сентябре		1

	3-5	То же	То же	Повторное опрыскивание на следующий год оставшихся вегетирующих сорняков		1
	1-1,2	Клюква крупноплодная	Лапчатка гусиная	Опрыскивание в период вегетации, после закладки цветочных почек у клюквы (1 декада августа)	65	1
	2-2,5	То же	Однолетние и многолетние злаковые, ситниковые и двудольные	Сплошное опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки урожая		1
	4	Брусника садовая	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание и аппликация в период вегетации	70	2
	3	Шиповник	То же	На неплодоносящих плантациях, начиная с двухлетнего возраста, опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры)		1
	4-5	То же	То же	Опрыскивание плодоносящих плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры)		1
	3	Облепиха	То же	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом неплодоносящих плантаций, начиная с двухлетнего возраста (при условии защиты культуры)		1
	4-5	То же	То же	Опрыскивание плодоносящих плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры)		1
	2-8	Посевы и посадки ели в питомниках	То же	Опрыскивание после окончания роста сеянцев и саженцев		1
	2-8	Паровые поля питомников	То же	Опрыскивание растений в июне-августе		1
	2-8	Лесокультурные площади	Однолетние, многолетние лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.)	Опрыскивание растений в июне-августе при подготовке площадей под культуры хвойных и лиственных пород		1

	2-8	Ель	То же	Опрыскивание растений после окончания роста хвойных пород		1
	2-8	Лиственные, лиственно-хвойные молодняки	Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.)	При реконструкции малоценных молодняков и уходе за составом смешанных молодняков наземное и авиаопрыскивание растений в июне-августе, в смешанных молодняках – после окончания роста хвойных пород		1
	2-8 (0,2-0,4 г д.в./дереву)	Лиственные и лиственно-хвойные древостои	Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.)	Инъекция в стволы нежелательных пород в июне-августе		1
	2-8	Слабо и сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища	Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.)	Наземное и авиационное опрыскивание растений в июне-августе		1
	1-2,6 (1,5-3 г д.в./дереву)	Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава	Осина	Инъекция в стволы деревьев в июне-августе		1
ЧИСТОГРЯД , ВР (глифосата кислоты, 360 г/л), ООО «Ваше хозяйство», Россия (Р), (П-3)	5-7,5	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	5-7,5	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	То же	То же		1

	7,5-15	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые; лиственные древесно-кустарниковые породы	То же		1
Глифосат, 450 г/л						
РАУНДАП МАКС ПЛЮС, 45% в.р. (калийная соль N-(фосфонометил) глицина, 551 г/л или глифосата кислоты, 450 г/л), Bayer Agriculture BV, Бельгия (Р), (П-3)	1,2-2	Лен-долгунец	Однолетние двудольные и некоторые злаковые	По разостланной в лентах соломе		1
	1,2	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры		1
	3	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	1,2-2	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	2-3,5	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	5-6	То же	Бодяк полевой, выюнок полевой	То же		
	1,2-2	Поля, предназначенные под посев различных культур	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной и/или осенью в период их активного роста		1-2
	3,5	(после уборки однолетних зерновых, технических, кормовых и др. культур), возделываемых при минимальной технологии обработки почвы	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые			

	2,4-4,8	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние	То же		1
	6,4	То же	Все виды сорняков, листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива и др.)	Наземное и авиационное опрыскивание растений в июне-августе		
	4,8-6,4	Открытая коллекторно-дренажная и оросительная системы	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (рогоз, тростник и др.)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в период их активного роста		1
Глифосат, 480 г/л						
РАУНДАП ФЛЕКС, ВР (калийная соль N-(фосфометил) глицина, 588 г/л или глифосата кислоты, 480 г/л), Bayer Agriculture BV, Бельгия (П-3)	2	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	4	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	То же		
ТОТАЛ 480, ВР (глифосата кислота, 480 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	1,5-3	Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в июле-августе		1
	3	То же	То же, в т.ч. гидрофитные: рогоз, тростник	То же		

	1,5-2	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	2-3	То же	Многолетние злаковые и двудольные	То же		
	2,2	То же	Пырей ползучий, осот полевой	То же		
	3	То же	Бодяк полевой, чистец болотный и др.	То же		
	2-3	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо - и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	То же		1
	2-4	То же	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	То же		
Глифосат, 500 г/л						
ТОРНАДО 500, ВР (глифосата кислоты /в виде изопропиламинной соли/, 500 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1,5-2	Лен-долгунец	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков по разостланной в лентах соломе		1
	2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1

	2-4	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо - и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	То же		1
	4-5,5	То же	Однолетние и многолетние сорняки, (в т.ч. золотарник канадский), лиственные, древесно-кустарниковые породы	То ж		
	5	То же	Борщевик Сосновского	Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см		3
	1,5-2	Лекарственные растения	Однолетние, многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры по вегетирующим сорнякам		1
УРАГАН ФОРТЕ, ВР (глифосата кислоты, 500 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	1,5-2	Картофель	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры		1
	2-4	Яблоня (сады старше 3-х лет)	То же	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период активного роста (при условии защиты культуры)	7	1
	1,5-2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	2,5-4	То же	Многолетние злаковые и двудольные	То же		

	2	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	3-4	То же	Многолетние двудольные и злаковые; лиственные древесно-кустарниковые породы	То же		
Глифосат, 540 г/л						
АРГУМЕНТ СТАР, ВР (глифосата кислоты, 540 г/л или в виде калиевой соли, 665 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко, Лтд, Китай (Р), (П-З)	1,8	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные и др.)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	2,6	То же	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	То же		
	1,8-2,6	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	2,6-5,3	Слабо и сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища	Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, тополь и др.)	То же		

АРИСТОКРАТ СУ- ПЕР, ВР (глифосат (в виде калийной соли), 540 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	1,3	Свекла сахарная, кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры в системе нулевой обработки почвы (No-Till)		1
	3,3	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	1,3-2	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков до появления всходов культуры		1
	2-2,7	То же	Многолетние двудольные и злаковые, в т.ч. пырей ползучий	То же		
	1,3-2,7	Яблоня	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом в садах старше 3-х лет (при условии защиты культуры)		1
	2,7-5,3	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	1,8	Поля, предназначенные под посев различных культур (после уборки однолетних зерновых, картофеля, технических, кормовых и др.)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	3,1	То же	Однолетние и некоторые многолетние двудольные и злаковые	То же		
	3,7	То же	Однолетние и многолетние двудольные (бодяк полевой, щавель конский, мята полевая) и злаковые (пырей ползучий)	То же		

	1,8	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	3,7-5,3	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые, в т.ч. золотарник канадский; листовенные, древесно-кустарниковые породы	То же		
	4,1-5,1	То же	Борщевик Сосновского	Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см		
	1,3	Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание сорняков в период их активного роста		1
	3,7-5,1	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые, в т.ч. гидрофитные (рогоз, камыш и др.)	То же		
ГЛИФОШАНС СУПЕР, ВР (глифосата кислоты (калиевая соль), 540 г/л) ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	1,4-2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные и др.)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	2,5-4	То же	Многолетние злаковые и двудольные	То же		

ГРАУНД 540, ВР (глифосата кислоты, 540 г/л), ООО «Техноэкспорт», Россия (Р), (П-3)	1,4-2,5	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и другие)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	2,5-4	То же	Однолетние двудольные и злаковые, осот полевой	То же		
	4	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	1,4	Земли несельскохозяйственного пользования (трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы, контрольно-следовые полосы и другие промышленные объекты) и в населенных пунктах	Мелколепестник канадский, вейник	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в период их активного роста		1
	2-3	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в период их активного роста		
	5	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые; лиственные древесно-кустарниковые породы	То же		
ВОЛЬНИК, ВР (глифосата кислоты, 540 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	1,3-2,7	Яблоня	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	30	1
	2,7-5,3	То же	Многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)		

	1,5-1,8	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	1,8-3,5	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	3,5-5,3	То же	Бодяк полевой, выюнок полевой и др.	То же		
	2-4	Земли сельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
РАУНДАП ЭКСТРА, ВР (N- (фосфонометил) глицина, 540 г/л или в виде калийной соли N-(фосфонометил) глицина, 663 г/л), Bayer Agriculture BV, Бельгия (Р), (П-3)	1-1,8	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	1,8-3,5	То же	Многолетние злаковые и двудольные	То же		
	4-5,3	То же	Бодяк полевой, выюнок полевой	То же		

	2-3,3	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние	То же		1
	5,5	То же	Все виды сорняков, листовые древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива и др.)	Опрыскивание растений в июне-августе		
СПРУТ ЭКСТРА, ВР (глифосата кислоты /в виде калийной соли/, 540 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (П-3)	1,8	Свекла сахарная	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры		1
	1-1,3	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры		1
	1,3-1,8	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий, и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры		
	1,3-2,7	Яблоня	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста (при условии защиты культуры)	126	1
	2,7-5,3	То же	Многолетние двудольные и злаковые			
	1,3-1,8	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	1,8-2,2	То же	Пырей ползучий	То же		
	2,2-2,6	То же	Многолетние злаковые и двудольные в т.ч. пырей ползучий, осот полевой	То же		

	3,1-3,5	То же	Многолетние злаковые и двудольные в т.ч. бодяк полевой, чистец болотный	То же		
	1,8-3,5	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Авиационное опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5-6 л/га		
	1,3-3,7	Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем	То же	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	3,7-5,2	То же	То же, в т.ч. гидрофитные (рогоз, тростник и др.)	То же		
	1,8-3,5	Земли не сельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо - и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние	То же		1
	3,5-5,3	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые, в т.ч. золотарник канадский; лиственные древесно-кустарниковые породы	То же		
	3,5-5,1	То же	Борщевик Сосновского	Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см		2
	3,5-5	Рыбохозяйственные водоемы	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (камыш, рогоз, тростник)	Наземное и авиационное опрыскивание, в т.ч. методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-7 л/га, по вегетирующим сорнякам в июле-сентябре		1

ТОРНАДО 540, ВР (глифосата кислоты / в виде калиевой соли/, 540 г/л), АО Фирма «Август», Россия (П-3)	1,8	Поля, предназна- ченные под посев различ- ных культур (яровые зерно- вые, картофель, овощные, тех- нические, мас- личные и др.)	Однолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание веге- тирующих сорняков в период их актив- ного роста		1
	2,6	То же	Однолетние и многолетние зла- ковые и двудоль- ные, в т. ч. пырей ползучий, осот полевой	То же		
	3,7-5,3	То же	Многолетние зла- ковые и двудоль- ные, в т.ч. бодяк полевой, вьюнок полевой, чистец болотный и др.	То же		
	1,8-3,7	Земли несель- скохозяйствен- ного пользова- ния (полосы от- чуждения ли- ний электропе- редач, трассы газо- и нефте- проводов, насыпи желез- ных и шоссей- ных дорог, аэродромы и др. промышлен- ные террито- рии) и в насе- ленных пунк- тах	Однолетние и многолетние	Опрыскивание веге- тирующих сорняков в период их актив- ного роста		1
	3,7-5,3	То же	Однолетние и многолетние, в т.ч. золотарник канадский; лист- венные, древесно- кустарниковые породы	Опрыскивание веге- тирующей нежела- тельной раститель- ности в период ее ак- тивного роста		
	3,7-5	Рыбохозяй- ственные водо- емы	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (камыш, рогоз, тростник)	Наземное и авиаци- онное опрыскивание методом, в т.ч. мето- дом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-7 л/га, опрыскивание по ве- гетирующим сорня- кам в июле-сентябре		1

ФОРТЕКС, ВР (глифосата кислоты, 540 г/л или в виде ка- лийной соли, 660 г/л), Ардент Агро Лтд., Болгария (П-З)	1,3-1,8	Поля, предна- значенные под посев различ- ных культур (яровые зерно- вые, картофель, овощные, тех- нические, мас- личные, лекар- ственные и др.)	Однолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание веге- тирующих сорняков в период их актив- ного роста		1
	2,2	То же	Пырей ползучий	То же		
	2,2-2,6	То же	Многолетние зла- ковые и двудоль- ные	То же		
	3-3,5	То же	Многолетние зла- ковые и двудоль- ные в т.ч. бодяк полевой, чистец болотный	То же		
<i>Глифосат, 545 г/л</i>						
ВОЛЬНИК СМАРТ, ВР (глифосат, 545 г/л), ООО «Франдеса», Бе- ларусь (П-З)	1,3-1,8	Поля, предна- значенные под посев различ- ных культур (яровые зерно- вые, картофель, овощные, тех- нические, мас- личные, лекар- ственные и др.)	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание веге- тирующих сорняков в период их актив- ного роста		1
	2,2	То же	Пырей ползучий, осот полевой	То же		
	2,2-2,6	То же	Многолетние дву- дольные и злако- вые	То же		
	1,8-2,6	Земли несель- скохозяйствен- ного пользова- ния (полосы от- чуждения ли- ний электропе- редач, трассы газо- и нефте- проводов, насыпи желез- ных и шоссей- ных дорог, аэродромы и др. промыш- ленные терри- тории) и в насе- ленных пунк- тах	Однолетние дву- дольные, одно- летние и много- летние злаковые	То же		1
	2,6	То же	Осот полевой	То же		

	4-4,5	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые; лиственные древесно-кустарниковые породы	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в период ее активного роста		1
Глифосат, 550 г/л						
ВОЛЬНИК СУПЕР, ВР (глифосата кислоты, 550 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (П-3)	1-1,3	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры		1
	2	То же	Осот полевой	То же		
	2,6	То же	Многолетние двудольные и злаковые, в т.ч. пырей ползучий	То же		
	1,3	Плодовые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)		1
	5,2	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	1,5-3	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	1,5-3 + 0,2 л/га ПАВ Нью Филм-17	То же	То же	То же		
	3,6	То же	Бодяк полевой, вьюнок полевой, чистец болотный	То же		
	3,6 + 0,2 л/га ПАВ Нью Филм-17	То же	То же	То же		

	2	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние двудольные и злаковые	То же		1
	3,9	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	5,2	То же	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые, лиственные древесно-кустарниковые породы	Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности в период их активного роста		
	4-5	То же	Борщевик Сосновского	Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см		3
	1,3-5	Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (рогоз, тростник и др.)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле-августе		1
	3,6-4,5	Рыбохозяйственные водоемы	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (камыш, рогоз, тростник и др.)	Наземное и авиационное опрыскивание, в т.ч. методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-7 л/га, опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле - сентябре		1
	1,3-5,2	Слабо и сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища	Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.)	Наземное и авиационное опрыскивание растений, в т.ч. методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-10 л/га в июне-августе		1
	1,3	Клюква крупноплодная	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая		1
	1,6	То же	Однолетние и многолетние двудольные, хвощовые, осока заячья	То же		

ГРОЗА УЛЬТРА, ВР (глифосата кислоты, 550 г/л), ОАО «Гроднорай- агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	1-1,3	Картофель	Однолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание веге- тирующих сорняков до всходов культуры	96	1
	2 -2,6	То же	Многолетние зла- ковые и двудоль- ные	То же		
	1,3-3,3	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые и двудоль- ные	То же	60	1
	1,3	Плодовые	Однолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание веге- тирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	68	1
	5,2	То же	Многолетние зла- ковые и двудоль- ные	То же		
	1,3-1,8	Поля, предна- значенные под посев различ- ных культур (яровые зерно- вые, картофель, овощные, тех- нические, мас- личные, лекар- ственные и др.)	Однолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание веге- тирующих сорняков в период их актив- ного роста		1
	2,2	То же	Пырей ползучий	То же		
	2,2-2,6	То же	Многолетние зла- ковые и двудоль- ные	То же		
	1,8-2,6	Земли несель- скохозяйствен- ного пользова- ния (полосы от- чуждения ли- ний электропе- редач, трассы газо- и нефте- проводов, насыпи желез- ных и шоссей- ных дорог, аэродромы и др. промышлен- ные террито- рии)	Однолетние и многолетние зла- ковые и двудоль- ные	То же		1
	4-5	То же	Борщевик Сос- новского	Опрыскивание при высоте борщевика Сосновского до 30 см		
	1,3-5	Открытая кол- лекторно-дре- нажная и оро- сительная си- стемы	Однолетние и многолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание сор- няков в период их активного роста		1

	3,6-4,5	Рыбохозяйственные водоемы	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (камыш, рогоз, тростник и др.)	Авиационное опрыскивание-методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-7 л/га, опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле - сентябре		1
ПИЛАРАУНД ЭКСТРА, ВР (550 г/л глифосата кислоты, или в виде калийной соли –N-(фосфонометил) глицина, 673 г/л), Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1,5-3	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	3,6	То же	Бодяк полевой, вьюнок полевой	То же		
	2-3,9	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	То же		1
	4-5	То же	Борщевик Сосновского	Опрыскивание при высоте борщевика до 30 см		
	1,3-5	Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (рогоз, тростник и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1

	5,2	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждений линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые; лиственные древесные и кустарниковые породы	Опрыскивание в период активного роста вегетирующих сорняков и нежелательных лиственных древесных и кустарниковых пород		1
Глифосата кислота, 687 г/кг						
КАЙМАН ФОРТЕ, ВДГ (глифосата кислоты /в виде изопропиламинной соли/, 687 г/кг), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	1,5-3	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		1
	3	То же	Многолетние двудольные и злаковые	То же		
	2-3,5	Земли сельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	То же		1
Глифосата кислота + 2,4-Д кислота						
КИЛЕО, ВРК (глифосата кислоты, 240 г/л + 2,4-Д, кислоты 160 г/л), Нуфарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия (Р), (П-3)	4-5	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков летом или осенью в послеуборочный период		1

	5	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	То же	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период активного роста		1
	4	Плодовые (сады старше 3-х лет)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые, хвощ полевой	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период активного роста (при условии защиты культуры)	60	1
Глифосата кислоты + клопиралид						
ВОЛЬНИК ДУО, ВР (глифосата кислоты, 450 г/л + клопиралид, 15 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	2	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, картофель, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста		1
	2,2	То же	Многолетние двудольные	То же		
Глюфосинат аммония						
БАСТА, ВР (глюфосинат аммония, 150 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	2	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посадок до всходов культуры по вегетирующим сорнякам		1
	2,5	То же	Однолетние двудольные и злаковые, осот полевой	То же		
	2-3,5	Яблоня, груша	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной и летом (при условии защиты культуры)		2-3
ЛАЙФЛАЙН, ВР (глюфосинат аммония, 280 г/л), ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	1,1-1,8	Яблоня	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков (при условии защиты культуры)	9	2-3
Десмедифам + фенмедифам						

БЕЛЬВЕДЕР, СЭ (десмедифам, 160 г/л + фенмедифам, 160 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная, столовая и кормовая <i>(не более 3л/га)</i>	Однолетние двудольные	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых сорняков в ту же фазу		3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе – по мере появления новых сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
Десмедифам + фенмедифам + этофумезат						
БЕЛЬВЕДЕР ФОРТЕ, СЭ (десмедифам, 100 г/л + фенмедифам, 100 г/л + этофумезат, 200 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	0,7	Свекла сахарная, столовая и кормовая <i>(не более 3 л/га)</i>	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье - по мере появления новых сорняков в ту же фазу		3
	1,1		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе - по мере появления новых сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ, КЭ (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + этофумезат, 112 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная, кормовая <i>(не более 3 л/га)</i>	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье - по мере появления новых сорняков в ту же фазу		3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое в фазу 2-4 листьев сорняков; второе по мере появления сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1

	3	Земляника садовая	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков до цветения земляники или после сбора урожая	26	1
БЕТАРЕН МАКС, МД (этофумезат, 126 г/л + десмедифам, 80 г/л + фенмедифам, 64 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	1	Свекла сахарная (не более 3 л/га)	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье по мере появления новых сорняков в ту же фазу	90	3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе - по мере появления сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
БЕТАРЕН СУПЕР МД, МКЭ (десмедифам, 21 г/л + фенмедифам, 63 г/л + этофумезат, 126 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	1	Свекла сахарная и кормовая (не более 3,2 л/га)	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье по мере появления новых сорняков в ту же фазу		3
	1,6		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе - по мере появления сорняков в ту же фазу		2
	3,2		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
	0,8	Гречиха	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-го настоящего листа культуры		1
БЕТАРЕН ЭКС-ПРЕСС АМ, КЭ (десмедифам, 60 г/л + фенмедифам, 60 г/л + этофумезат, 60 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	1,5	Свекла сахарная и кормовая (не более 4,5 л/га)	Однолетние двудольные и некоторые злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье - с интервалом 7-14 дней		3
	2-2,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе - по мере появления новых сорняков в ту же фазу		2

	4,5		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
БЕТАШАНС ТРИО, КЭ (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + этофумезат, 112 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная (не более 3 л/га)	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье - с интервалом 7-14 дней	60	3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое в фазу 2-4 листьев сорняков; второе - по мере появления сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
БЕТРИСАН, КЭ (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + этофумезат, 112 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная (не более 3 л/га)	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье - по мере появления сорняков в ту же фазу	116	3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе - по мере появления сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Опрыскивание в фазу 4 листьев культуры		1
БИТЕКС, КЭ (десмедифам, 16 г/л + фенмедифам, 62 г/л + этофумезат, 128 г/л), UPL EUROPE LTD, Великобритания (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная, столовая и кормовая (не более 3 л/га)	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье по мере появления новых сорняков		3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе - по мере появления новых сорняков		2
	3		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1

БИФОР ПРО-ГРЕСС, КЭ (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + этофумезат, 112 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная, столовая и кормовая (не более 3 л/га)	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых сорняков в ту же фазу		3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе – по мере появления новых сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
БИЦЕПС гарант, КЭ (десмедифам, 70 г/л + фенмедифам, 90 г/л + этофумезат, 110 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,75	Гречиха	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-го настоящего листа культуры		1
	1	Свекла сахарная (не более 3 л/га)	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье по мере появления новых сорняков в ту же фазу		3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе – по мере появления новых сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
	3	Земляника садовая	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	Опрыскивание вегетирующих сорняков до цветения культуры		1
КИАНИТ, КЭ (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + этофумезат, 112 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная, столовая и кормовая (не более 3 л/га)	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых сорняков в ту же фазу		3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое – в фазу 2-4 листьев сорняков; второе – по мере появления сорняков в ту же фазу		2

	3		То же	Опрыскивание в фазу 4-х листьев свеклы		1
КОМРАД, КЭ (этофумезат, 112 г/л + фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л), Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная <i>(не более 3 л/га)</i>	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления сорняков в ту же фазу	60	3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое в фазу 2-4 листьев сорняков; второе – по мере появления сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
	1	Свекла столовая	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления сорняков в ту же фазу	60	3
ЛИДЕР, КЭ (десмедифам, 71 г/л + фенмедифам, 91 г/л + этофумезат, 112 г/л), ООО «Техноэкспорт», Россия (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная <i>(не более 3 л/га)</i>	Однолетние двудольные	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых сорняков	97	3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое в фазу 2-4 листьев сорняков; второе по мере появления сорняков		2
	3		То же	Опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1
ТРИУМФ, КЭ (этофумезат, 112 г/л + фенмедифам, 91 г/л + десмедифам, 71 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1	Свекла сахарная и столовая <i>(не более 3 л/га)</i>	Однолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые	Трехкратное опрыскивание: первое в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье по мере появления новых сорняков в ту же фазу	106	3
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - в фазу 2-4 листьев сорняков; второе - по мере появления сорняков в ту же фазу		2
	3		То же	Однократное опрыскивание в фазу 4 листьев свеклы		1

Десмедифам + фенмедифам + этофумезат+ ленацил						
БЕТАНАЛ МАКСПРО,МД (десмедифам, 47 г/л + фенмедифам, 60 г/л + этофумезат, 75г/л + ленацил, 27 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	1,25-1,5	Свекла сахар- ная (не более 4,5 л/га)	Однолетние дву- дольные и неко- торые однолетние злаковые	Трехкратное опрыс- кивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления но- вых сорняков в ту же фазу		3
	1,75-1,9		То же	Двукратное опрыс- кивание: первое - в фазу 2-4 листьев сор- няков; второе - по мере появления сор- няков в ту же фазу		2
ЭКСПЕРТ КВАДРО ОФ, МСК (этофумезат, 110 г/л + фенмедифам, 90 г/л + десмедифам, 70 г/л + ленацил, 40 г/л), ООО Группа Компа- ний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	1	Свекла сахар- ная (не более 3,5 л/га)	Однолетние дву- дольные и неко- торые однолетние злаковые	Трехкратное опрыс- кивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления но- вых сорняков		3
	1,5-1,75		То же	Двукратное опрыс- кивание: первое – в фазу 2-4 листьев сор- няков; второе – по мере появления сор- няков		2
Дикамба кислота						
ВИКИНГ, ВР (дикамба кислота, 480 г/л), Ардент Агро Лтд, Болгария (П-3)	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 куль- туры	60	1
ДЕЙМОС, ВРК (дикамба кислоты в виде диметиламинной соли, 480 г/л), АО Фирма «Август», Россия (П-3)	0,5	Газоны	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание тра- востоя по вегетирую- щим сорным расте- ниям через 3-5 дней после укуса газона		1
	3	Земли несель- скохозяйствен- ного пользова- ния (полосы от- чуждения ли- ний электропе- редач, трассы газо - и нефте- проводов, насыпи желез- ных и шоссей- ных дорог, аэродромы и др. промыш- ленные терри- тории)	Однолетние и многолетние дву- дольные	Опрыскивание веге- тирующих сорняков в период их актив- ного роста		1

ДИАНАТ, ВР (дикамба кислоты, 480 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс ЮС ЛЛК, США (Р), (П-3)	0,15-0,3	Пшеница и рожь озимые	Однолетние двухдольные	Применяется самостоятельно или в качестве добавки к 2,4-Д и 2М-4Х при опрыскивании посевов в фазу кущения культуры	46	1
	0,15-0,3	Пшеница яровая, ячмень, овес, просо	То же	То же	35	1
	0,4-0,8	Кукуруза	Однолетние двухдольные	Применяется самостоятельно или в качестве добавки к 2,4-Д при опрыскивании посевов в фазу 3-5 листьев культуры	56 (зеленая масса) 96 (зерно)	1
	0,2-0,3	Поля, предназначенные под посев различных культур, а также однолетних цветочных культур (семенные посевы)	Однолетние и многолетние	Опрыскивание сорняков осенью в послеуборочный период, как добавка к глифосатсодержащим гербицидам		1
ДИКБАН, ВК (дикамба кислоты, 480 г/л), ООО «Белхимпродукт», Беларусь (Р), (П-3)	0,15-0,3	Ячмень яровой	Однолетние двухдольные	Применяется самостоятельно или в качестве добавки к 2,4-Д и 2М-4Х при опрыскивании посевов в фазу кущения культуры	24	1
	0,4-0,8	Кукуруза	То же	Применяется самостоятельно или в качестве добавки к 2,4-Д при опрыскивании посевов в фазу 3-5 листьев культуры	35	1
	0,2-0,3	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние двухдольные и злаковые	Опрыскивание сорняков осенью в послеуборочный период, как добавка к глифосатсодержащим гербицидам		1
Дикамба кислота + никосульфурон						
КОРЛЕОНЕ, КЭ (дикамба кислоты в виде диметиламинной соли, 420 г/л + никосульфурон, 80 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,6	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двухдольные, пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 3-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см		1

МИЛАГРО ПЛЮС, МД (дикамба, 220 г/л + никосульфурон, 50 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	0,8-1	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой)	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
ХОРС Д, КС (дикамба, 200 г/л + никосульфурон, 50 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,8-1,2	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
Дикамба кислота + никосульфурон + римсульфурон						
СТЕДФАСТ ПЛЮС, ВДГ (дикамба кислоты, 550 г/кг + никосульфурон, 92 г/кг + римсульфурон, 23 г/кг), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-З)	0,33-0,44 + 200 мл/га ПАВ Виволт	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание в фазу 2-5 листьев культуры	90 (зеленая масса) 125 (зерно)	1
	0,44 + 200 мл/га ПАВ Виволт	То же	То же, а также многолетние злаковые и некоторые многолетние двудольные	То же		
Дикамба кислота + римсульфурон						
ТИТУС ПЛЮС, ВДГ (дикамба кислоты (в виде диметиламинной соли), 609 г/кг + римсульфурон, 32,5 г/кг), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-З)	310-385 г/га + 200 мл/га ПАВ Виволт	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры в период 2-4 листьев у двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см		1
Дикамба кислота + топрамезон						
СТЕЛЛАР СТАР, ВРК (дикамба, 160 г/л + топрамезон, 50 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-З)	0,75-1	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 1-6 листьев культуры		1
	1,2	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 4-6 листьев культуры		
ТОПМАЗИН ПЛЮС, ВРК (дикамба, 160 г/л + топрамезон, 50 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,75-1	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры	60	1
	0,75-1,2	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу 4-6 листьев культуры		
Дикамба кислота + флорасулам						

СПИКЕР, КЭ (дикамба кислоты в виде диметиламинной соли, 422 г/л + флорасулам, 18 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-З)	0,15-0,2	Пшеница, тритикале и ячмень озимые	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание весной в фазу кушения культуры		1
	0,15-0,2	Пшеница и ячмень яровые	То же	Опрыскивание в фазу кушения культуры		1
	0,15-0,2	Кукуруза	То же	Опрыскивание в фазу 3-5 листьев культуры		1
	0,15-0,2	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные, лекарственные и др.)	Однолетние и многолетние	Опрыскивание сорняков осенью в послеуборочный период, как добавка к глифосатсодержащим гербицидам		1
Дикамба кислоты + хлорсульфурон						
ФЕНИЗАН, ВР (дикамба кислоты, 360 г/л + хлорсульфурона кислоты, 22,2 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,14-0,2	Пшеница, тритикале и ячмень озимые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	30	1
	0,14-0,2	Пшеница и тритикале озимые	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,14-0,2	Рожь озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры		
	0,14-0,2	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		
	0,14-0,2	Лен-долгунец	Однолетние двудольные и некоторые многолетние (осот, бодяк)	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна-долгунца при высоте 3-10 см	60	1
	0,14-0,2	Райграс пастбищный, тимopheевка луговая при покровном и беспокровном посеве	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кушения покровной культуры или начиная с фазы 1-2 листьев райграса при беспокровном посеве		1
	0,14-0,2	Овсяница красная, мятлик луговой при беспокровном посеве	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 листьев культуры		1
	0,2	Овсяница красная, мятлик луговой, двукисточник тростниковый и фестулолиум (семенные посевы)	То же	Опрыскивание посевов весной в год сбора семян в начале отрастания культуры		1

<i>Дикват</i>						
ГОЛДЕН РИНГ, ВР (дикват, 150 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	2	Лук репчатый (из семян)	Однолетние и многолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание почвы до всходов культуры по вегети- рующим сорнякам		1
	1,5-2	Яблоня	Однолетние зла- ковые, однолет- ные и многолет- ные двудольные	Опрыскивание веге- тирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)		2
	2	Валериана ле- карственная, эхинаcea пур- пурная, пу- стырник сер- дечный, много- колосник мор- щинистый, рас- торопша пятни- стая, календула лекарственная	То же	Опрыскивание почвы до всходов культуры по вегети- рующим сорнякам		1
	1,5-2	Яблоня	Однолетние и многолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание веге- тирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	7	1
СУХОВЕЙ, ВР (дикват-ион, 150 г/л в виде диквата дибро- мида, 280 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1,5-2	Яблоня	Однолетние и многолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание веге- тирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	7	1
<i>Диметахлор + напропамид + кломазон</i>						
КОЛЗОР ТРИО, КЭ (диметахлор, 187,5 г/л + напропамид, 187,5 г/л + кломазон, 30 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия (Р), (П-3)	3-4	Рапс озимый	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы не позднее чем через 3 дня по- сле посева. Отмеча- ется незначительное фитотоксическое действие на куль- туру, которое исче- зает через месяц		1
<i>Диметенамид-П</i>						
ФРОНТЬЕР ОП- ТИМА, КЭ (диметенамид-П, 720 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс ЮС ЛЛК, США (Р), (П-3)	0,4	Свекла сахар- ная	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Двукратное опрыс- кивание посевов начиная с фазы 2 пар настоящих листьев культуры в смеси с препаратами на ос- нове десмедифама и фенмедифама	60	2
	1-1,2	Кукуруза	Однолетние зла- ковые и некото- рые двудольные (кроме видов мари)	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	90	1

	0,7-1	Картофель	Просо куриное	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры	84	1
Диметенамид-П + тербутилазин						
АКРИС, СЭ (диметенамид-П, 280 г/л + тербутилазин, 250 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс ЮС ЛЛК, США (Р), (П-3)	2-3	Кукуруза (не более 3 л/га)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов до всходов культуры		1
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: первое - после посева до всходов культуры: второе - в фазу 2-3 листа культуры (в ранние фазы развития сорняков)		2
	2-2,5	Сорго	То же	Опрыскивание посевов до всходов культуры		1
	2-2,5	Соя	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
	2-2,5	Подсолнечник	То же	То же		1
	2,5	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры		1
Дифлюфеникан + метрибузин						
ТАВАС, КС (дифлюфеникан, 62,5 г/л + метрибузин, 250 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1-1,2	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание после посадки до всходов культуры		1
Дифлюфеникан + метрибузин + флорасулам						
СПЛИТ, СК (дифлюфеникан, 225 г/л + метрибузин, 150 г/л + флорасулам, 5,4 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница, тритикале и ячмень озимые	Однолетние двудольные и злаковые (метлица, ромашка, подмаренник, звездчатка и др.)	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев культуры		1
	0,6-0,7	Рожь озимая	То же	То же		
	0,6-0,7	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		
Дифлюфеникан + флорасулам + пеноксулам						
ФИКСИТ, КС (дифлюфеникан, 100 г/л + флорасулам, 3,75 г/л + пеноксулам, 15 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 1-3 листьев культуры		1
Дифлюфеникан + флуфенацет + метрибузин						

КОМПЛИТ ФОРТЕ, КС (дифлюфеникан, 233 г/л + флуфенацет, 200 г/л + метрибузин, 83 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью до всходов культуры или в фазу 1-3 листьев культуры	30	1
	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,4-0,6	Рожь озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью до всходов – в фазу 3 листьев культуры	30	1
	0,4-0,6	Ячмень озимый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листьев культуры	30	1
	0,6	Тритикале озимая с подсевом клевера	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3 листа - начало кушения	30	1
Изопротурон + дифлюфеникан						
АКВИЛОН, КС (изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л), Ардент Агро Лтд., Болгария (Р), (П-3)	0,75-1	Пшеница и рожь озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью после посева до всходов или в фазу кушения культуры	30	1
	0,75-1	Ячмень озимый	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	То же	30	1
	0,75-1	Тритикале озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью после посева до всходов или в фазу 1-3 листьев культуры	30	1
ГРОМ, КС (изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,75-1	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и злаковые (метлица, просо куриное, ромашка, подмаренник, звездчатка и др.)	Опрыскивание посевов осенью после посева до всходов или в фазу 1-3 листьев - кушения культуры		1
	0,5-1	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,75-1	Ячмень озимый	Однолетние двудольные и злаковые (метлица, подмаренник, звездчатка и др.)	Опрыскивание посевов осенью до всходов культуры		1
	0,5-1	То же	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		
	1	Рожь озимая	То же	Опрыскивание посевов весной или осенью в фазу кушения культуры		1
	0,5-1	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		1

	0,75-1	Люпин узко-листный, горох посевной (на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
КУНИЦА, КС (изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	0,75-1	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью после посева до всходов или в фазу 1-3 листьев - кушения культуры	82	1
	0,5-1	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,75-1	Ячмень озимый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью после посева до всходов	30	1
	0,5-1	То же	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		
	0,5-1	Пшеница и ячмень яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорняков	65	1
	0,75-1	Горох посевной (на зерно)	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
	0,75-1	Люпин узко-листный	То же	То же	60	1
МАССИФ, КС (изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,5-1	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
МОРИОН, СК (изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,75-1	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние двудольные и злаковые (метлица, ромашка, подмаренник, звездчатка и др.)	Опрыскивание осенью после посева до всходов или в фазу 1-3 листьев - кушения культуры		1
	0,5-1	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,75-1	Ячмень озимый	Однолетние двудольные	Опрыскивание осенью в фазу 1-3 листьев - кушения культуры		1
	0,5-1	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные и злаковые (метлица, ромашка, подмаренник, звездчатка и др.)	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры и ранние фазы роста сорняков		1
	0,75-1	Горох посевной	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы после посева до всходов	61	1

НЕРТА, КС (изопротурон, 500 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	0,75-1	Пшеница ози- мая	Однолетние дву- дольные и злако- вые (метлица обыкновенная, ромашка, подма- ренник, звезд- чатка и др.)	Опрыскивание осе- нью после посева до всходов, в фазу 1-3 листьев, в фазу ку- щения культуры или весной в фазу куше- ния культуры		1
	0,75-1	Тритикале ози- мая	Однолетние дву- дольные, метлица обыкновенная	Опрыскивание осе- нью после посева до всходов, в фазу 1-3 листьев культуры или весной в фазу кущения культуры		1
	0,75-1	Рожь озимая	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов осенью после по- сева до всходов или в фазу 1-3 листьев - кущения культуры		1
	0,75-1	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посе- вов осенью после по- сева до всходов или в фазу кущения культуры		1
	1	Пшеница яро- вая	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры		1
	0,5-1	Ячмень яровой	То же	То же		1
Имазамокс						
ГЛОБАЛ, ВР (имазамокс, 40 г/л), ООО Группа Компа- ний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,9-1,2	Рапс озимый и яровой (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолино- нам)	Однолетние дву- дольные и злако- вые и некоторые многолетние дву- дольные (дрема белая, полынь обыкновенная, осот желтый)	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме са- харной свеклы (без- опасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)		1
	0,75-1	Горох	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 насто- ящих листьев). На следующий год можно высевать все культуры, кроме са- харной свеклы (без- опасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)		1

	0,75-1	Люпин узко-листный (на зерно)	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)		1
	0,75-1,2 + 0,2 л/га ПАВ Корнет, ВК	Люцерна посевная	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры и ранние фазы роста сорняков		1
ИМАЗОШАНС , ВР (имазамокс, 40 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,75-1	Рапс озимый и яровой (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев). На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолинонам	40	1
	0,75-1	Горох посевной	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев). На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	60	1
	0,75-1	Люцерна посевная 1-го года вегетации	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 1-4 тройчатых листьев культуры в ранние фазы роста сорняков	30	1

ПАРАДОКС, ВРК (имазамокс, 120 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,35-0,4	Рапс яровой (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние двудольные, просо, куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев). На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолинонам		1
	0,25-0,35	Горох посевной	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры и ранние фазы сорняков (1-3 настоящих листьев сорняков). На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам)		1
	0,25-0,35	Бобы кормовые	Однолетние двудольные, просо, куриное	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев). На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолинонам		1

	0,35	Люпин узко-листный	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале, кукурузу, сою, горох, бобы, сорго, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолинонам		
	0,25-0,35	Люцерна посевная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев)		1
ПУЛЬСАР, ВР (имазамокс, 40 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-3)	0,75-1	Горох посевной	Однолетние двудольные и злаковые, некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих листьев). На следующий год можно высевать яровые и озимые пшеницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, люпин; рапс и подсолнечник, устойчивые к имидазолинонам	30	1
	0,75	Горох овощной	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посевов до всходов культуры	30	1
	0,75-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	60	1
	0,75-1	Клевер луговой и ползучий в год посева без покрова	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры в ранние фазы роста сорняков		1
	0,75	Лядвенец рогатый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	94	1
	0,75	Галега восточная	То же	То же	94	1
	1	Люпин узко-листный	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	129	1

	1	Люцерна по- севная	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-4 трой- чатых листьев куль- туры в ранние фазы роста сорняков	29	1
ПУЛЬСАР ФЛЕКС , ВР (имазамокс, 25 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пу- эрто Рико (Р), (П-З)	1,2-1,4	Горох посевной	Однолетние дву- дольные, просо куриное	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-3 ли- стьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 насто- ящих листьев). На следующий год можно высевать яро- вые и озимые пше- ницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, лю- пин; рапс и подсол- нечник, устойчивые к имидазолинонам		1
	1,2-1,4	Соя	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (1-3 настоящих ли- стьев). На следую- щий год можно вы- севать яровые и ози- мые пшеницу, яч- мень, рожь, трити- кале; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, лю- пин; рапс и подсол- нечник, устойчивые к имидазолинонам	35	1
	1,4-1,6	Подсолнечник (сорта и ги- бриды устойчи- вые к имидазо- линонам)	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 4-5 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листьев). На следующий год можно высевать яро- вые и озимые пше- ницу, ячмень, рожь, тритикале; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, лю- пин; рапс и подсол- нечник, устойчивые к имидазолинонам		1
РОДИМИЧ , ВР (имазамокс, 40 г/л), ООО «Франдеса», Бе- ларусь (Р), (П-З)	1	Клевер 1-го года вегетации без покрова	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание после посева до всходов или в фазу 1-2 трой- чатых листьев куль- туры	30	1

	1	Люцерна посевная	Однолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание после посева до всходов и (или) в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры		1-2
	1-1,2	Рапс яровой (сорта и гибриды устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние двудольные, просо, кукурузное, осот полевой	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме овса (можно высевать через 2 года) и традиционных сортов и гибридов сахарной свеклы и рапса (можно высевать через 3 года)		1
	0,75-1	Горох посевной	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 1-3 листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме овса (можно высевать через 2 года) и традиционных сортов и гибридов сахарной свеклы и рапса (можно высевать через 3 года)		1
Имазамокс+ аминопиралид + квинмерак						
НОПАСАРАН ФЛЕКС, ВРК (имазамокс, 17,5 г/л + квинмерак, 75 г/л + аминопиралид, 4 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-3)	1,4-1,6	Рапс озимый CL, (гибриды рапса Clearfield, устойчивые к гербициду)	Однолетние двудольные, просо, кукурузное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	30	1
	1,4-1,6	То же	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	Опрыскивание посевов весной в фазу стеблевания культуры		
	1,4-1,6	Рапс яровой CL, (гибриды рапса Clearfield, устойчивые к гербициду)	Однолетние двудольные, просо, кукурузное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	61	1
Имазамокс + квинмерак						
НОПАСАРАН УЛЬТРА, КС (имазамокс, 35 г/л + квинмерак, 250 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В.,	1-1,2 + 1-1,2 л/га ПАВ Даш, КЭ	Рапс озимый и яровой CL, (гибриды рапса Clearfield, устойчивые к гербициду)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры	30	1

Пуэрто Рико (Р), (П-3)	1-1,2 + 1-1,2 л/га ПАВ Даш, КЭ	Рапс озимый CL, (гибриды рапса Clearfield, устойчивые к гербициду)	То же	Опрыскивание посе- вов весной до фазы скрытого бутона		
Имазамокс + метазахлор						
НОПАСАРАН, КС (имазамокс, 25 г/л + метазахлор, 375 г/л), БАСФ Агрокемикал Продактс Б.В., Пуэрто Рико (Р), (П-3)	1-1,2 + 1-1,2 ПАВ Даш, КЭ	Рапс озимый и яровой CL (ги- бриды рапса Clearfield, устойчивые к гербициду)	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев культуры		1
Имазамокс + тифенсульфурон-метил						
РОДИМИЧ ДУО, МД (имазамокс, 40 г/л + тифенсульфурон-ме- тил, 37 г/л), ООО «Франдеса», Бе- ларусь (Р), (П-3)	0,5-0,6	Соя	Однолетние дву- дольные, дрема белая	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-2 трой- чатых листьев куль- туры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса		1
Имазапир						
ГРЕЙДЕР, ВГР (имазапир, 250 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	2-2,5	Земли несель- скохозяйствен- ного пользова- ния (полосы от- чуждения ли- ний электропе- редач, трассы газо- и нефте- проводов, насыпи желез- нодорожных и шоссейных до- рог, аэро- дромы, и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние и многолетние, борщевик Сос- новского	Опрыскивание сор- няков в ранние фазы их роста, при высоте борщевика до 30 см		1
	2-5	То же	Однолетние и многолетние, лиственные дре- весно-кустарни- ковые породы	Опрыскивание расте- ний в фазу их актив- ного роста		

ФОРУС, ВК (имзапир, 250 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-3)	2-2,5	Земли несель- скохозяйствен- ного пользова- ния (полосы от- чуждения ли- ний электропе- редач, трассы газо- и нефте- проводов, насыпи желез- нодорожных и шоссейных до- рог, аэро- дромы, и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние и многолетние дву- дольные и злако- вые; борщевик Сосновского	Опрыскивание сор- няков в ранние фазы их роста, при высоте борщевика до 30 см		1
	2-5	То же	Однолетние и многолетние дву- дольные и злако- вые; древесно-кустар- никовые породы	Опрыскивание расте- ний в фазу их актив- ного роста		1
Имазетапир						
ТАПИР, ВК (имазетапир, 100 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	0,5-1	Соя	Однолетние и не- которые много- летние двудоль- ные, однолетние злаковые	Опрыскивание почвы до всходов культуры или в фазу всходы - 2 настоя- щих листьев куль- туры в ранние фазы сорняков. В год при- менения препарата рекомендуется высе- вать озимую пше- ницу, на следующий год – кукурузу, яро- вые и озимые зерно- вые, через 2 года – все культуры без ограничения		1
	0,5-0,75	Люпин узко- листный	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. В год применения препарата рекомен- дуется высевать ози- мую пшеницу, на следующий год – ку- курузу, яровые и озимые зерновые, че- рез 2 года – все куль- туры без ограниче- ния		1

	0,5-0,75	Бобы кормовые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года – все культуры без ограничения		1
	0,5-0,75	Горох посевной	То же	То же		1
	0,5-0,75	Горох овощной (на семена и для промышленной переработки)	То же	Опрыскивание почвы после посева, до всходов культуры или в фазу 3-6 листьев культуры в ранние фазы роста сорных растений. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год – кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года – все культуры без ограничения		1
	0,75-1	Клевер луговой в год посева без покрова	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры в ранние фазы роста сорняков		1
	0,75-1	Клевер ползучий без покрова в год посева	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры в ранние фазы роста сорняков		1
	0,75-1	Галега восточная, лядвенец рогатый	То же	Опрыскивание после посева до всходов культуры		1
Индазифлам						
БЕКАНО, КС (индазифлам, 500 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	0,15-0,2	Яблоня (не более 0,3 л/га)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до всходов сорняков в садах старше 3-х лет	60	1

	0,15		вые, осот полевой, пырей ползучий	Опрыскивание почвы ранней весной до всходов сорняков и повторно при появлении новой волны сорняков (середина вегетации) в садах старше 3-х лет	60	2
Йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-диэтил (антидот)						
АЛЬТАИР, МД (йодосульфурон-метил-натрий, 100 г/л + мефенпир-диэтил /антидот/, 300 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,1	Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные (метлица, марь белая, горец выюнковый, фиалка полевая и др.), падалица рапса	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	30 30	1
	0,05-0,1	Пшеница и тритикале озимые	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,075-0,1	Тритикале озимая	Падалица рапса	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев культуры		
	0,075-0,1	Рожь озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры		1
	0,05-0,075	Ячмень озимый	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев культуры		1
	0,075-0,1	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,05-0,075	Пшеница яровая	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу кушения	30	1
	0,05-0,075	Ячмень яровой	Однолетние двудольные	То же		
БИНОМ, МД (йодосульфурон-метил-натрия, 100 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 300 г/л) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,075-0,1	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	30	1
	0,05-0,1	Тритикале озимая	То же	То же	30	1
	0,05-0,075	Ячмень яровой	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
ГУСАР ТУРБО, МД (йодосульфурон-метил натрий, 100 г/л + мефенпир-диэтил /антидот/, 300 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	0,075-0,1	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние злаковые и двудольные (лисохвост, метлица, мятлик, пастушья сумка, подмаренник, ярутка, ромашка, осоты и др.)	Опрыскивание посевов осенью с фазы 2 листьев - кушения культуры, в т. ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 л/га		1

	0,05-0,1	То же	То же	Опрыскивание посевов весной до кущения - начало трубкования культуры, в т. ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 л/га		
	0,08	Ячмень озимый	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	0,05-0,1	Пшеница яровая	Однолетние злаковые и двудольные (лисохвост, метлица, мятлик, пастушья сумка, подмаренник, ярутка, ромашка, осоты и др.)	Опрыскивание посевов с фазы 2 листьев - начало трубкования культуры, в т. ч. авиационное опрыскивание методом УМО. Расход рабочей жидкости при авиационном опрыскивании 5 л/га		1
	0,05-0,075	Ячмень яровой	То же	То же		1
Йодосульфурон-метил-натрий + дифлюфеникан + мефенпир-диэтил /антидот/						
ФОРКАСТ, МД (дифлюфеникан, 150 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 8 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 30 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние двудольные и злаковые и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3-х листьев культуры	30	1
	0,8-1	Пшеница озимая	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		
	0,8-1	Тритикале озимая	Однолетние двудольные и злаковые	То же		
	0,8	Пшеница яровая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		
	1	То же	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой), просо куриное	То же		1
Йодосульфурон-метил-натрий + мезосульфурон-метил + дифлюфеникан + мефенпир-диэтил /антидот/						
АЛИСТЕР ГРАНД, МД (дифлюфеникан, 180 г/л + мезосульфурон-метил, 6 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 4,5 г/л + мефенпир-диэтил /антидот/, 27 г/л), Байер АГ, Германия (П-3)	0,7-0,8	Пшеница и тритикале озимые, рожь озимая (в т.ч. гибридная F ₁)	Однолетние двудольные и злаковые, некоторые многолетние двудольные (метлица, просо куриное, мятлик, ромашка, подмаренник, звездчатка, падалица рапса и др.)	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев - кущения культуры	30	1

	0,7-0,8	Пшеница и тритикале озимые	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
Йодосульфурон-метил-натрий + мезосульфурон-метил + мефенпир-диэтил /антидот/						
ЗЕПНОС, ВДГ (мезосульфурон-метил, 30 г/кг + йодосульфурон-метил-натрий, 6 г/кг + мефенпир-диэтил, 90 г/кг (антидот)), Глобакем НВ, Бельгия (Р), (П-3)	0,3+0,6 ПАВ Эфтортол, КЭ	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения - выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры	88	1
	0,4+0,8 ПАВ Эфтортол, КЭ	То же	То же	То же		
	0,3+0,6 ПАВ Эфтортол, КЭ	Пшеница и тритикале яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения – начало трубкования культуры	30	1
	0,4+0,8 ПАВ Эфтортол, КЭ	То же	То же	То же		
МЕРИНДО, МД (мезосульфурон-метил, 20 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 4 г/л + мефенпир-диэтил (антидот), 60 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,7-0,8	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листа-кушения культуры	180	1
	0,7-0,8	Тритикале озимая	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	98	1
	0,7-0,8	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
	0,7-0,8	Ячмень яровой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	30	1
Йодосульфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + мефенпир-диэтил /антидот/						
ГУСАР СТАР, ВДГ (йодосульфурон-метил-натрий, 33 г/кг + тиенкарбазон-метил, 25 г/кг + мефенпир-диэтил /антидот/, 150 г/кг), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,2-0,3 кг/га + 1 л/га ПАВ МЕРО, КЭ	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и злаковые, бодяк полевой	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		1
	0,2-0,3 кг/га + 1 л/га ПАВ МЕРО, КЭ	То же	Однолетние двудольные и злаковые, многолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,2-0,3 кг/га + 1 л/га ПАВ МЕРО, КЭ	Тритикале озимая	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		1

	0,2-0,3 кг/га + 1 л/га ПАВ МЕРО, КЭ	То же	Однолетние дву- дольные и злако- вые, бодяк поле- вой	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры		
Карфентразон-этил						
БУЦЕФАЛ, КЭ (карфентразон-этил, 480 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,02	Кукуруза	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры. От- мечается незначи- тельное фитотокси- ческое действие на культуру, которое исчезает через две недели	111	1
Клетодим						
ВЫБОР, КЭ (клетодим, 360 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,26-0,3	Рапс озимый	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сор- няков	175	1
	0,33-0,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
	0,2-0,27	Рапс яровой	Просо куриное	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев у сорняков	40	1
	0,33-0,5	Рапс яровой	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см	40	1
	0,2-0,3	Свекла сахар- ная	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сор- няков	105	1
	0,5-0,6	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
	0,2-0,3	Картофель	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сор- няков	57	1
МАКСИ ЗЛАК, КЭ (клетодим, 120 г/л), ООО Группа Компа- ний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Рапс озимый	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сор- няков		1
	1-1,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
	0,6-0,8	Рапс яровой	Просо куриное	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сор- няков		1
	1-1,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
	0,6-0,8	Свекла сахар- ная	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сор- няков		1
	1,6-1,8	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		

	2	Лен - долгунец	То же	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры		1
	0,6-0,8	Картофель	Просо куриное	Опрыскивание посадок в фазу 2-5 листьев сорняков		1
	1-1,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-15 см		
РОНДО, КЭ (клетодим, 240 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	0,2-0,4 + 0,6-1,2 л/га ПАВ Хелпер	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры		1
	0,7-1 + 2,1-3 л/га ПАВ Хелпер	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см независимо от фазы развития культуры		
	0,2-0,3 + 0,6-0,9 л/га ПАВ Хелпер	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры		1
	0,7-1 + 2,1-3,0 л/га ПАВ Хелпер	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазу 3-5 листьев) независимо от фазы развития культуры		
	0,2-0,3 + 0,6-0,9 л/га ПАВ Хелпер	Рапс яровой	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры		1
	0,5-0,7 + 1,5-2,1 л/га ПАВ Хелпер	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10- 15 см		
СЕДИМ 120, КЭ (клетодим, 120 г/л), ГЛОБАКЕМ НВ, Бельгия (Р), (П-3)	0,8	Рапс озимый и яровой	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков	96	1
	1,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,8	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков	56	1
	1,8	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,8	Лен-долгунец, лен масличный	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков	71	1

	1,8	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)	61	1
	0,8	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 2-4 листьев сорняков независимо от фазы развития культуры		
	1,8	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползучего 10-15 см		
ЦЕНТУРИОН, КЭ (клетодим, 240 г/л), Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (Р), (П-3)	0,2-0,3 + 0,6-0,9 л/га ПАВ Амиго, КЭ	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев у сорняков (независимо от фазы развития культуры)		1
	0,5-0,7 + 1,5-2,1 л/га ПАВ Амиго, КЭ	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,2-0,3 + 0,4-0,6 л/га ПАВ Амиго Стар, КЭ	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев однолетних злаковых сорняков		
	0,5-0,7 + 1-1,4 л/га ПАВ Амиго Стар, КЭ	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,5 + 1,5 л/га ПАВ Амиго, КЭ	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры при 2-5 листьев сорняков		
	0,5-0,7 + 1,5-2,1 л/га ПАВ Амиго, КЭ	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см		1

	0,2-0,4 + 0,4-0,8 л/га ПАВ Амиго Стар, КЭ	Лен-долгунец, лен масличный	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков (неза- висимо от фазы раз- вития культуры)		
	0,5-0,7 + 1-1,4 л/га ПАВ Амиго Стар, КЭ	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития куль- туры)		
	0,4-0,6 + 0,7 л/га ПАВ Амиго Стар, КЭ	Рапс озимый	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков		1
	0,7-1 + 0,7 л/га ПАВ Амиго Стар, КЭ	То же	Многолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,4 + 0,8 ПАВ Амиго Стар, КЭ	Картофель	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание поса- док в фазу 2-6 ли- стьев сорняков		1
	1 + 2 ПАВ Амиго Стар, КЭ	То же	Однолетние зла- ковые, пырей ползучий	Опрыскивание поса- док в фазу 2-6 ли- стьев сорняков, при высоте пырея ползу- чего 10-15 см (неза- висимо от фазы раз- вития культуры)		
СЕЛЕКТ, КЭ (клетодим, 120 г/л), Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (Р), (П-3)	0,6-0,8	Свекла сахар- ная (не более 1,8 л/га)	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев у сорняков		1-2
	1,6-1,8		Многолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		1
	1,6-1,8	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посе- вов льна в фазу «елочки» при высоте пырея ползучего 10- 15 см		1
	0,6-0,8	Рапс яровой	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков		1

	0,8-1	Рапс озимый	То же	То же		1
	1-1,5	Рапс яровой и озимый	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	0,6-0,8	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание посадок в фазу 2-6 листьев сорняков		1
	1,6-1,8	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-15 см		
Клетодим + галоксифоп-Р-метил						
КВИКСТЕП, МКЭ (клетодим, 130 г/л + галоксифоп-Р-метил, 80 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	0,4-0,6	Гречиха	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	60	1
	0,6-0,8	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Рапс озимый и яровой	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	40	1
	0,6-0,8	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	132	1
	0,6-0,8	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	60	1

	0,6-0,8	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Горох посевной	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	31	1
	0,6-0,8	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Соя	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	31	1
	0,6-0,8	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	59	1
	0,6-0,8	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,6	Капуста белокочанная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев у однолетних сорняков (независимо от фазы развития культуры)	145	1
	0,6-0,8	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры)		

	0,4-0,6	Морковь	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев у однолетних сорняков (незави- симо от фазы разви- тия культуры)	104	1
	0,6-0,8	То же	Многолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития куль- туры)		
	0,4-0,6	Лук репчатый	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев у однолетних сорняков (незави- симо от фазы разви- тия культуры)	117	1
	0,6-0,8	То же	Многолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития куль- туры)		
Клодинафоп-пропаргил						
ФЕНИКС, КЭ (клодинафоп-про- паргил, 80 г/л + кло- квинтосет-мексил (ан- тидот), 20 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,5	Пшеница и тритикале ози- мые	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу кущения культуры	60	1
	0,4-0,5	То же	То же	Опрыскивание посе- вов весной по веге- тирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца ку- щения (независимо от фазы развития культуры)		
	0,4-0,5	Пшеница яро- вая	Просо куриное	То же	60	1
Клодинафоп-пропаргил + пиноксаден + клоквинтосет-мексил (антидот)						
АПРОВАТОР УЛЬ- ТРА, КЭ (клодинафоп-про- паргил, 68 г/л + пи- ноксаден, 54,5 г/л + клоквинтосет-мексил (антидот), 31 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,5	Пшеница и тритикале ози- мые	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов весной по веге- тирующим сорнякам, начиная со 2-го ли- ста до конца куще- ния (независимо от фазы развития куль- туры)	30	1
	0,25-0,5	Пшеница яро- вая	Просо куриное	Опрыскивание посе- вов по вегетирую- щим сорнякам, начи- ная со 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	30	1
Клодинафоп-пропаргил + флукарбазон натрия + клоквинтосент-мексил (антидот)						

КЛОФОЦЕТ, МД (клодинафоп-пропаргил, 120 г/л + флукарбазон натрия, 60 г/л + клокви́нто-сет-мексил (антидот), 54 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,5-0,8	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	30	1
	0,5-0,8	Пшеница яровая	То же	То же	30	1
Кломазон						
АЛГОРИТМ, КЭ (кломазон, 480 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,7-1	Соя	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
	0,2	Рапс озимый	То же	Опрыскивание почвы в течение 30 часов после посева. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца	60	1
	0,2	Рапс яровой	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца	60	1
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы после посева до всходов или по всходам культуры в фазу семядольных листьев сорняков. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца. Во влажных погодных условиях применять минимальную норму из рекомендованных	60	1
АПСТЕЙДЖ, МКС (кломазон, 360 г/л), ЮПЛ Холдингс Ко-оператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	0,25	Рапс озимый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы в течение 30 часов после посева. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца	40	1

	0,25	Рапс яровой	Однолетние двудольные, просо куриное	То же		
	0,45	Картофель	Однолетние двудольные	Опрыскивание посадок до всходов культуры	87	1
ГАЛС, КЭ (кломазон, 480 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,15-0,2	Рапс озимый	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы в течение 30 часов после посева. Возможно фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца		1
	0,15-0,2	Рапс яровой	Однолетние двудольные и злаковые	То же		
	0,35	Картофель	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры	60	1
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы в течение 30 часов после посева. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца. Во влажных погодных условиях применять минимальную норму из рекомендованных	150	1
КАЛИФ, КЭ (кломазон, 480 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	0,2-0,35	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посадок до всходов культуры		1
	0,15-0,2	Рапс озимый	То же	Опрыскивание почвы в течение 30 часов после посева. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца		1
	0,15-0,2	Рапс яровой	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	0,15-0,2	Соя	То же	Опрыскивание почвы в течение 30 часов после посева. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца		1

ТРЕЙСЕР, КЭ (кломазон, 480 г/л) АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,2	Рапс озимый и яровой	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы в течение 30 часов после посева. Возможно незначи- тельное фитотокси- ческое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца	61	1
	0,2-0,35	Картофель	То же	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры	60	1
Клопиралид						
АГРОН, ВР (клопиралид, 300 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница ози- мая	Виды осота, ро- машки, горца	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры		1
	0,15- 0,22	Гречиха	Ромашка непаху- чая, горец вьюн- ковый	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы развития сорня- ков		1
	0,3	Свекла сахар- ная	Виды осота, ро- машки, горца	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-3 пар настоящих листьев культуры		1
	0,3-0,4	Рапс озимый	Василек синий, виды осота, ро- машки, горца	Опрыскивание посе- вов весной в фазу стеблевания	40	1
	0,3	Рапс яровой	Виды осота, ро- машки, горца	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-4 ли- стьев культуры		1
	0,3	Лен-долгунец	Василек синий, виды осота, ро- машки, горца	Опрыскивание посе- вов в фазу «елочки» льна-долгунца и в фазу розетки сорных растений		1
	0,15-0,2	Лук репчатый (кроме лука на перо)	Виды осота, ро- машки, горца	Опрыскивание посе- вов не ранее фазы 2- х настоящих листьев культуры, в фазу ро- зетки осотов		1
АЙМОКС, ВРГ (клопиралид, 750 г/кг) Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,12-0,15	Рапс озимый и яровой	Виды осотов, ро- машки, горцев	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-4 ли- стьев культуры	40	1
	0,12-0,16	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу «елочки» льна и в фазу ро- зетки осотов	79	1
	0,12-0,2	Свекла сахар- ная	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры	109	1
БРИС, ВДГ (клопиралид, 750 г/кг), АО «ТПК Техноэкс- порт», Россия (Р), (П-3)	0,12-0,16	Пшеница ози- мая	Виды осота, ро- машки, горца	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры	62	1
	0,12-0,16	Пшеница и яч- мень яровые	Виды осота, ро- машки, горца	Опрыскивание посе- вов в фазу кушения культуры	62	1

	0,12-0,16	Рапс озимый и яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры	59	1
	0,12-0,2	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры	110	1
КЛИОМЕКС ВР (клопиралид, 300 г/л), МАС-GmbH, Германия (Р), (П-З)	0,3-0,5	Свекла сахарная	Осот желтый, горец выюнковый	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры		1
КЛОРИТ, ВР (клопиралид, 300 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-З)	0,3	Пшеница озимая	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры до выхода в трубку	85	1
	0,3	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры	71	1
	0,3	Лен-долгунец	Виды осота, горца	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна-долгунца и в фазу розетки осотов	62	1
	0,3-0,4	Рапс озимый	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной до фазы бутонизации культуры	84	1
	0,3-0,4	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры	84	1
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Василек синий, виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры		1
ЛОНГАН, ВР (клопиралид, 300 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,5	Пшеница озимая	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	104	1
	0,3-0,4	Рапс озимый и яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры	40	
	0,3-0,5	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 пар настоящих листьев культуры	95	
ОДИССЕЙ, ВР (клопиралид, 300 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-З)	0,3-0,5	Пшеница озимая, ячмень и пшеница яровые	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры до выхода в трубку	82	1
	0,3-0,5	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры	119	1
ЛОНТАГРО, ВР (клопиралид, 300 г/л), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь;	0,3-0,5	Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры до выхода в трубку		1

Ningbo Lido International Incorporation Co., Ltd., Китай (Р), (П-3)	0,3-0,4	Рапс озимый	Василек синий, виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листьев культуры		1
	0,3-0,4	То же	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу начала роста главного побега культуры		
	0,3-0,4	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры		1
	0,3-0,5	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры		1
	0,3	Лен-долгунец	Василек синий, виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна и в фазу розетки сорняков		1
ЛОНТЕРР , ВДГ (клопиралид, 750 г/кг), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,12-0,2	Пшеница и тритикале озимые	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	116	1
	0,12-0,2	Пшеница и ячмень яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	32	
	0,12-0,2	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
	0,12-0,2	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры		1
	0,12-0,15	Рапс озимый и яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
ЛОНТРЕЛ 300 , ВР (клопиралид, 300 г/л), Дау АгроСаенсес ВмбХ, Австрия (Р), (П-3)	0,3	Фацелия (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазу 4-6 листьев культуры и фазу розетки осотов		1
	0,16 -0,66	Газоны	Ромашка, осоты, горцы, одуванчик лекарственный	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса		1
ЛОНТРЕЛ ГРАНД , ВДГ, (клопиралид, 750 г/кг), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,12-0,15	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры	82	1
	0,12-0,16	Рапс яровой и озимый	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры	40	1
ЛОРНЕТ , ВР (клопиралид, 300 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница и тритикале озимые, пшеница и ячмень яровые	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку	30	1

	0,15-0,22	Гречиха	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы развития сорняков	30	1
	0,3-0,5	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар настоящих листьев культуры	86	1
	0,1-0,3	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна-долгунца и в фазу розетки осотов	28	1
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры	28	1
	0,16-0,66	Газоны и газоны спортивных сооружений	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, клевер, ромашка и др.)	Опрыскивание растений по вегетирующим растениям после первого укоса.		1
	0,4	Декоративные кустарники (кизильник, спирея), в т.ч. в населенных пунктах	Одуванчик, подорожник, бодяк, ромашка	Опрыскивание вегетирующих сорняков при условии защиты культуры		1
МАЙОР 300, ВР (клопиралид, 300 г/л), ООО ИННВИГО, Польша (Р), (П-3)	0,2-0,3	Пшеница озимая	Виды ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры до выхода в трубку		1
	0,4	То же	Виды ромашки, горца, осот полевой	То же		
	0,3-0,4	Рапс озимый	Виды осота, ромашки, горца, василек синий	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры осенью		1
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры		1
ХАКЕР, ВРГ (клопиралид, 750 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,12-0,2	Тритикале озимая	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры до выхода в трубку		1
	0,12-0,2	Ячмень яровой	То же	То же		1
	0,12-0,2	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры		1
	0,12-0,16	Рапс озимый и яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры		1

	0,12	Лен-долгунец	Виды осота, ромашки	Опрыскивание посевов льна в фазе «елочки» и 2-4 листьев сорняков		1
	0,15-0,22	Гречиха	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу 1-го настоящего листа культуры и в ранние фазы развития сорняков	60	1
	0,25	Газоны	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, подорожник и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков		1
ХАКЕР 300, ВР (клопиралид, 300 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница озимая	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры до выхода в трубку		1
	0,3-0,4	Рапс озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листьев культуры		1
	0,3-0,4	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу стеблевания культуры		
	0,3-0,4	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры		1
	0,3-0,5	Свекла сахарная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 пар настоящих листьев культуры		1
	0,3	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна и в фазу розетки осотов		1
	0,3-0,4	Сенокосы и пастбища	Виды осота, ромашки, подорожника, одуванчик	Опрыскивание вегетирующих сорняков	60	1
	0,5	Газоны и газоны спортивных сооружений	Однолетние и многолетние двудольные (одуванчик, тысячелистник, клевер, подорожник, полынь, люцерна и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков через 3-4 дня после скашивания газона (июнь, август)		2
ШАНСТРЕЛ 300, ВР (клопиралид, 300 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница и тритикале озимые	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	85	1
	0,3-0,5	Пшеница и ячмень яровые	То же	То же	30	1
	0,3-0,4	Рапс озимый	Виды осота, ромашки, горца, василек синий	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листьев культуры	40	1
	0,3-0,4	Рапс яровой	Виды осота, ромашки, горца	То же	40	1

	0,3-0,5	Свекла сахарная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 пар настоящих листьев культуры	96	1
	0,3	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна-долгунца и в фазу розетки осотов	94	1
Клопиралид + галаксифен-метил						
СЛАШ 125, КЭ (галаксифен-метил, 5 г/л + клопиралид, 120 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Рапс озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. подмаренник цепкий; осот полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу розетки - начало бутонизации культуры		1
Клопиралид + пиклорам						
ВЕРСУС, ВР (клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л), Ардент Агро Лтд, Болгария (П-3)	0,25-0,3	Рапс озимый	Виды осота, ромашки, горца, подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	40	1
	0,25-0,3	Рапс яровой	То же	То же	40	1
ГАЛИОН, ВР (клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,25-0,3	Рапс озимый	Виды ромашки, подмаренник цепкий и др. двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	40	1
	0,25-0,3	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу стеблевания (до появления цветочных бутонов у культуры)		
	0,25-0,3	Сурепица озимая	Виды осотов, ромашки, подмаренник цепкий и др. двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	40	1
	0,3	Рапс яровой	То же	То же	40	1
	0,25-0,3	Капуста белокочанная (безрассадная технология)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-4 настоящих листьев культуры	115	1
КИРАЙ, ВР (клопиралид, 267 г/л + пиклорам, 67 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,3-0,35	Рапс озимый	Виды осотов, ромашки, горцев, подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов весной в фазу стеблевания	40	1
	0,3-0,35	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	40	1
	0,3-0,35	Капуста кочанная	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры	85	1
КРУЦИФЕР, ВР (клопиралид, 267 г/л + пиклорам, 67 г/л),	0,3-0,35	Рапс яровой и озимый	Виды осотов, ромашки, подмаренник цепкий и другие двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры	40	1

ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,35	Рапс озимый	Василек синий, подмаренник цепкий, виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов весной в фазу стеблевания		
	0,3-0,35	Капуста белокочанная	Однолетние двудольные (в т.ч. ромашка, подмаренник цепкий), виды осотов	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры		
ЛЕРАШАНС , ВР (клопиралид, 267 г/л+ пиклорам, 67 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	0,3-0,35	Рапс озимый	Виды осотов, ромашки, подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов весной в фазу стеблевания	40	1
	0,3-0,35	Рапс яровой	Виды осотов, ромашки, горца, подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры	40	1
ЛИРА , ВР (клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 80 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,2-0,3	Рапс озимый	Виды осота, ромашки, подмаренник цепкий и другие двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу начала роста главного побега культуры		1
	0,2-0,3	То же	Виды осота, ромашки, подмаренник цепкий	Опрыскивание посевов осенью в фазу 4 листьев культуры		
	0,2-0,3	Рапс яровой	Виды горцев, ромашки и другие двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
Клопиралид + пиклорам + аминопиралид						
ГАЛЕРА СУПЕР 364 , ВР (аминопиралид, 17 г/л + клопиралид, 267 г/л + пиклорам, 80 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-З)	0,2-0,3	Рапс озимый	Виды осотов, ромашки, горцев	Опрыскивание посевов осенью в фазу 4-6 листьев рапса или весной до фазы бутонизации		1
	0,2-0,3	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 4-6 листьев у рапса до фазы бутонизации		1
РЕПЕР ТРИО , МД (клопиралид, 267 г/л в виде 2-этилгексилового эфира + пиклорам, 80 г/л + аминопиралид, 17 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,2-0,3	Рапс озимый	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листьев культуры или весной до фазы бутонизации		1
	0,2-0,3	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
Клопиралид, в виде 2-ЭГЭ + имазамокс						
ИЛИОН , МД (клопиралид, 90 г/л в виде 2-этилгексилового эфира + имазамокс, 40 г/л),	0,8-1,2	Рапс озимый (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	40	1

АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,8	Рапс яровой (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Однолетние двудольные, виды осотов	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев культуры. В год применения можно высевать пшеницу озимую, рапс озимый (устойчивый к имидазолинонам); на следующий год –пшеницу, ячмень, тритикале озимые и яровые, рожь озимую; кукурузу, сорго, сою, горох, бобы, люцерну, люпин, рапс и подсолнечник (устойчивые к имидазолинонам); через два года – овес, подсолнечник (традиционные сорта и гибриды); через три года – любые культуры без ограничений, включая традиционные сорта и гибриды рапса; свеклу сахарную.		1
	1,2	То же	Однолетние двудольные, просо куриное, виды осотов	То же		
Ленацил						
СЕРИАЛ, КС (ленацил, 500 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Свекла сахарная (гибриды с устойчивостью к ацетолактатсинтазе (ALS))	Падалица рапса (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Двукратное опрыскивание в фазу 2-х настоящих листьев сорняков в смеси с препаратами-ингибиторами ацетолактатсинтазы (ALS)	90	2
	0,6	Свекла сахарная	Однолетние двудольные, в т.ч. падалица рапса (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмдифама и десмдифама	70	3
Мезосульфурон-метил + флуметсулам + флорасулам + мефенпир-диэтил						
БАЛЛИСТА, МД (мезосульфурон-метил, 30 г/л + флуметсулам, 17 г/л + флорасулам, 12 г/л + мефенпир-диэтил, 90 г/л),	0,3-0,5	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры	28	1

АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу кушения культуры	28	1
	0,3-0,5	Ячмень озимый	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- шения культуры		
Мезотрион						
ФРАНКОРН, КС (мезотрион, 480 г/л), ООО «Франдеса», Бе- ларусь (Р), (П-3)	0,25	Кукуруза	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	90 (зе- леная масса) 103 (зерно)	1
	0,15-0,25 + 200 мл/га ПАВ Агро, Ж	То же	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры и 2-4 —листьев у двудоль- ных сорняков		
	0,2-0,3	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	0,3	То же	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см		
	0,2-0,3	Фацелия (се- менные по- севы)	То жже	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
ЭГИДА, СК (мезотрион, 480 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,25-0,3	Кукуруза	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 3-5 ли- стьев культуры и 2-4 листьев у двудоль- ных сорняков		1
	0,2-0,3	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см		1
	0,2-0,3	Фацелия (семенные по- севы)	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
Мезотрион + никосульфурон						
ГАВАНЬ ПЛЮС, МД (мезотрион, 75 г/л + никосульфурон, 30 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1,25-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые, однолет- ные двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры	60	1
САТУРН ДУО, МД (мезотрион, 55 г/л + никосульфурон, 40 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь	1,25-1,5	Кукуруза (кроме семен- ных посевов)	Однолетние и многолетние зла- ковые, однолет- ные и некоторые многолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев культуры при высоте пырея ползу- чего 10-15 см	60	1

(Р), (П-3)	1,5	Яблоня	То же	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной до цветения сада (при условии защиты культуры)	60	1
ПИЛАРЛЮКС , МД (мезотрион, 100 г/л + никосульфурон, 40 г/л), Пиларквим (Шанхай) Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1-1,3	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см	60	1
ЭЛЮМИС , МД (мезотрион, 75 г/л + никосульфурон, 30 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	1,25-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-20 см		1
Мезотрион + никосульфурон + пиклорам						
ФУЛТАЙМ , МД (мезотрион, 75 г/л + никосульфурон, 37,5 г/л + пиклорам, 17,5 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1,25-1,5	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-8 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см. При необходимости пересева в год применения можно высевать только кукурузу		1
Мезотрион + никосульфурон + тифенсульфурон-метил						
СУПЕРКОРН , МД (мезотрион, 150 г/л + никосульфурон, 60 г/л + тифенсульфурон-метил, 11,25 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	0,75-1	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-8 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
Мезотрион + тербутилазин						
КАЛАРИС , КС (мезотрион, 70 г/л + тербутилазин, 330 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	1-1,5	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев культуры	90 (зеленая масса) 110 (зерно)	1
Метазахлор						
КАРДИНАЛ 500 КС (метазахлор, 500 г/л), INTERNACIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V., Мексика	1,2-1,8	Рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева или по всходам культуры в фазу семядольных листьев сорняков		1

(Р), (П-3)	1,2-1,8	Капуста белокочанная (безрассадная технология)	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры (с обязательным последующим поливом)		1
	1,2-1,8	Капуста белокочанная (рассадная технология)	То же	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт		1
	1,2-1,8	То же	То же	Опрыскивание почвы через 1-7 дней после высадки рассады в грунт (с обязательным последующим поливом)		
РАПУЗИ 500 , КС (метазахлор, 500 г/л), ЦИЭХ Сажина Акционерное Общество, Польша (Р), (П-3)	1,2-1,5	Рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов или по всходам культуры в фазу семядольных листьев сорняков		1
СИРИУС , КС (метазахлор, 400 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1,5-2	То же	То же	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (семядольные листья)		
СУЛТАН , СК (метазахлор, 500 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1,2-1,8	Рапс яровой и озимый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	40	1
	1,2-1,8	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры и семядольных листьев сорняков		
	1,2-1,8	Капуста белокочанная (рассадная технология)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт	125	1
	1,2-1,8	То же	То же	Опрыскивание почвы после высадки рассады в грунт (обязательный последующий полив)		
ЭМБАРГО , КС (метазахлор, 400 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	30	1
	1,75-2	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу семядольных листьев сорняков		
	1,5-2	Сурепица озимая	Однолетние двудольные, просо, кукуруза	Опрыскивание почвы после посевов до всходов культуры	40	1
Метазахлор + аминокипиралид + пиклорам						

ТРИВАЛЬДИ, КС (метазахлор, 500 г/л + аминопиралид, 5,3 г/л + пиклорам, 13,3 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	1-1,2	Рапс озимый	Однолетние дву- дольные, мятлик однолетний	Опрыскивание посе- вов до всходов куль- туры		1
	1,2-1,5	То же	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2-4 настоящих ли- стьев у культуры		
Метазахлор + диметенамид-П						
БУТИЗАН ДУО, КЭ (метазахлор, 200 г/л + диметенамид-П, 200 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс ЮС ЛЛК, США (Р), (П-3)	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1,5-2	То же	То же	Опрыскивание посе- вов в ранние фазы развития сорняков (семядольные ли- стья)		
	1,5-2	Капуста бело- кочанная (без- рассадная тех- нология)	То же	Опрыскивание почвы после сева до всходов культуры	30	1
	1,5-2	Капуста бело- кочанная (рас- садная техно- логия)	То же	Опрыскивание почвы до высадки рассады в грунт		

Метазахлор + квинмерак						
БУТИЗАН СТАР, КС (метазахлор, 333 г/л + квинмерак, 83 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс Дойчланд ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	1,5-2	Рапс яровой и озимый	Однолетние зла- ковые и двудоль- ные сорняки, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1,5-1,7	Рапс озимый	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-4 ли- стьев культуры, ран- ние фазы роста сор- няков		
	1,25-1,5	Гречиха	Однолетние дву- дольные, в т.ч. подмаренник цеп- кий и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1,5-2	Сурепица ози- мая	Однолетние дву- дольные и злако- вые	То же		1
ОРЛАН, МК (метазахлор, 250 г/л + квинмерак, 63 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	2-2,7	Рапс озимый	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов до всходов куль- туры		1
	2-2,7	То же	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-2 ли- стьев культуры, ран- ние фазы роста сор- няков		
	2,3-2,7	Рапс яровой	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов до всходов куль- туры		1
	2,3-2,7	То же	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-2 ли-		

				стве культуры, ранние фазы роста сорняков		
СИРИУС КВИН , КС (метазахлор, 333 г/л + квинмерак, 83 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	1,5-2	Рапс озимый	Однолетние злаковые и двудольные, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1,5-1,7	То же	То же	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (семядольные листья)		
	1,5-1,7	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-4 листьев культуры, в ранние фазы развития сорняков		1
СУЛТАН ТОП , КС (квинмерак, 125 г/л + метазахлор, 375 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1,3-1,8	Рапс озимый и яровой	Однолетние злаковые и двудольные, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1,3-1,8	То же	То же	Опрыскивание посевов до фазы 4 листьев культуры и семядольных листьев сорняков		
ТРАНС Супер , СК (метазахлор, 333 г/л + квинмерак, 83 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1,25-1,5	Гречиха	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные и злаковые, в т.ч. подмаренник цепкий	То же		1
	1,5-1,7	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу семядольных листьев сорняков		
	1,5-2	Сурепица озимая	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	40	1
Метазахлор + квинмерак + диметенамид-П						
БУТИЗАН АВАНТ , СЭ (метазахлор, 300 г/л + квинмерак, 100 г/л + диметенамид-П, 100 г/л), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс ЮС ЛЛК, США (Р), (П-3)	1,5-2	Рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	30	1
	1,5-2	То же	То же	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (семядольные листья)		
Метазахлор + кломазон						
ГАЛС СУПЕР , СЭ (метазахлор, 250 г/л + кломазон, 33,3 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	1,5-1,8	Рапс озимый	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы не позднее, чем через 3 дня после посева. Отмечается незначительное фитотоксическое действие на куль-	40	1

				туру, которое исчезает в течение месяца		
	1,5-1,8	Рапс яровой	Однолетние двудольные и злаковые	То же		
КАЛИФ МЕГА, МКС (метазахлор, 250 г/л + кломазон 33, г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	2-3	Рапс озимый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы не позднее, чем через 3 дня после посева. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца		1
	1,8-2	Рапс яровой	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
Метамитрон						
ГИФТРОН, КС (метамитрон, 700 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама	147	3
	1,5	Свекла столовая	То же	То же	124	3
ГОЛТИКС, КС (метамитрон, 700 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия B.V., Нидерланды (Р), (П-3)	5-6	Свекла сахарная, столовая и кормовая (не более 6 л/га)	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		1
	1,5		То же	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама		3
ГОЛТИКС ГОЛД, КС (метамитрон, 700 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	5-6	Свекла сахарная (не более 6 л/га)	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры	67	1
	1,5		То же	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков;		3

				второе и третье - по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама		
ЛАВИНА, КС (метамитрон, 700 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	5-6	Свекла сахарная, кормовая и столовая (не более 6 л/га)	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		1
	1,5		То же	Трехкратное опрыскивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков в ту же фазу. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама		3
	2-3	Люпин узколистный (семенные посевы)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры		1
	1-2	Валериана лекарственная (на сырье)	То же	Опрыскивание плантаций после высадки рассады (в фазу 3-4 листьев культуры) в ранние фазы роста сорняков		1
МАРИУС, КС (метамитрон, 700 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	5-6	Свекла сахарная (не более 6 л/га)	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		1
	1,5		То же	Трехкратное опрыскивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама		3
МЕТАРОН, КС (метамитрон, 700 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	1,5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами	60	3

				на основе фенмедифама и десмедифама		
МЕТАТРОН, КС (метамитрон, 700 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	1,5	Свекла сахарная	Однолетние дву- дольные	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама	115	3
МЕТАФОЛ, СК , (метамитрон, 700 г/л), ЮПЛ Европа Лтд, Соединенное Королевство (Р), (П-3)	5-6	Свекла сахарная	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры	60	1
	1,5	Свекла сахарная и столовая	То же	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама	60	3
МИТРОН, КС (метамитрон, 700 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	5-6	Свекла сахарная, столовая и кормовая (не более 6 л/га)	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		1
	1,5		То же	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама		3
	1,5	Люпин узко- листный	То же	Двукратное опрыскивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков, второе – по мере появления новых всходов сорняков		2
	2-3	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры и ранние фазы развития сорняков		1

	5,7-8,5	Лаванда, мята перечная	То же	Ранневесенняя обработка почвы до начала вегетации культуры		1
	5,7	Шалфей мускатный	То же	Опрыскивание плантаций по вегетирующим растениям в фазу розетки (6-8 листьев культуры)		1
ПИЛОТ, ВСК (метамитрон, 700 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	5-6	Свекла сахарная (не более 6 л/га)	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		1
	1,5		То же	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама		3
	2	Люпин узколистный	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-х настоящих листьев культуры и семядольных листьев сорняков		1
СКРИН, КС (метамитрон, 700 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	5-6	Свекла сахарная (не более 6 л/га)	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		1
	1,5		То же	Трехкратное опрыскивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков, второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе десмедифама и фенмедифама		3
	1,5	Свекла столовая	То же	То же		3
Метамитрон + ленацил						
ПИЛОТ ПЛЮС, СК (метамитрон, 480 г/л + ленацил, 120 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. падалица рапса	Двух- или трехкратное опрыскивание посевов в фазу семядольных листьев сорняков. Применять в смеси с препара-		2-3

				тами на основе фен-медифама и десмедифама		
	2-3 1-1,5	Свекла сахарная (не более 5,25 л/га)	То же	Трехкратное опрыскивание: -первое - опрыскивание почвы до всходов культуры; -второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе фенмедифама и десмедифама		3
Метамитрон + хлорпрофам						
МЕТАМИКС, СЭ (метамитрон, 400 г/л + хлорпрофам, 100 г/л), ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Трехкратное опрыскивание: первое - в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых всходов сорняков. Применять в смеси с препаратами на основе бетанальной группы		3
Метрибузин						
ЗЕНКОР УЛЬТРА, КС (метрибузин, 600 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,35-0,45	Горох посевной	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	0,9-1,2	Картофель	То же	Опрыскивание почвы до всходов культуры		1
	0,85	То же	То же	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см		
	0,6 0,3-0,55	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое-до всходов; второе после всходов, при высоте картофеля до 5 см		2
	0,5 0,4	Морковь	То же	Двукратное опрыскивание: первое – до всходов; второе – в фазу 2-х настоящих листьев культуры	108	2
ЗЕНКОШАНС, КС (метрибузин, 600 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,25-0,3	Пшеница, тритикале, ячмень и рожь озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев. Во влажных погодных условиях применять минимальную норму из рекомендованных	30	1

	0,9-1,2	Картофель	Однолетние дву- дольные, просо куриное	Опрыскивание почвы до всходов культуры	60	1
	0,9	То же	То же	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см		
	0,6 0,3-0,55	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание: первое - до всходов; второе - по- сле всходов, при вы- соте картофеля до 5 см		2
	0,35- 0,45	Горох посевной	Марь белая, пас- лен черный, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	30	1
ЗОНТРАН , ККР (метрибузин, 250 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,6	Пшеница, три- тикале и рожь озимые	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2- 3 листьев или ранней весной в фазу куще- ния культуры. Во влажных погодных условиях применять минимальную норму из рекомендованных	30	1
	0,3-0,6	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2- 3 листьев культуры. Во влажных погод- ных условиях приме- нять минимальную норму из рекомендо- ванных	30	1
	1,1-1,4	Картофель	То же	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см	78	1
	1 0,5	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание: первое – по вегети- рующим сорнякам до всходов культуры; второе – после всхо- дов, при высоте кар- тофеля до 5 см	78	2
	1-1,5	Люцерна 2-го года жизни (семенные по- севы)	То же	Опрыскивание посе- вов при высоте лю- церны 10-15 см		1
	0,5-0,8	Эхинацея пур- пурная	То же	Опрыскивание по ве- гетирующим сорня- кам после посева до всходов культуры		1
	1-1,4	То же	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		
ЛАЗУРИТ , СП в во- дорастворимых паке- тах	0,75-1	Картофель	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание после посадки до всходов культуры		1

(метрибузин, 700 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,75	То же	То же	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см		
	0,5 0,25-0,5	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – до всходов; второе – после всходов, при высоте картофеля до 5 см		2
ЛАЗУРИТ СУПЕР, КНЭ (метрибузин, 270 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,28-0,56	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры		1
	1,35	Картофель	То же	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см		1
	0,9 0,45	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – до всходов; второе – после всходов, при высоте картофеля до 5 см		2
	1-1,3	Эхинацея пурпурная	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
ЛАЗУРИТ УЛЬТРА, СК (метрибузин, 600 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,25-0,3	Пшеница, тритикале, рожь и ячмень озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев культуры		1
	0,35-0,45	Горох посевной	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	0,35-0,6	Люпин узколистный	То же	То же		1
	0,9-1,2	Картофель	То же	Опрыскивание почвы до всходов культуры		1
	0,85	То же	То же	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см		
	0,6 0,3-0,55	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое - до всходов культуры; второе - после всходов, при высоте картофеля до 5 см		2
	1,6	Люцерна 2-го и последующих лет вегетации	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов до начала отрастания культуры	38	1
	1,25	То же	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	Опрыскивание посевов при высоте люцерны 10-15 см		
	0,3-0,5	Декоративные кустарники (кизильник, спирея), в т.ч. в населенных пунктах	То же	Опрыскивание почвы до распускания почек (при условии защиты культуры)		1

	2	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние двухдольные и злаковые, некоторые многолетние двухдольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период активного роста		1
МАГНАТ, ВДГ (метрибузин, 750 г/кг), Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,2-0,25	Пшеница, тритикале озимые	Однолетние двухдольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-4 листьев культуры	30	1
	0,2-0,25	Рожь озимая	Однолетние двухдольные, метлица обыкновенная	То же	30	1
	0,2-0,3	Горох посевной	Однолетние двухдольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
	0,95	Картофель	То же	Опрыскивание после посадки до всходов культуры	79	1
	0,7-0,75	То же	То же	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см		
МЕТРИБУТ, КС (метрибузин, 500 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,3-0,4	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двухдольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев культуры	30	1
	0,3-0,4		То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		
	0,8-1,4	Картофель	Однолетние двухдольные, просо куриное	Опрыскивание почвы до всходов культуры	60	1
	0,7	То же	То же	Опрыскивание после посадки до всходов культуры	60	2
	0,35-0,65			Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см		
МИСТРАЛЬ ТОП, КС (метрибузин, 480 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1,1-1,5	Картофель	Однолетние двухдольные, просо куриное	Опрыскивание почвы до всходов культуры	32	1
	1,1	То же	То же	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см		
	0,75 0,4-0,7	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – до всходов; второе – после всходов, при высоте картофеля до 5 см		2

МОЛБУЗИН , ВДГ (метрибузин, 750 г/кг), Пиларквим (Шанхай) КО., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,18-0,3	Пшеница ози- мая	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2- 4 листьев культуры	30	1
	1	Картофель (не более 1 кг/га)	То же	Опрыскивание после посадки до всходов культуры	50	1
	0,75		То же	Опрыскивание по всходам при высоте картофеля до 5 см		2
	0,5 0,5		То же	Двукратное опрыс- кивание: первое - до всходов; второе - после всхо- дов, при высоте кар- тофеля до 5 см		
	0,2-0,3	Горох посевной	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	30	1
СОЙЛ ФЛЮИД , КС (метрибузин, 600 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-З)	0,25- 0,35	Пшеница и три- тикале озимые	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2- 4 листьев культуры		1
	0,25- 0,35	То же	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры		
	0,9-1,2	Картофель	То же	Опрыскивание почвы до всходов культуры		1
	0,85	То же	То же	Опрыскивание по всходам, при высоте картофеля до 5 см		
	0,6 0,5	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание: первое - до всходов; второе - после всхо- дов, при высоте кар- тофеля до 5 см		2
ТОПКАМА , КС (метрибузин, 600 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,35- 0,45	Горох посевной	Однолетние дву- дольные, просо куриное	Опрыскивание почвы до всходов культуры	30	1
	0,9-1,2	Картофель	То же	То же	104	1
ЮНИМАРК , ВДГ (метрибузин, 700 г/кг), ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-З)	0,2-0,3	Пшеница ози- мая	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2- 4 листьев культуры		1
	0,75-1	Картофель	Однолетние дву- дольные, просо куриное	Опрыскивание после посадки до всходов культуры		1
Метрибузин + трибенурон-метил						
ТАМЕРОН СУПЕР , ВДГ (метрибузин, 700 г/кг + трибенурон-метил, 60 г/кг), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь (Р), (П-З)	0,2-0,3	Пшеница, три- тикале, рожь и ячмень озимые	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу кущения культуры		1
	0,2-0,3	Пшеница, три- тикале и ячмень озимые	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры		
Метсульфурон-метил						

МАГНУМ , ВДГ (метсульфурон-метил, 600 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	8-10 г/га	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот, бодяк)	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-4 листьев культуры. Не рекомендуется высевать на следующий год свеклу		1
	8-10 г/га	Тритикале и рожь озимые	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры. Не рекомендуется высевать на следующий год свеклу		
	10 г/га	Пшеница, тритикале озимые, пшеница, тритикале и ячмень яровые, овес	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры. Не рекомендуется высевать на следующий год свеклу		
	10 г/га	Рожь озимая	Однолетние двудольные	То же		
	8-10 г/га	Лен-долгунец	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (бодяк)	Опрыскивание посевов льна в фазу «елочки» и 2-4 листьев сорняков. Не рекомендуется высевать на следующий год свеклу		1
	8-10 г/га	Лен масличный	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные	То же		1
	40-100 г/га	Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. борщевик Сосновского, золотарник канадский	Опрыскивание растений до высоты 30 см		1
	100-300 г/га	То же	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. борщевик Сосновского, золотарник канадский и некоторые злаковые	То же		
	7,5 г/га	Газоны	Одуванчик лекарственный	Опрыскивание в период вегетации через 3-4 дня после скашивания газонного травостоя		1-2

Метсульфурон-метил + трибенурон-метил						
ПЛУГГЕР, ВДГ (метсульфурон-метил, 125 г/кг + трибену- рон-метил, 625 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	10-15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Пшеница, три- тикале и ячмень озимые	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2- 3 листа - кушение культуры		1
	10-15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Рожь озимая	То же	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу кушения культуры		
	10-15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Пшеница, яч- мень и рожь озимые, трити- кале озимая и яровая	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- шения культуры		
	15-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Пшеница ози- мая	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу трубкование – флаг- лист культуры		
	10-15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Пшеница и яч- мень яровые	Однолетние дву- дольные и неко- торые многолет- ные двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу кушения культуры, 2-4 листа однолетних сорняков и в фазу розетки многолетних сорня- ков		
	10-15 г/га	Овес	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу кушения культуры		
ЭЛЛАЙ ЛАЙТ, ВДГ (метсульфурон-метил, 391 г/кг + трибену- рон-метил, 261 г/кг), ООО «ЭфЭмСи», Рос- сия (Р), (П-З)	6-8 г/га	Пшеница, три- тикале и рожь озимые, пше- ница и ячмень яровые	Однолетние дву- дольные и неко- торые многолет- ные двудольные (осот, бодяк)	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- шения – флаг-листа культуры, в фазу 2-4 листа однолетних сорняков и фазу ро- зетки многолетних сорняков		1
	6-8 г/га + 200 мл/га ПАВ Тренд 90	То же	То же	То же		
МЦПА кислота						
АГРИТОКС, в.к.	1-1,5	Пшеница ози- мая	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу кушения культуры		1

(МЦПА, 500 г/л (смесь диметиламинной, калиевой и натриевой солей)), Нуфарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия (Р), (П-3)	0,7-1,2	Пшеница яровая	То же	То же		1
	0,7-1,2	Просо	То же	То же		1
	0,9-1,7	Картофель	То же	Опрыскивание посадок до всходов культуры		1
	0,7-1,2	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см		1
	0,5-0,8	Горох посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры (высота растений 10-15 см)		1
	0,8-1,2	Клевер полевой под покровом ячменя	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев клевера (в фазу кущения ячменя)	45	1
АГРОШАНС, ВК (МЦПА, 500 г/л (смесь диметиламинной, калиевой, натриевой солей)), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры до выхода в трубку	57	1
	0,7-1,2	Пшеница и ячмень яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	0,8-1,2	Овес	То же	То же	30	1
	0,7-1,2	Пшеница и ячмень яровые с подсевом клевера	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения зерновых и в 1-2 тройчатых листа клевера	57	1
	0,5-0,8	Горох посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры (высота растений 10-15 см)	30	1
	0,7-1,2	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см	94	1
	0,7-1,2	Лен масличный	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см	94	1
	1,2	Клевер луговой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры	30	1
	1-1,5	Тимофеевка луговая	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	0,9-1,7	Картофель	То же	Опрыскивание посадок до всходов культуры	99	1
ГЕРБИТОКС, ВРК (МЦПА кислоты, 500 г/л),	1-1,5	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры до выхода в трубку		1

АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,7-1,2	Ячмень яровой, овес	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры до выхода в трубку		1
	0,8-1,2	Ячмень с подсе- вом клевера лу- гового	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения ячменя и 1-2 тройча- тых листа у клевера лугового	30	1
	0,7-1,2	Лен-долгунец, лен масличный	То же	Опрыскивание посе- вов льна в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см		1
	0,5-0,8	Горох посевной	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 насто- ящих листьев куль- туры (высота расте- ний 10-15 см)	53	1
	0,8-1	Картофель	То же	Опрыскивание поса- док после появления всходов при высоте культуры 10-15 см	40	1
	0,8-1,2	Клевер луговой	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-2 трой- чатых листьев куль- туры	30	1
	1-1,5	Тимофеевка лу- говая	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры	15	1
	0,6-1	Сенокосы и пастбища	То же	Опрыскивание в ран- ние фазы роста сор- няков	21	1
КАПЕЛЬ , ВРК (МЦПА, 750 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,7-1	Пшеница и три- тикале озимые	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры весной	104	1
	0,7-1	Пшеница и яч- мень яровые	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры	30	1
	0,6-1	Ячмень яровой с подсевом кле- вера	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-2 трой- чатых листьев кле- вера (в фазу кущения зерновых)	30	1
	0,5	Горох посевной	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 насто- ящих листьев	30	1
	0,5-0,75	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см	79	1
	0,6-1,1	Картофель	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание поса- док до всходов куль- туры	104	1
КОРТИК , ВР (МЦПА кислоты, 300 г/л),	1-1,5	Пшеница и три- тикале озимые	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения - до выхода в трубку культуры	30	1

АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,8-1,2	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	0,8-1,5	Ячмень яровой	То же	То же	30	1
	0,8-1,2	Овес	То же	То же	30	1
	0,9-1,2	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см	80	1
	0,6-0,9	Горох посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры (высота растений 10-15 см)	62	1
	0,9-1,2	Клевер луговой	То же	Опрыскивание в год посева после появления первого тройчатого листа культуры	29	1
	0,9-1,2	Ячмень с подсевом клевера	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев клевера (в фазу кущения ячменя)	29	1
МОМУС , ВРК (МЦПА, 500 г/л (смесь диметиламинной, калиевой, натриевой солей)), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	0,8-1,2	Ячмень яровой с подсевом клевера	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев клевера (в фазу кущения ячменя)	30	1
	0,6-0,9	Горох посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры (высота растений 10-15 см)	60	1
	0,8-1	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см	81	1
	0,8-1,2	Люцерна посевная 1-го года вегетации	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев культуры	30	1
2М-4Х 750 , в.р. (МЦПА кислоты, 750 г/л), Нуфарм ГмбХ и Ко КГ, Австрия (Р), (П-3)	0,7-1	Пшеница озимая и яровая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры до выхода в трубку		1
	0,7-1	Тритикале озимая	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения до выхода в трубку культуры		1
	0,7-1	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		1
	0,7-1	Тритикале яровая, овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения – выход в трубку культуры		1
	0,6	Ячмень яровой с подсевом люцерны посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения		1

				ячменя и в фазу 1-2 листьев люцерны		
	0,5-1	Просо посевное	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения – выход в трубку культуры		1
	0,5	Горох посевной (на зерно)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 настоящих листьев культуры		1
	0,5-0,75	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки», при высоте льна 3-10 см		1
	0,6-1	Клевер полевой под покровом ячменя	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев клевера и в фазу кушения ячменя	45	1
ХВАСТОКС 750, ВР (МЦПА кислоты, 750 г/л), ЦИЭХ Сажина Акционерное Общество, Польша (Р), (П-3)	0,7-1	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двухдольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		1
	1	Тритикале озимая	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		1
	0,7-1	Пшеница яровая, овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения – до выхода в трубку зерновых культур		1
	0,5-0,75	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» при высоте культуры 3-10 см		1
	0,6-1	Клевер под покровом ячменя	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев клевера и в фазу кушения ячменя		1
	0,6-1,1	Картофель	То же	Опрыскивание до всходов культуры		1
	0,5	Горох посевной	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
	0,6	Люцерна под покровом ячменя	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 настоящих листьев люцерны и в фазу кушения ячменя		1
	0,6-1	Сенокосные угодья и пастбища под покровом ячменя	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 тройчатых листьев клевера лугового и ползучего (в фазу кушения ячменя)		1
ХВАСТОКС ЭКСТРА, ВР (МЦПА кислоты, 300 г/л),	3-3,5	Пшеница яровая	Однолетние двухдольные	Опрыскивание посевов в фазу полного кушения до выхода в трубку		1

ЦИЭХ Сажина Акционерное Общество, Польша (Р), (П-3)	3-3,5	Яблоня	То же	Опрыскивание сорняков до их цветения		1
	0,6	Ромашка аптечная	То же	Опрыскивание культуры в фазу розетки		1
Никосульфурон						
ДУБЛОН , СК (никосульфурон, 40 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при 2-4 листьях у сорняков		1
	1,5	То же	То же, а также многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-8 листьев культуры при высоте многолетних сорняков 10-20 см		
КИПКОРН , ВДГ (никосульфурон, 700 г/кг), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	50-70 г/га + 200 мл/га ПАВ Шанс-90, Ж	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при 2-4 листьях у сорняков	60	1
	80-90 г/га		Однолетние и многолетние злаковые, некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-20 см		
МИЛАНО , КС (никосульфурон, 40 г/л), ООО «Белхимпродукт», Беларусь (Р), (П-3)	1-1,25	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при 2-4 листьях у сорняков	35	1
	1,3-1,5	То же	Однолетние злаковые и двудольные, многолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу 3-8 листьев культуры при высоте многолетних сорняков 10-20 см		
НИКОС , КС (никосульфурон, 40 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	1-1,25	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при 2-4 листьях у сорняков	60	1
	1,3-1,5	То же	Однолетние и многолетние злаковые, некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при высоте многолетних сорняков 10-20 см		
НИКОСТАР 40 КС (никосульфурон, 40 г/л), INTERNACIONAL QUIMICA DE COBRE S.A. DE C.V., Мексика (Р), (П-3)	1-1,25	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры и 2-4 листьев сорняков	60	1
	1,3-1,5	То же	Однолетние злаковые и двудольные, многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-8 листьев культуры при высоте многолетних сорняков 10-20 см		

САМСОН 4 СК (никосульфурон, 40 г/л), ISK Biosciences Europe N.V., Бельгия (Р), (П-З)	1-1,25	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при 2-4 листьях у сорняков	70	1
	1,3-1,5	То же	Однолетние злаковые и двудольные, многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-8 листьев культуры при высоте многолетних сорняков 10-20 см		
САМСОН ЭКСТРА, МД (никосульфурон, 60 г/л), ISK Biosciences Europe N.V., Бельгия (Р), (П-З)	0,75	Кукуруза	Однолетние злаковые и двудольные, многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-8 листьев культуры и 2-4 листьев у однолетних сорняков при высоте многолетних сорняков 10-20 см	78	1
САТУРН, МД (никосульфурон, 40 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	1-1,3	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при 2-4 листьях у сорняков	60	1
	1,3-1,5	То же	То же, многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-8 листьев культуры при высоте многолетних сорняков 10-20 см		
ХОРС, ВДГ (никосульфурон, 750 г/кг), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	50-60 г/га + 200 мл/га ПАВ Бит 90	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры при 2-4 листьях у сорняков	60	1
	80-100 г/га	То же	То же, пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 3-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-20 см		
Никосульфурон + дикамба + дифлуфензопир						
КЕЛЬВИН ПЛЮС, ВДГ (никосульфурон, 106 г/кг + дикамба, 424 г/кг + дифлуфензопир, 170 г/кг), БАСФ Агрикалчерал Солюшнс ЮС ЛЛК, США (Р), (П-З)	0,3-0,35 кг/га + 1 л/га ПАВ ДАШ, КЭ	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
Никосульфурон + мезотрион + флорасулам						
МОДЕРН ПРЕМИУМ, МД (никосульфурон, 38 г/л + мезотрион, 75 г/л + флорасулам, 2,4 г/л),	1-2 л/га + 100 мл/га ПАВ Биотон, ВК	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние двудольные, виды осотов	Опрыскивание посевов в фазу 3-5-листьев культуры	58	1

ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-З)						
Никосульфурон + римсульфурон						
ГЕТМАН , ВДГ (никосульфурон, 500 г/кг + римсульфу- рон, 250 г/кг), ЧТУП «Умная хи- мия», Беларусь (Р), (П-З)	30-40 г/га + 200 мл/га ПАВ 200	Кукуруза (кроме семенных посе- вов)	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев культуры при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		1
СТЕДФАСТ , ВДГ (никосульфурон, 500 г/кг + римсульфу- рон, 250 г/кг), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-З)	20-40 г/га + 200 мл/га ПАВ Виволт	Кукуруза (кроме семенных посе- вов)	Однолетние и многолетние зла- ковые и некото- рые двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев культуры при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		1
Никосульфурон + тифенсульфурон-метил						
ДУБЛОН Голд , ВДГ (никосульфурон, 600 г/кг + тифенсуль- фурон-метил, 150 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-З)	50–70 г/га + 200 мл/га ПАВ Адю, Ж	Кукуруза (кроме семен- ных посевов)	Однолетние и многолетние зла- ковые, однолет- ние и некоторые многолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры (при 2-4 листьях двудоль- ных сорняков, до начала кущения од- нолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10- 20 см)		1
ФАЭТОН ТУРБО , МД (никосульфурон, 60 г/л + тифенсульфу- рон-метил, 10 г/л), ООО «Франдеса», Бе- ларусь (Р), (П-З)	0,8–1	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые, однолет- ние и некоторые многолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры, при высоте пырея ползу- чего 10-15 см	60 (зеле- ная масса), 125 (зерно)	1
Никосульфурон + толпиралат						
БРУСИЯ ЭКСТРА , МД (никосульфурон, 30 г/л + толпиралат, 30 г/л), ИСК Биосайенсис Юроп Н.В., Бельгия (Р), (П-З)	1,33- 1,75	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые и некото- рые однолетние и многолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-5 ли- стьев культуры		1
Никосульфурон + трибенурон-метил + римсульфурон + флорасулам						
ЭМБОДИ СЕНС , ВДГ (никосульфурон, 260 г/кг + трибену- рон-метил, 235 г/кг + римсульфурон, 150 г/кг + флорасулам, 30 г/кг), АО Фирма «Август», Россия	0,075- 0,1 + 0,2 ПАВ Адю, Ж	Свекла сахарная (гибриды с устойчивостью к ацетолактат- синтазе (ALS))	Однолетние дву- дольные, просо куриное	Двукратное опрыс- кивание: первое – в фазу 2- настоящих листьев сорняков; второе – по мере по- явления новых сор- няков в ту же фазу	60	2
	0,12	То же	То же	То же		

(Р), (П-3)	+ 0,2 ПАВ Адью, Ж 0,07 + 0,2 ПАВ Адью, Ж					
Никосульфурон + флорасулам						
ОКТАВА, МД (никосульфурон, 60 г/л + флорасулам, 3,6 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-3)	0,75-1	Кукуруза (кроме семен- ных посевов)	Однолетние и многолетние зла- ковые, некоторые однолетние и многолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры при высоте пырея ползу- чего 10-15 см	28	1
Никосульфурон + флорасулам + тифенсульфурон-метил						
КРЕЙЦЕР, ВДГ (никосульфурон, 650 г/кг + флорасу- лам, 40 г/кг + тифен- сульфурон-метил, 60 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	90-110 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Кукуруза (кроме семен- ных посевов)	Однолетние и многолетние зла- ковые, некоторые однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев культуры при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		1
ТЮДОР 114, МД (никосульфурон, 80 г/л + тифенсульфу- рон-метил, 24 г/л + флорасулам, 10 г/л), ООО ИННВИГО, Польша (Р), (П-3)	0,5-0,65	Кукуруза (кроме семен- ных посевов)	Однолетние и многолетние зла- ковые, некоторые однолетние и многолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-8 ли- стьев культуры при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		1
Оксифлуорфен						
АКЗИФОР, КЭ (оксифлуорфен, 240 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,5	Лук всех генера- ций (кроме лука на перо)	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу двух ли- стьев культуры		1
	1	То же	То же	Опрыскивание посе- вов с фазы трех ли- стьев культуры		
ГОАЛ 2Е, КЭ (оксифлуорфен, 240 г/л), Нутрикем Компани Лимитед, Китай (Р), (П-3)	0,5	Лук всех генераций	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-х ли- стьев культуры	30	1
	1	То же	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-х ли- стьев культуры		
Пеларгоновая кислота						
МОХОФФ, МКЭ (пеларгоновая кис- лота, 525 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	10-20	Газоны	Мхи, нежелатель- ная травянистая растительность	Обработка участков- газона засоренных мхами через 3-5 дней после скашивания с последующим подсе- вом газонных трав		1
	10	Парники и теп- лицы	То же	Опрыскивание по- верхностей, на кото- рых присутствуют мхи, нежелательная		1

				травянистая растительность, до посадки или после уборки культурных растений		
Пендиметалин						
ПЕНДИФОРС , КЭ (пендиметалин, 330 г/л), Agri Sciences Ltd., Турция (Р), (П-3)	2,3-4,5	Лук репчатый из семян	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до всходов культуры	67 (лук-перо) 108 (лук-репка)	1
СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ , МКС (пендиметалин, 455 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-3)	2-3	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	70	1
	2-3	Горох посевной	То же	То же	31	1
	2-3	Картофель	То же	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры	84	1
	3	Капуста белокочанная	То же	Опрыскивание почвы до высадки рассады	37	1
	2,2-4,3	Морковь столовая	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	136	1
	3,2	Лук репчатый	То же	То же	30	1
	1,2	То же	То же	Трехкратное опрыскивание: первое – опрыскивание почвы после посева до всходов культуры; второе и третье – в фазу белых нитей семядольных листьев (всходов) сорняков	70 (перо) 70 (луковица)	3
	3	Чеснок озимый	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	123	1
	4,4	Яблоня (питомник)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до всходов сорняков		1
	2,2	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – до всходов сорняков; второе – по мере появления сорняков		2
	1,45	То же	То же	Трехкратное опрыскивание: первое – до всходов сорняков; второе и третье – по мере появления сорняков		3
	2-3	Валериана лекарственная (на сырье)	То же	Опрыскивание плантаций после высадки рассады (в фазу 3-4 листьев культуры)	135	1
	1,5-2,2	Календула лекарственная	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	63	1

	1,5-2,5	Эхинацея пурпурная	То же	То же		1
	2,2	Расторопша пятнистая	То же	То же	92	1
ЭСТАМП, КЭ (пендиметалин, 330 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (П-3)	4-5	Подсолнечник	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	3-6	Капуста рассадная	То же	Опрыскивание почвы до высадки рассады		1
	2,3-4,5	Лук (всех генераций), чеснок озимый	То же	Опрыскивание почвы до всходов культуры		1
	2	Валериана лекарственная	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	2-3	Календула лекарственная	То же	То же		1
	2	Пустырник сердечный	То же	То же		1
	4,5-6	Валериана лекарственная (на сырье)	То же	Опрыскивание почвы до высадки рассады		1
	3-4	То же	То же	Опрыскивание плантаций после высадки рассады (в фазу 3-4 листьев культуры)		
	3	Расторопша пятнистая	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	3-4	Декоративные кустарники (кизильник, спирея, пузыреплодник)	Однолетние двудольные, мятлик однолетний	Опрыскивание почвы до распускания почек (при условии защиты культуры)		1
Пендиметалин + изопротурон						
МАРАФОН, ВК (пендиметалин, 250 г/л + изопротурон, 125 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-3)	3,5-4	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние двудольные (ромашка, подмаренник, звездчатка и др.) и злаковые (метлица, мятлик)	Опрыскивание посевов осенью до всходов или в фазу 1-4 листьев культуры		1
	3,5-4	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		
	3,5-4	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью до всходов или в фазу 1-4 листьев культуры		1
	3	Ячмень яровой + люпин узколистный (на зерно)	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	3	Тритикале яровая + горох кормовой, тритикале яровая + люпин узколистный	То же	То же		1

Пендиметалин + пиколинафен						
МАРАФОН ПЛЮС, КС (пендиметалин, 320 г/л + пиколинафен, 16 г/л), БАСФ Агро Б.В., Швейцария (Р), (П-3)	2-2,5	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью до всходов, в фазу 1-3 листьев – кушения культуры или весной в фазу кушения культуры		1
	2-2,5	Рожь озимая, в т.ч. гибридная	То же	Опрыскивание посевов осенью до всходов или в фазу кушения культуры		1
	2-2,5	Ячмень озимый	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов осенью до всходов или в фазу 1-3 листа-кушения культуры		1
	2	Ячмень яровой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов до всходов, в фазу 1-3 листьев – середины кушения культуры		1
	2	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев – кушения культуры		1
Пендиметалин + тербутилазин						
ТРИК-П, СЭ (пендиметалин, 64 г/л + тербутилазин, 270 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	2,3-2,75	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние двудольные	Опрыскивание после посева до всходов культуры или в фазу 2-3 листьев культуры		1
Пендиметалин + хлортолурун + дифлюфеникан						
ТРИНИТИ, КС (пендиметалин, 300 г/л + хлортолурун, 250 г/л + дифлюфеникан, 40 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	2-2,5	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листа - кушение культуры	30	1
	2	То же	Метлица обыкновенная	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	2-2,5	Тритикале озимая	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листа культуры		
	2,5	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	2-2,5	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		
	2	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		
Пиноксаден						
АКСИАЛ 50, КЭ	0,6-1,2	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (в т.ч. мет-	Опрыскивание посевов в фазу кушения – флаг-листа культуры		1

(пиноксаден, 50 г/л + клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия (Р), (П-3)			лица обыкновен- ная, овсюг обык- новенный, просо куриное)	по вегетирующим сорнякам (с фазы 2-х листьев до конца ку- щения)		
	0,6-1,2	Тритикале озимая	Метлица обыкно- венная	То же		1
	0,6-1,2	Ячмень яровой	Однолетние зла- ковые (в т.ч. овсюг обыкновен- ный, просо кури- ное)	То же		1
	0,6-1,2	Пшеница яровая	Просо куриное	То же		1
АПРОВАТОР, КЭ (пиноксаден, 45 г/л + клоквинтосет-мексил (антидот), 11,25 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	0,7-1,3	Пшеница, три- тикале и ячмень озимые	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов весной по веге- тирующим сорнякам начиная со 2-го ли- ста до конца куще- ния (независимо от фазы развития куль- туры)	30	1
	0,7-1,3	Пшеница яровая	Просо куриное	Опрыскивание посе- вов по вегетирую- щим сорнякам начи- ная со 2-го листа до конца кущения (неза- висимо от фазы раз- вития культуры)	30	1
	0,7-1	Ячмень яровой	То же	То же	30	1
СМИЛОДОН, КЭ (пиноксаден, 60 г/л + клоквинтосет-метил (антидот), 15 г/л), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	0,75-1	Пшеница, три- тикале и ячмень озимые	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов весной по веге- тирующим сорнякам начиная со 2-го ли- ста до конца куще- ния (независимо от фазы развития куль- туры)	95	1
СТИНГРЕЙ, КЭ (пиноксаден, 50 г/л + клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,9	Пшеница, три- тикале и ячмень озимые	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов весной в фазе ку- щения культуры	35	1
	0,9-1,2	То же	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу трубкова- ния		
	0,9	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры	30	1
	1,2	То же	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу трубкова- ния		
ТЕСПИАН, КЭ (пиноксаден, 50 г/л + клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л (антидот)), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	0,7-0,9	Ячмень озимый	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов весной по веге- тирующим сорнякам, начиная со 2-го ли- ста до конца куще- ния (независимо от фазы развития куль- туры)	74	1
	0,7-0,9	Пшеница яровая	Просо куриное	То же	29	1
	0,7-1,2	Ячмень яровой	То же	То же		
Пиноксаден + флорасулам + клоквинтосет-мексил (антидот)						

АКСИАЛ КРОСС, КЭ (пиноксаден, 45 г/л + флорасулам, 5 г/л + клокви́нтосет-мексил (антидот), 11,25 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,7-0,9	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные, метлица обыкновенная	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-4 листьев культуры		1
	0,7-0,9	То же	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры		
	0,7-0,9	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-4 листьев культуры		1
	0,7-0,9	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры	40	
	0,7-0,9	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		1
СТАТУС КРОС, СЭ (пиноксаден, 45 г/л + флорасулам, 5 г/л + клокви́нтосет-мексил, 12 г/л (антидот)), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,7-0,9	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		1
	0,7-0,9	То же	То же	Опрыскивание посевов весной от фазы кушения до стадии 2-х междоузлий культуры	116	1
	0,7-0,9	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры	116	1
	0,7-0,9	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения до стадии 2-х междоузлий культуры	30	1
	0,7-0,9	Ячмень яровой	Однолетние двудольные, овсюг обыкновенный	То же	30	1
Пироксулам						
ПАЛЛАС 45, МД (пироксулам, 45 г/л), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	0,4	Пшеница и тритикале озимые	Метлица обыкновенная, некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью, начиная с фазы 2-3 листьев культуры и в ранние фазы развития сорняков		1
	0,4-0,5	Пшеница и тритикале озимые, пшеница яровая	Метлица обыкновенная, овсюг обыкновенный	Опрыскивание посевов весной до выхода в трубку культуры в ранние фазы развития сорняков		
Пироксулам + галаксифен-метил + клокви́нтосет						
ПАЛЛАС ЭКСТРА 317, ВДГ (пироксулам, 250 г/кг + галаксифен-метил, 69,5 г/кг + клокви́нтосет, 354 г/кг), ООО «Кортева Агрисаенс Рус», Россия (Р), (П-3)	75 г/га + 0,2 л/га ПАВ Виволт, Ж	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры весной		1
	90 г/га + 0,2 л/га ПАВ Виволт, Ж	То же	Однолетние двудольные и злаковые, бодяк полевой	То же		

	75г/га +1л/га ПАВ Серфер, ВРК	Пшеница яровая	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры		1
	90 г/га+ 1л/га ПАВ Серфер, ВРК	То же	Однолетние дву- дольные, просо куриное	То же		
Прометрин						
БРИГ, КС (прометрин, 500 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Овес + люпин узколистый	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1-1,5	Овес + вика яро- вая	То же	То же		1
	1-1,5	Овес + горох кормовой	То же	То же		1
	1-1,5	Гречиха	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. Во влажных погод- ных условиях приме- нять минимальную норму из рекомендо- ванных	30	1
	2-3	Кукуруза	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
	3-4	Бобы кормовые	То же	То же		1
	3-5	Горох посевной (на зерно)	То же	То же		1
	2	Горох овощной	То же	То же		1
	5	Люпин узко- листный	То же	То же		1
	3-4	То же	Однолетние дву- дольные, мятлик однолетний	То же		
	2-4	Подсолнечник	Однолетние дву- дольные и злако- вые	То же	60	1
	3-4	Картофель	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры	60	1
	2-3	Морковь столо- вая	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
ГАМБИТ, СК (прометрин, 500 г/л),	1-1,5	Гречиха	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	112	1

АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Овес + вика яровая (на зерно), овес + горох кормовой (на зерно)	То же	То же	100	1
	2-4	Подсолнечник	То же	То же	115	1
	3-4	Картофель	То же	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры	54	1
	2-4	Сильфия пронзеннолистная	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	3	Люпин узколистный	То же	То же	98	1
	4	Бобы кормовые	То же	То же	60	1
	2-3	Морковь	То же	То же	130	1
	3-4	Соя	То же	То же	133	1
	2	Горох овощной	То же	То же	88	1
	3	Горох (на зерно)	То же	То же	88	1
	1,5-2	Расторопша пятнистая	Однолетние двудольные, просо куриное	То же	98	1
ГЕЗАГАРД, КС (прометрин, 500 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	1-1,5	Овес + вика яровая, овес + горох кормовой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	40	1
	1,5	Гречиха	То же	То же	85	1
	3-4	Картофель	То же	То же	100	1
	2	Горох овощной	То же	То же	60	1
	3-5	Горох (на зерно)	То же	То же	60	1
	3-4	Бобы кормовые	То же	То же	60	1
	3-5	Люпин	То же	То же	60	1
	3	Фасоль	То же	Опрыскивание почвы за 2-3 дня до появления всходов культуры	115	1
	2-3	Морковь	То же	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры	50	1
	4	Петрушка	То же	Опрыскивание почвы до всходов культуры (в течение 2-5 дней после посева)	35	1
	3	То же	То же	Опрыскивание по всходам культуры	35	1
	2-3	Укроп	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	35	1
	2-2,5	Укроп (на семена) (не более 3 л/га)	То же	Опрыскивание в фазу 2-3 настоящих листьев культуры		1
	1,5		То же	Двукратное опрыскивание: -первое – до всходов культуры;		2

				-второе – в фазу 2-3 листьев культуры		
	1,5-2	Расторопша пятнистая	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	111	1
	2	Эхинацея пурпурная	То же	То же		1
ПОПТРИН, КС (прометрин, 500 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	3-4	Горох посевной	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы до всходов культуры	30	1
	3-4	Картофель	То же	То же	104	1
ПРОМЕТРЕКС ФЛО, КС (прометрин, 500 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	3-4	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры		1
	3	Горох (семенные посевы)	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1-1,5	Овес + вика яровая, овес + горох кормовой, овес + люпин узколистный (на зерно)	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культур		1
	1,2-1,3	Гречиха	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры (во влажных погодных условиях применять минимальную из рекомендованных норму расхода)		1
	3	Люпин желтый и узколистный	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	3-4	Соя	То же	То же		1
	3	Морковь	То же	Опрыскивание почвы до посева, до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры	120	1
	2-4	Подсолнечник	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1,5-2	Расторопша пятнистая	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	2,5	Ромашка аптечная	То же	Опрыскивание культуры в фазу розетки	40	1
САРМАТ, КС (прометрин, 500 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-З)	1-1,5	Овес + вика яровая, овес + горох кормовой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культур		1
	3-4	Картофель	То же	Опрыскивание почвы до всходов культуры		1
ШАНСГАРД, КС (прометрин, 500 г/л), ООО «Шанс», Россия	1,5	Овес + горох кормовой	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	30	1

(Р), (П-3)	3-5	Горох посевной	Однолетние дву- дольные, просо куриное	То же	30	1
	1,5	Гречиха	Однолетние дву- дольные и злако- вые	То же	30	1
	2-4	Подсолнечник	Однолетние дву- дольные, просо куриное	То же	30	1
	3-4	Картофель	То же	То же	104	1
	2-3	Морковь	То же	То же	132	1
Пропаквизафон						
ШОГУН, КЭ (пропаквизафон, 100 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	0,8	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу «елочки» культуры и 2-3 ли- стьев – начало куще- ния сорняков	75	1
	1,5	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу «елочки» культуры при высоте сорняков 10-15 см		
	1,2	Свекла сахарная	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание веге- тирующей культуры при высоте пырея ползучего – 10-15 см и в фазу 2-5 листьев однолетних злаковых сорняков	89	1
	1,3-1,5	Картофель	То же	То же	70	1
	0,5-1	Рапс озимый и яровой	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев у однолетних злаковых сорняков	40	1
	1-1,5	То же	Многолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,5-1	Гречиха	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев у однолетних злаковых сорняков	80	1
	1,25-1,5	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов до фазы бутони- зации культуры при высоте пырея ползу- чего 10-15 см (3-5 листьев)		
	0,5-1	Горох посевной	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев у однолетних злаковых сорняков	50	1
	1,25-1,5	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см (3-5 листьев)		
	0,5-1	Люпин узколистный	Однолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев у однолетних злаковых сорняков	30	1

	1,25-1,5	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (3-5 листьев)	88	1
	0,5-1	Морковь столовая	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков		
	1,25-1,5	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (3-5 листьев)		
	0,5-1	Капуста белокочанная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков	89	1
	1,25-1,5	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (3-5 листьев)		
	0,5-1	Лук репчатый	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних злаковых сорняков	59	1
	1,25-1,5	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (3-5 листьев)		
Пропизохлор						
ЛАДОН ПРО, КЭ (пропизохлор, 720 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	2,5-3	Рапс озимый	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		1
	2,5-3	Сурепица озимая	Однолетние двудольные и злаковые	То же		1
	2,5-3	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов до всходов культуры		1
ПИТОН, КЭ (пропизохлор, 720 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	2-2,5	Гречиха	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов	63	1
	2-3	Рапс озимый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов до всходов культуры		
	2,5-3	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		1
	2,5-3	Рапс яровой	Однолетние двудольные, просо куриное, осот полевой	Опрыскивание посевов до всходов культуры или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры		
	2,5-3	Сурепица озимая	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов до всходов культуры		

	2	Свекла сахарная	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов	60	1
ПРОНИТ , КЭ (пропизохлор, 720 г/л), Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (Р), (П-3)	2,5-3	Кукуруза	Просо куриное	Опрыскивание посевов до всходов или в фазу 2-3 настоящих листьев культуры	60	1
	2,5-3	Рапс озимый	Однолетние двудольные и злаковые, осот полевой	Опрыскивание посевов до всходов или в фазу 1-2 настоящих листьев культуры	60	1
	2,5-3	Рапс яровой	Однолетние двудольные и злаковые	То же	60	1
Пропизохлор + кломазон						
ПРОПОНИТ ДУО , КЭ (пропизохлор, 720 г/л + кломазон, 30 г/л), Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (Р), (П-3)	1,5-2,5	Рапс озимый	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы не позднее, чем через 3 дня после посева. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца		1
	1,5-2,5	Рапс яровой	Однолетние двудольные, просо куриное	То же		1
	1,5-2	Свекла сахарная	То же	То же		1
	1,5-2,5	Горох посевной	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	2-2,5	Соя	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	30	1
	2-2,5	Подсолнечник	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры. Возможно незначительное фитотоксическое действие на культуру, которое исчезает в течение месяца	60	1
	1,5-2	Картофель	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры		1
Пропизохлор + тербутилазин						
ВЕРСИЯ , МД (пропизохлор, 370 г/л + тербутилазин, 185 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов до всходов или в фазу 2-3 листьев культуры	59	1
	3-4	Подсолнечник	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	58	1

	2,5-3	Картофель	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры	30	1
Пропоксикарбазон натрия						
АТРИБУТ , ВГ (пропоксикарбазон натрия, 700 г/кг), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,06	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий и некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью с фазы 3-5 листьев до конца вегетации, или весной до конца кушения культуры		1
	0,06	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры		1
Просульфокарб						
БОКСЕР , КЭ (просульфокарб, 800 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	3	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов осенью до всходов культуры	196	1
	1	Пшеница и ячмень озимые	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов осенью до фазы кушения культуры, в ранние фазы роста сорняков (до 2-х настоящих листьев)		
	1	Пшеница и тритикале озимые	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры, в ранние фазы роста сорняков (от 2-х настоящих листьев до кушения)	90	
	1-1,5	Гречиха	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры	106	1
	3,5 1,5-2	Картофель	Просо куриное, подмаренник цепкий	Опрыскивание в период вегетации культуры: - первое: в ранние фазы роста развития сорняков при высоте картофеля до 5 см; - второе: в ранние фазы роста сорняков при высоте картофеля до 25 см	80	2
	2-2,5	Морковь	Однолетние злаковые, подмаренник цепкий	Опрыскивание в период: первое – в фазе 1-2 настоящих листьев культуры; второе – при необходимости в ранние фазы роста сорняков (от 2-х настоящих листьев до кушения)	74	1-2
	1,5-2	Лук репчатый	То же	Опрыскивание в период вегетации: первое- с фазы 2-х настоящих листьев культуры в ранние фазы роста сорняков,	78	1-3

				последующие – при необходимости в ранние фазы роста сорняков		
Просульфокарб + метрибузин						
АРКАДЕ, КЭ (просульфокарб, 800 г/л + метрибузин, 80 г/л), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-З)	4-5	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые, в т.ч. подмаренник цепкий	Опрыскивание почвы до всходов культуры		1
	3-5	То же	То же	Опрыскивание посадок по всходам при высоте картофеля до 5 см	40	
ЗЕНКОШАНС ГОЛД, КЭ (просульфокарб, 707 г/л + метрибузин, 100 г/л), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-З)	4-5	Картофель	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы до всходов культуры	84	1
	3-4	То же	То же	Опрыскивание посадок по всходам при высоте картофеля до 5 см		
Римсульфурон						
БАЛАНСИР, МД (римсульфурон, 62,5 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-З)	0,16-0,2	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры в период до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев	60	1
	0,12 0,08	Картофель	То же	Двукратное опрыскивание: первое – при высоте культуры 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см; второе – не позднее 14 дней после первого		2
ГРИМС, ВДГ (римсульфурон, 250 г/кг), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-З)	50 г/га + 200 мл/га ПАВ Альф, Ж	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см	60	1
	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Альф, Ж	Кукуруза (кроме семенных посевов)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры в период до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев	60	1

КАССИУС , ВРП (римсульфурон, 250 г/кг), АО «Щелково Агро- хим», Россия (П-3)	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Сател- лит, Ж	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые и некото- рые двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев культуры до начала кущения од- нолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10- 15 см, двудольных – в фазу 2-4 листьев		1
	50 г/га + 200 мл/га ПАВ Сател- лит, Ж	Картофель	То же	Опрыскивание при высоте картофеля 5- 25 см, в фазу 2-4 ли- стьев двудольных сорняков, при высоте пырея ползучего 10- 15 см		1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Са- теллит, Ж 20 г/га + 200 мл/га ПАВ Сател- лит, Ж	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание: первое - при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев дву- дольных сорняков, при высоте пырея ползучего 10-15 см, второе – не позднее 14 дней после пер- вого		2
МАИС , СТС (римсульфурон, 250 г/кг), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Бит 90	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые и некото- рые двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев культуры в пе- риод до начала куще- ния однолетних зла- ковых сорняков и высоте пырея ползу- чего 10-15 см, дву- дольных – в фазу 2-4 листьев	98	1
	50 г/га + 200 мл/га ПАВ Бит 90	Картофель	То же	Опрыскивание при высоте картофеля 5- 25 см, в фазу 2-4 ли- стьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10- 15 см		1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Бит 90 20 г/га + 200 мл/га ПАВ Бит 90	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание: первое – при высоте культуры 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10- 15 см; второе – не позднее 14 дней после пер- вого		2

ПРЕФЕКТ , ВДГ (римсульфурон, 500 г/кг), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	20-25 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	Кукуруза	Однолетние зла- ковые и некото- рые двудольные, пырей ползучий	Опрыскивание в фазу 3-4 листьев культуры и высоте пырея ползучего 10- 15 см		1
	15 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание по первой и второй волне сорня- ков в фазу 2-6 ли- стьев культуры и вы- соте пырея ползу- чего 10-15 см (интер- вал 10-20 дней)		2
	10 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон					
	25 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	Картофель	Однолетние зла- ковые и некото- рые двудольные, пырей ползучий	Опрыскивание при высоте картофеля 5- 25 см, в фазу 2-4 ли- стьев сорняков и вы- соте пырея ползу- чего 10-15 см		1
	15 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание: первое - при высоте картофеля 10-15 см, в фазу 2-4 листьев сорняков и высоте пырея ползучего 10- 15 см; второе - при высоте картофеля 20-25 см		2
САТИР , ВДГ (римсульфурон, 250 г/кг), Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-3)	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые, некоторые двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев культуры в пе- риод до начала куще- ния однолетних зла- ковых сорняков и высоте пырея ползу- чего 10-15 см, дву- дольных – в фазу 2-4 листьев.	60	1
	40-50 г/га + 50-100 мл/га ПАВ Силь- вет Голд	То же	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев культуры в пе- риод до начала куще- ния однолетних зла- ковых сорняков и высоте пырея ползу- чего 10-15 см, дву- дольных – в фазу 2-4 листьев. Запрещается исполь- зование зеленой массы на корм скоту		
	45-55 г/га +	Картофель	То же	Опрыскивание при высоте картофеля 5-		1

	200 мл/га ПАВ Тоник			25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков, высоте пырея ползучего 10-15 см		
	45-55 г/га + 50-100 мл/га ПАВ Силь- вет Голд	То же	То же	То же		
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник 20 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – при высоте культуры 5-25 см и высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков; второе – не позднее 14 дней после первого		2
	30 г/га + 50-100 мл/га ПАВ Силь- вет Голд 20 г/га + 50-100 мл/га ПАВ Силь- вет Голд	То же	То же	То же		
ТИТУС , 25% с.т.с. (римсульфурон), ООО «Кортева Агрос- саенс Рус», Россия (П-3)	50 г/га + 200 мл/га ПАВ Виволт	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые, двудольные	Опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ Виволт 20 г/га + 200	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое – при высоте культуры 5-25 см и высоте пырея ползучего 10-15 см, в фазу 2-4 листьев двудольных сорняков;		2

	мл/га ПАВ Виволт			второе – не позднее 14 дней после пер- вого		
	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ Виволт	Кукуруза	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-6 ли- стьев культуры в пе- риод до начала куще- ния однолетних зла- ковых сорняков и высоте пырея ползу- чего 10-15 см, дву- дольных – в фазу 2-4 листьев		1
ШАНТУС , ВДГ (римсульфурон, 250 г/кг), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	40-50 г/га + 200 мл/га ПАВ ШАНС- 90, Ж	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые и некото- рые двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев культуры и вы- соте пырея ползу- чего 10-15 см	60	1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ ШАНС- 90, Ж 20 г/га + 200 мл/га ПАВ ШАНС- 90, Ж	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание по первой и второй волне сорня- ков в фазу 2-6 ли- стьев культуры, при высоте пырея ползу- чего 10-15 см (интер- вал 10-20 дней)	60	2
	50 г/га + 200 мл/га ПАВ ШАНС- 90, Ж	Картофель	Просо куриное, пырей ползучий, осот полевой, од- нолетние дву- дольные	Опрыскивание при высоте картофеля 5- 25 см, в фазу 2-4 ли- стьев двудольных сорняков, при высоте пырея ползучего 10- 15 см	60	1
	30 г/га + 200 мл/га ПАВ- ШАНС- 90, Ж 20 г/га + 200 мл/га ПАВ ШАНС- 90, Ж	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание: первое - при высоте картофеля 5-25 см, в фазу 2-4 листьев дву- дольных сорняков, при высоте пырея ползучего 10-15 см, второе – не позднее 14 дней после пер- вого		2
ЭСКУДО , ВДГ (римсульфурон, 500 г/кг) АО Фирма «Август», Россия	25 г/га + 200 мл/га ПАВ	Картофель	Однолетние и многолетние зла- ковые и некото- рые двудольные	Опрыскивание при высоте картофеля 5- 25 см и высоте пырея ползучего 10-15 см		1

(Р), (П-3)	Адью, Ж					
	15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж 10 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	То же	То же	Двукратное опрыскивание: первое: опрыскивание при высоте картофеля 5-25 см и высоте пырея ползучего 10-15 см второе – не позднее 14 дней после первого		2
	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Кукуруза	То же	Опрыскивание в фазу 2-6 листьев культуры и высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	15 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж 10 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	То же	То же	Двукратное опрыскивание по первой и второй волне сорняков в фазу 2-6 листьев культуры, при высоте пырея ползучего 10-15 см (интервал 10-20 дней)		2
Римсульфурон+ никосульфурон+ мезотрион						
САНКОР, ВДГ (римсульфурон, 43 г/кг + никосульфурон, 120 г/кг + мезотрион, 400 г/кг), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь (Р), (П-3)	0,25-0,3	Кукуруза (кроме семенных посевов)	Однолетние и многолетние злаковые, однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10-15 см	60	1
Римсульфурон + тифенсульфурон-метил						
АЛИГАТОР, ВДГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг), ООО «Юнивестактив», Беларусь (Р), (П-3)	20-25 г/га + 200 ПАВ Юни, Ж	Кукуруза	Однолетние злаковые и некоторые двудольные, пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см)	60	1
БАЗИС, 75% в.р.г. (римсульфурон, 50% + тифенсульфурон-метил, 25%),	20-25 г/га + 200 мл/га	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры (при		1

ООО «Кортева Агри-саенс Рус», Россия (Р), (П-3)	ПАВ Виволт			2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см)		
КОРРСАН , ВРГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг), ООО «Агрозашита плюс», Беларусь (Р), (П-3)	20-25 г/га +200 мл/га ПАВ 100	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см)	68	1
РИФ МАКС , ВРГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг), ЧУП «Двистар», Беларусь; «Ипрохем» СО., LTD, Китай (Р), (П-3)	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ 200	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см)		1
САТИР ПЛЮС , ВДГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг), Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-3)	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Тоник	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см)	60	1
	20-25 г/га + 50-100 мл/га Сильвет Голд	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков и высоте пырея ползучего 10-15 см). Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		
ТАРАН НЕО , ВДГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Агро, Ж	Кукуруза	Однолетние злаковые и некоторые двудольные, пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения однолетних злаковых сорняков, при высоте пырея ползучего 5-10 см)		1
ЭКЛАТ , ВГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг),	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Стаф	Кукуруза	Однолетние двудольные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-6 листьев культуры (при 2-4 листьях двудольных, до начала кущения)	94	1

ФАДЕР АЛЪЯНС ПОЛЫША, ООО, Польша (Р), (П-3)				ния однолетних зла- ковых сорняков и высоте пырея ползу- чего 10-15 см)		
С-Метолахлор						
ДУАЛ ГОЛД, КЭ (С-метолахлор, 960 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия (Р), (П-3)	1,6	Свекла сахар- ная, столовая и кормовая	Однолетние зла- ковые и некото- рые двудольные	Опрыскивание почвы до посева (в засушливых усло- виях рекомендуется мелкая заделка пре- парата на глубину не более 5 см) или до всходов культуры		1
	0,6-0,8	То же	То же	Двукратное опрыс- кивание посевов начиная с фазы 2-х пар настоящих ли- стьев культуры в смеси с препаратами на основе десме- дифама и фенме- дифама		2
	1,6	Кукуруза	То же	Опрыскивание почвы до посева (в засушливых усло- виях рекомендуется мелкая заделка пре- парата на глубину не более 5 см), до всхо- дов культуры или до фазы 2-х листьев культуры		1
	1,6	Подсолнечник, рапс, соя	То же	Опрыскивание почвы до посева (в засушливых усло- виях рекомендуется мелкая заделка пре- парата на глубину не более 5 см) или до всходов культуры		1
С-метолахлор+ изоксафлютол						
АДВАЙЗЕР, МСК (С-метолахлор, 800 г/л+ изоксафлю- тол, 56 г/л), ООО Группа Компа- ний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	1-1,4	Кукуруза	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		
	1-1,4 + 0,1 л/га ПАВ Бэк- грау- унд, КЭ	Кукуруза	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
С-Метолахлор + десмедифам + фенмедифам + этофумезат						
КИАНИТ КВАДРО, КЭ (десмедифам, 18 г/л + фенмедифам, 47 г/л + этофумезат, 72 г/л + С-метолахлор,	1,5	Свекла сахарная (кроме отечественных гибридов)	Однолетние двудольные и злаковые	Трехкратное опрыс- кивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков;		3

400 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)				второе и третье – по мере появления новых сорняков в ту же фазу		
С-метолахлор + квинмерак						
АМАДЕУС ФОРТЕ, МСК (с-метолахлор, 512 г/л + квинмерак, 83 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	2,5-3	Рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до всходов культуры	118	1
	2,5-3 + 100 мл/га ПАВ Бэкграунд, КЭ					
	2,5-3	Свекла сахарная	То же	То же	126	1
	2,5-3 + 0,1 л/га ПАВ Бэкграунд, КЭ					
	1,2-1,8		То же	Трехкратное опрыскивание: первое – в фазу семядольных листьев сорняков; второе и третье – по мере появления новых сорняков в ту же фазу	82	3
С-метолахлор + кломазон						
АКЕБОНО, КЭ (С-метолахлор, 825 г/л + кломазон, 75 г/л), Глобакем НВ, Бельгия (Р), (П-3)	1,3-1,6	Рапс озимый и яровой	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
	1,3-1,6	Картофель	То же	То же	60	1
С-Метолахлор + мезотрион						
КАЛАШ, СЭ (С-метолахлор, 400 г/л+ мезотрион, 40 г/л), ЮПЛ Холдингс Кооператив Ю.А., Нидерланды (Р), (П-3)	2-2,2	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры		1
	2-2,2	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
С-Метолахлор + тербутилазин						
ВОЖДЬ, СК (С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
	3-4	То же	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу всходы (шильца) до фазы 2-3 листьев культуры		
ГАРДО ГОЛД, СЭ (С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л),	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или до фазы 2-3 листьев культуры	60	1

Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	3	Сорго кормовое	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов	63	1
	3-4	Сорго кормовое (семена обработаны антидотом Концепт III)	То же	То же		1
	3-4	То же	То же	Опрыскивание в фазу 2-3 листьев культуры		
	2-2,5	Люпин узколистный	То же	Опрыскивание почвы после посева до появления всходов культуры	60	1
	2,5-3,5	Соя	Однолетние двудольные, просо куриное	То же	139	1
	1	Суданская трава	Однолетние двудольные и злаковые	То же	63	1
	3-4	Подсолнечник	То же	То же	138	1
ИРВИН, СЭ (С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу всходы (шильца) до фазы 2-3 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков		1
КАМЕЛОТ, СЭ (С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или до фазы 2-3 листьев культуры	60	1
	3	Сорго	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры	60	1
	3-4	Подсолнечник	То же	То же	131	1
	3-3,5	Картофель	То же	То же	84	1
	2-2,5	Люпин узколистный	Однолетние двудольные	То же	60	1
	2-2,5	Люпин белый	Однолетние двудольные и злаковые	То же	61	1
	3-3,5	Соя	То же	То же	61	1
	2-4	Сильфия пронзеннолистная	Однолетние двудольные, просо куриное	То же		1
ЭКСТРАКОРН, СЭ (С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 2-3 листа культуры и ранние фазы роста сорняков		1
	3	Сорго сахарное	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1

	3-3,5	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посадки до всходов культуры		1
	3-4	Подсолнечник	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	2-2,5	Люпин узколистный	То же	То же		1
	2-2,5	Бобы кормовые	Однолетние двудольные, просо кукурузное	Опрыскивание почвы не позднее 3 дней после посева до всходов культуры		1
	3-3,5	Соя	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	4	Яблоня	Однолетние злаковые и двудольные, хвощ полевой	Опрыскивание весной в ранние фазы роста сорняков (1-2 листа)		1
<i>С-Метолахлор + тербутилазин + мезотрион</i>						
ГЕРБИСАН, СЭ (С-метолахлор, 375 г/л + тербутилазин, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л), ОАО «Гроднорай-агросервис», Беларусь (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 2-3 листьев культуры	60	1
	4	То же	Однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 4-5 листьев культуры		
	3-4	Кукуруза сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 2-3 листьев культуры	60	1
КАМЕЛОТ ТУРБО, СЭ (С-метолахлор, 375 г/л + тербутилазин, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание в фазу всходов (шильца) - 2-3 листьев культуры	60	1
	3-4	То же	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу 4-5 листьев культуры		
ЛЕКСУС, СЭ (С-метолахлор, 375 г/л + тербутилазин, 125 г/л + мезотрион, 37,5 г/л), ДВА Агро ГмбХ, Германия (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу всходов (шильца) - 2-3 листьев культуры	60	1
	3-4	То же	Однолетние и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание в фазу 4-5 листьев культуры		

ЛЮМАКС, СЭ (С-метолахлор, 375 г/л + тербутила- зин, 125 г/л + мезот- рион, 37,5 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия (Р), (П-3)	3-3,5	Кукуруза	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу всходы (шильца) культуры	62	1
	3-3,5	То же	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание в фазу 4-5 листьев культуры		
	3,5-4	То же	Однолетние и не- которые много- летние двудоль- ные (осот поле- вой, бодяк поле- вой, выюнок поле- вой)	То же		
	3-3,5	Кукуруза сахар- ная	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание в фазу 2-3 листьев культуры	77	1
ТЕРМЕК, СЭ (С-метолахлор, 375 г/л + тербутила- зин, 125 г/л + мезот- рион, 37,5 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	3-4	Кукуруза	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу всходы (шильца) - 2-3 ли- стьев культуры	60	1
	3-4	То же	Однолетние и не- которые много- летние двудоль- ные	Опрыскивание посе- вов в фазу 4-5 ли- стьев культуры		
Сульфометурон-метил кислота						
ВЕНИК, ВДГ (сульфометурон-ме- тил, 750 г/кг), ООО «Китайские пре- параты», Беларусь (Р), (П-3)	0,12- 0,35	Земли несель- скохозяйствен- ного пользова- ния (трассы газо- и нефте- проводов, насыпи и по- лосы отчужде- ния железных и шоссейных до- рог, аэродромы, контрольно-сле- довые полосы и другие промыш- ленные объ- екты) и в насе- ленных пунктах	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные, в т. ч. золотарник ка- надский, мелко- лепестник канад- ский, борщевик Сосновского	Опрыскивание почвы и сорняков при высоте до 30 см		1
ТЕРРСАН, ВДГ (сульфометурон-ме- тила кислоты, 750 г/кг), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь; Ningbo Lido Interna- tional Incorporation Co., Ltd, Китай (Р), (П-3)	0,12- 0,35	Земли несель- скохозяйствен- ного пользова- ния (трассы газо- и нефте- проводов, насыпи и по- лосы отчужде- ния железных и шоссейных до- рог, аэродромы, контрольно-сле- довые полосы и	Однолетние и многолетние зла- ковые и двудоль- ные, золотарник канадский	Опрыскивание почвы и сорняков при высоте сорняков до 10 см, золотар- ника канадского – до 30 см		1

		другие промышленные объекты)				
	0,12-0,35	То же	Лиственная древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание почвы и вегетирующей нежелательной лиственной древесно-кустарниковой растительности в ранние фазы роста и развития		1
	0,3-0,35	Земли несельскохозяйственного пользования вне населенных пунктов и в населенных пунктах	Борщевик Сосновского	Опрыскивание почвы и сорняков при высоте борщевика до 30 см		
	0,05	Яблоня	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы в приствольных полосах сада старше 5-ти лет на среднерослых клоновых и семенных подвоях рано весной до начала вегетации деревьев (при условии защиты культуры). Не применять в садах на полукарликовых и карликовых подвоях	126	1
	0,1-0,12	Клюква крупноплодная	То же	Однократное опрыскивание насаждений клюквы крупноплодной в период покоя - набухания верхушечной почки	132	1
	0,03	Смородина	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до появления всходов сорняков и начала вегетации культуры	84	1
	0,02	Сеянцы ели европейской первого года выращивания	То же	Опрыскивание до всходов ели европейской		1
	0,03	Сеянцы сосны обыкновенной первого года выращивания	То же	Опрыскивание до всходов сосны обыкновенной		1
	0,03	Сеянцы сосны обыкновенной второго года выращивания и ели европейской второго и третьего годов выращивания	То же	Опрыскивание в период покоя сосны обыкновенной и ели европейской при высоте сорняков до 30 см		1

	0,01	Сеянцы твердо- лиственных по- род (питомники)	Однолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание почвы до появления всходов сеянцев (не применять на почвах с кислотностью близкой к нейтраль- ной)		1
	0,03	Саженцы хвой- ных и листвен- ных пород (пи- томники)	Однолетние и многолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание почвы до начала ве- гетации хвойных и лиственных пород		1
	0,1	Сосна обыкно- венная, ель ев- ропейская, липа мелколиственная (лесокультур- ные площади)	Однолетние и многолетние дву- дольные и злако- вые, лиственная древесно-кустар- никовая расти- тельность	Обработка плужных борозд за 14 дней до посадки растений на лесокультурной пло- щади методом УМО. Норма расхода рабо- чей жидкости – 1 л/га		1
Темботрион + йодосульфурон-метил-натрий + ципросульфамид (антидот)						
ДЕПРИМО, МД (темботрион, 100 г/л + йодосульфурон-ме- тил-натрий, 2 г/л + ципросульфамид (ан- тидот), 40 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Кукуруза	Однолетние дву- дольные и злако- вые, осот полевой	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры	58	1
Темботрион + тиенкарбазон-метил + изоксадифен-этил /антидот/						
КАПРЕНО, КС (темботрион, 345 г/л + тиенкарбазон-ме- тил, 68 г/л + изокса- дифен-этил /антидот/, 134 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,2-0,3 + 1,5-2 ПАВ МЕРО, КЭ	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры при высоте пырея ползу- чего 10-15 см. В случае пересева посевов можно высе- вать только куку- рузу. Осенью в год применения можно высевать только пшеницу озимую. Весной следующего года в случае сева чувствительных культур, таких как свекла (сахарная, столовая, кормовая), рапс, подсолнечник, гречиха, бобовые и овощные культуры, необходима глубокая вспашка. При возде- лывании кукурузы на поливе – ограниче- ний в севообороте нет		1
Тербутилазин + 2-ЭГЭ 2,4-Д кислота + никосульфурон						

КОРНЕГИ, СЭ (тербутилазин, 250 г/л + 2,4-Д кис- лота в виде 2-этилгек- силового эфира, 80 г/л + никосульфурон, 30 г/л), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-3)	1,5-2	Кукуруза (кроме семенных посе- вов)	Однолетние и многолетние зла- ковые и однолет- ные двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры		1
Тиенкарбазон-метил + изоксафлютол + ципросульфамид (антидот)						
АДЕНГО, КС (тиенкарбазон-метил, 90 г/л + изоксафлю- тол, 225 г/л + ципро- сульфамид (антидот), 150 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,3-0,4	Кукуруза	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание после посева до фазы 2-3 листьев культуры	60	1
	0,4	То же	Многолетние зла- ковые, в т.ч. пы- рей ползучий			
	0,4	То же	Однолетние и не- которые много- летние двудоль- ные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание в фазу 4-5 листьев культуры при высоте пырея ползучего 10- 15 см		
САНВОРД ПЛЮС, КС (изоксафлютол, 225 г/л + тиенкарба- зон-метил, 90 г/л + ципросульфамид (ан- тидот), 150 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,3-0,4	Кукуруза	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры или в фазу всходы (шильца) - 2-3 ли- стьев культуры	60	1
	0,4	То же	Многолетние зла- ковые			
	0,4	Тот же	Однолетние и не- которые много- летние двудоль- ные, однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 4-5 ли- стьев культуры при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
Тиенкарбазон-метил + никосульфурон + ципросульфамид						
АНТАРЕОН, МД (тиенкарбазон-метил, 15 г/л + никосульфу- рон, 30 г/л + ципро- сульфамид, 22,5 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые, однолет- ные двудольные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры	115	1
Тиенкарбазон-метил + форамсульфурон						
КОНВИЗО 1, МД (тиенкарбазон-метил, 30 г/л + форамсуль- фурон, 50 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-3)	0,9	Свекла сахарная (гибриды сахар- ной свеклы, устойчивые к гербициду)	Однолетние дву- дольные, просо- куриное	Двукратное опрыс- кивание: первое – в фазу 2- настоящих листьев сорняков; второе – по мере по- явления новых сор- няков в ту же фазу	106	2
	0,5					
	0,7	То же	То же	То же		
	0,7					
Тифенсульфурон-метил						

КУПАЖ, ВДГ (тифенсульфурон-метил, 750 г/кг), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	10 г/га + ПАВ Сателлит, Ж 0,2 л/га	Кукуруза	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	60	1
	15 г/га		То же	То же		
	6-8 г/га + ПАВ Сателлит, Ж 0,2 л/га	Соя	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-2 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	30	1
	10-25 г/га	Лен-долгунец	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов льна в фазу «елочки» и 2-4 листьев сорняков		1
Тифенсульфурон-метил + амидосульфурон						
АВСЕНЬ, МД (тифенсульфурон-метил, 90 г/л + амидосульфурон, 50 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,15-0,2	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	60	1
	0,15-0,2	Тритикале и рожь озимые	То же	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры	60	1
	0,15-0,175	Ячмень яровой	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры		1
	0,3	Газоны	Однолетние двудольные и некоторые многолетние	Опрыскивание газонов после первого подкашивания		1
ЭСКВАЙР, ВДГ (тифенсульфурон-метил, 470 г/кг + амидосульфурон, 280 г/кг), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	20-30 г/га	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения или весной в фазу кушения - выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры	31	1
	20-30 г/га + 0,1 л/га ПАВ Биотон, ВК					
	20-30 г/га	Ячмень озимый	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кушения культуры	31	1
	20-30 г/га + 0,1 л/га ПАВ Биотон, ВК					
	20-30 г/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев – кушения культуры	31	1
	20-30 г/га + 0,1 л/га ПАВ Биотон, ВК					

	20-30 г/га	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу «елочки» культуры	96	1
Тифенсульфурон-метил + метсульфурон-метил						
АККУРАТ ЭКСТРА, ВДГ (тифенсульфурон-ме- тил, 680 г/кг + метсульфурон-метил, 70 г/кг), Кеминова А/С, Дания (Р), (П-3)	25-35 г/га	Пшеница, три- тикале и рожь озимые, пше- ница и ячмень яровые	Однолетние дву- дольные и неко- торые многолет- ные (осот, бодяк)	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры и ранние фазы разви- тия сорных растений		1
	35-45 г/га	Пшеница, три- тикале и рожь озимые	То же	Опрыскивание посе- вов осенью с фазы 2 листьев до конца ку- щения культуры		
	25-35 г/га	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посе- вов осенью с фазы 2 листьев до конца ку- щения культуры и ранние фазы разви- тия сорных растений		
СПАРТА, ВДГ (тифенсульфурон-ме- тил, 375 г/кг + мет- сульфурон-метил, 135 г/кг), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	10-20 г/га + 0,2 л/га ПАВ Шанс 90, Ж	Пшеница яро- вая, овес	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры	30	1
	20 г/га + 0,2 л/га ПАВ Шанс 90, Ж	То же	Однолетние и не- которые много- летние двудоль- ные (осот поле- вой, бодяк поле- вой)	То же		
	15-25 г/га + 0,2 л/га ПАВ Шанс 90, Ж	Лен-долгунец	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу «елочки» и 2-4 листьев сорня- ков	81	1
	15-25 г/га + 0,2 л/га ПАВ Шанс 90, Ж	Лен масличный	Однолетние дву- дольные	То же	86	1
Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил						
ЛИБРА, ВДГ (тифенсульфурон-ме- тил, 500 г/кг + трибенурон-метил, 250 г/кг), Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-3)	40-50 г/га	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние дву- дольные и неко- торые многолет- ные (бодяк поле- вой)	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры, ранние фазы роста однолетних и фазу розетки многолетних сорняков. Запреща- ется использование зеленой массы на корм скоту		1
	40-50 г/га	То же	То же	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 1-		

				2 листа - кушение культуры, ранние фазы роста однолетних и фазу розетки многолетних сорняков. Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		
	30-40 г/га	Пшеница и ячмень яровые, овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кушения культуры, ранние фазы роста однолетних и фазу розетки многолетних сорняков. Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		1
Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил + флорасулам						
ТРИАТЛОН, ВДГ (трибенурон-метил, 300 г/кг + тифенсульфурон-метил, 300 г/кг + флорасулам, 100 г/кг), ООО «Альфа Смарт Агро», Украина (Р), (П-3)	30-50 г/га + 0,2 л/га ПАВ Альфа-лип Экстра	Пшеница озимая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов весной в фазу кушения культуры, ранние фазы роста однолетних и в фазу розетки многолетних сорняков		1
Тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил + флуметсулам						
КАЙЕН ТУРБО, МД (трибенурон-метил, 75 г/л + тифенсульфурон-метил, 75 г/л + флуметсулам, 52 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	0,25-0,35	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж			Опрыскивание посевов весной в фазу кушения – флаг-листа культуры		
	0,25-0,35					
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25-0,35	Тритикале озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25-0,35			Опрыскивание посевов весной в фазу кушения – флаг-листа культуры		
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25	Ячмень озимый	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры	30	1

	0,25-0,35	Рожь озимая	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу выхода в трубку	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25-0,35			Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры		
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25-0,35		Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу выхода в трубку		
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25-0,35	Пшеница яровая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов в фазу кущения – флаг-листа культуры	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25-0,35	Ячмень яровой	Однолетние двудольные, осот полевой	То же	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
	0,25-0,35	Овес	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	30	1
	0,25 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90, Ж					
Тифенсульфурон-метил + флуметсулам + флорасулам						
ПИКСЕЛЬ, МД (тифенсульфурон-метил, 90 г/л + флуметсулам, 24 г/л + флорасулам, 18 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-З)	0,2-0,3	Рожь озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры	30	1
	0,2-0,3	Пшеница озимая	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры		
	0,2-0,3	Тритикале и ячмень озимые	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	То же		
	0,2-0,3	Пшеница и тритикале озимые	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		

	0,2-0,3	Ячмень озимый и яровой, овес	Однолетние двудольные	То же	30	
	0,2-0,3	Пшеница яровая	Однолетние двудольные, осот полевой	То же		
Толпиралат						
АШИТАКА, МД (толпиралат, 100 г/л), ИСК Биосаенсис Юроп Н.В., Бельгия (Р), (П-3)	0,4	Кукуруза	Марь белая, пикульник обыкновенный, пастушья сумка, ярутка полевая, галинзога мелкоцветковая, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев культуры		1
Триасульфурон + дикамба						
ЛИНТУР, ВДГ (триасульфурон, 41 г/кг + дикамба, 659 г/кг), Сингента Кроп Протекшн АГ, Швейцария (Р), (П-3)	0,12-0,18	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры		1
	0,18	То же	То же	Авиационное опрыскивание посевов методом УМО осенью в фазу кущения культуры. Расход рабочей жидкости 3-5 л/га		
	0,12-0,18	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры		1
	0,12-0,18	Зерновые яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		1
	0,12-0,18	Просо	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-х листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков		1
	0,18	Тимофеевка луговая (семенные посевы)	То же	Опрыскивание посевов в год сбора семян весной, в начале отрастания культуры		1
	0,18	Тимофеевка луговая при покровном и беспокровном посеве	То же	Опрыскивание посевов в фазу кущения покровной культуры, или начиная с фазы 1-2 листьев тимopheевки при беспокровном посеве		1
	0,18	Овсяница красная и мятлик луговой при покровном и беспокровном посеве, двукосточник тростниковый, фестулолиум	Однолетние двудольные	Опрыскивание в фазу кущения покровной культуры, или начиная с фазы 1-2 листьев культур при беспокровном посеве		1
	0,18	Газоны	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание травостоя по вегетирующим сорнякам в мае		1

				– начале июня через 3-4 дня после первого укоса газона или в конце августа – начале сентября через 3-4 после очередного укоса		
Трибенурон-метил						
АРГАМАК, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	20-25 г/га	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние двудольные, бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	82	1
	15-20 г/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры	91	1
ГРАНАТ, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	15-20 г/га	Тритикале озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры и ранние фазы роста у однолетних двудольных сорняков		1
	20-25 г/га	То же	То же, бодяк полевой	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры и розетки у бодяка полевого (10-15 см)		
	15-20 г/га	То же	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры, в период 2-4 листьев у двудольных сорняков		
	20-25 г/га	То же	То же, бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры и розетки у бодяка полевого (10-15 см)		
	15-20 г/га	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры, в период 2-4 листьев у двудольных сорняков		1
	20-25 г/га	То же	То же, бодяк полевой	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры и розетки у бодяка полевого (10-15 см)		
	15-20 г/га	То же	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры, в период 2-4 листьев у двудольных сорняков		
	20-25 г/га	То же	То же, бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры и розетки у бодяка полевого (10-15 см)		
	20-25 г/га	То же	То же, бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры и розетки у бодяка полевого (10-15 см)		

	15-20 г/га	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев – флаг-листа культуры, в период 2-4 листьев у двудольных сорняков		1
	20-25 г/га	То же	То же, бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев – флаг-листа культуры, при высоте бодяка полевого 10-15 см		
ГРАНД, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-3)	15-20 г/га	Пшеница, тритикале и рожь озимые, пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры, в период 2-4 листьев у двудольных сорняков. Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		1
	20-25 г/га	То же	То же, бодяк полевой	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры, при высоте бодяка полевого 10-15 см. Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		
	15-20 г/га	Овес	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры, в период 2-4 листьев у двудольных сорняков. Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		1
	25 г/га	Газоны	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание газонов после первого подкашивания по вегетирующим сорнякам		1
ТАЛЛЕР, ВДГ (трибенурон-метил, 750 г/кг), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	10-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Агро, Ж	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев культуры		1
	15-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Агро, Ж	То же	Однолетние и многолетние двудольные	То же		

	10-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Агро, Ж	Тритикале ози- мая	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу кущения культуры		1
	15-20 г/га + 200 мл/га ПАВ Агро, Ж	Рожь озимая	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры		1
	10-15 г/га + 200 мл/га ПАВ Агро, Ж	Ячмень яровой	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры		1
Трибун, СТС (трибенурон-метил, 750 г/кг), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	15-25 г/га	Пшеница ози- мая и яровая, тритикале ози- мая и яровая, ячмень	Однолетние дву- дольные, бодяк полевой	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-3 ли- стьев – флаг-лист культуры, в период 2-4 листьев у дву- дольных сорняков, в фазу розетки бодяка полевого	ози- мые 30 (зеле- ная масса) яровые 34 (зеле- ная масса) 72 (зерно)	1
Трибенурон-метил + метрибузин + дифлюфеникан						
ТАМЕТ ПЛЮС, ВДГ (трибенурон-метил, 4,8% + метрибузин, 38% + дифлюфени- кан, 35%), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь (Р), (П-3)	0,3-0,35	Пшеница, три- тикале, рожь и ячмень озимые	Однолетние дву- дольные, метлица обыкновенная	Опрыскивание посе- вов осенью или вес- ной в фазу кущения культуры	30	1
Трибенурон-метил + флорасулам						
БОМБА, ВДГ (трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасу- лам, 187 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	20–25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адыо, Ж	Пшеница и три- тикале озимые	Однолетние и многолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу 2- 3 листьев - кущения или весной в фазу кущения культуры	29	1

	20–25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Ячмень и рожь озимые	То же	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры		
	20-25 г/га + 200 мл/га ПАВ Адью, Ж	Пшеница, тритикале и ячмень яровые	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев - полного кущения культуры	31	1
	15 г/га	Овес	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		
	20 г/га	То же	Многолетние двудольные	То же		
СТАТУС ГРАНД, ВДГ (трибенурон-метил, 500 г/кг + флорасулам, 104 г/кг), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	30-40 г/га	Пшеница озимая	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев - кущения культуры или весной в фазу кущения – флаг-листа культуры		1
	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	То же		
	30-40 г/га	Тритикале озимая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой)	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев - кущения культуры или весной в фазу кущения - флаг-листа культуры		1
	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	То же		
	30-40 г/га	Рожь озимая	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев культуры или весной в фазу кущения		1
	40 г/га	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу выхода в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры		
	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу 2-3 листьев культуры или весной в фазу кущения - выход в трубку (до стадии 2-		

				х междоузлий) культуры		
	30 г/га	Ячмень озимый	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	81	1
	40 г/га	То же	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	То же		
	20-40 г/га	Пшеница яровая	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой), падалица рапса	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры		1
	20 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	То же		
	30-40 г/га	То же	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		
	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	То же		
	20-30 г/га	Ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев культуры		1
	20 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	То же		
	30-40 г/га	То же	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу кущения культуры		
	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Биотон	То же	То же	То же		
ШАНСТАР ПЛЮС, ВДГ (трибенурон-метил, 500 г/кг + флорасулам, 104 г/кг), ООО «Шанс», Россия (Р), (П-3)	30-40 г/га	Пшеница, тритикале и ячмень озимые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры	60	1
	30-40 г/га	Рожь озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов осенью в фазу кущения культуры		

	30 -40 г/га	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры		
	30-40 г/га	Ячмень яровой	Однолетние дву- дольные, осот по- левой	То же		
Трибенурон-метил + флорасулам + метсульфурон-метил						
ТРОПИНГ 700 , ВДГ (трибенурон-метил, 400 г/кг + флорасу- лам, 165 г/кг + метсульфурон-метил, 135 г /кг), ООО ИННВИГО, Польша (Р), (П-3)	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Асси- стент+, ВР	Пшеница ози- мая	Однолетние дву- дольные, осот по- левой	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры		1
	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Ассис- тент+, ВР	Тритикале ози- мая	Однолетние дву- дольные	То же	78	1
	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Ассис- тент+, ВР	Ячмень озимый	Однолетние дву- дольные, осот по- левой	То же		
	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Асси- стент+, ВР	Ячмень яровой	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу кущения культуры		1
	30 г/га + 100 мл/га ПАВ Асси- стент+, ВР	Пшеница яровая	Однолетние дву- дольные	То же		1
Трифлусульфурон-метил						
КАРИ-МАКС , СП в водорастворимых пакетах (трифлусульфурон- метил, 500 г/кг), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	30 г/га + 0,2 л/га ПАВ Бит 90	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов после появления всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сор- няков		3
КАРИ-МАКС ФЛЮИД , МД	0,04- 0,05	Свекла сахарная	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов после появления всходов свеклы, в		3

(трифлусульфурон-метил, 300 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)				фазу семядолей – двух листьев у сорняков		
КОНДОР , ВДГ (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	30 г/га + 0,2 л/га ПАВ Сателлит, Ж	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов после появления всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сорняков	95	3
КОНДОР ФОРТЕ , МД (трифлусульфурон-метил, 120 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,125	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Трехкратное опрыскивание посевов после появления всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сорняков		3
ТРИЦЕПС , ВДГ (трифлусульфурон-метил, 750 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	20 г/га + 0,2 л/га ПАВ Адьо Ж	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов после появления всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сорняков		3
ФЛУОРОН , ВДГ (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг), АО «ФМРус», Россия (Р), (П-3)	30 г/га + 0,2 л/га ПАВ Альф, Ж	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Трехкратное опрыскивание посевов после появления всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сорняков	60	3
ЭФФЕКТ , ВДГ (трифлусульфурон-метил, 500 г/кг), Уилловуд Лтд., Китай (Р), (П-3)	30 г/га + 0,2 л/га ПАВ Тоник	Свекла сахарная и кормовая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов после появления всходов свеклы, в фазу семядолей – двух листьев у сорняков		3
Феноксапроп-П-этил						
ЛАСТИК ЭКСТРА , КЭ (феноксапроп-П-этил, 70 г/л + клокви́нтосет-мексил (антидот), 40 г/л), АО Фирма «Август», Россия (П-3)	0,8-1	Пшеница озимая	Метлица обыкновенная	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры		1
	0,8-1	Тритикале и ячмень озимые, пшеница яровая	Однолетние злаковые (просо куриное, метлица обыкновенная, виды щетинника, мятлик однолетний и др.)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная со 2-го листа до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)		1
	0,8-1	Ячмень яровой	Просо куриное	То же		1
ОВСЮГЕН СУПЕР , КЭ (феноксапроп-П-этил, 140 г/л + клокви́нтосет -мексил/антидот/, 47 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние злаковые (овсюг обыкновенный, просо куриное и др.)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)		1
	0,3 +	То же	То же	То же		

(Р), (П-3)	0,2 л/га ПАВ Сател- лит, Ж					
	0,4-0,6	Пшеница и яч- мень яровые	То же	То же		1
	0,3 + 0,2 л/га ПАВ Сател- лит, Ж	То же	То же	То же		
ОЦЕЛОТ, КЭ (феноксапроп - П- этил, 100 г/л + кло- квинтосет- мексил /антидот/, 27 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница ози- мая	Однолетние зла- ковые (метлица обыкновенная, просо куриное)	Опрыскивание посе- вов весной по веге- тирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца ку- щения (независимо от фазы развития культуры)		1
	0,4-0,5 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90	То же	Метлица обыкно- венная	То же		
	0,6-0,8	Тритикале озимая	Метлица обыкно- венная	То же		1
	0,4-0,5 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90	То же	То же	То же		
	0,6-0,8	Пшеница яровая	Просо куриное	То же		1
	0,6-0,8	Тритикале яровая	Однолетние зла- ковые (метлица обыкновенная, просо куриное)	То же		1
	0,4-0,5 + 0,2 л/га ПАВ Бит 90	То же	Просо куриное	То же		
ОЦЕЛОТ ПЛЮС, КЭ (феноксапроп-П-этил, 69 г/л + флоквинто- сет-мексил (антидот), 34,5 г/л), ООО «Агро Эксперт Груп», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Пшеница ози- мая	Метлица обыкно- венная	Опрыскивание посе- вов по вегетирую- щим сорнякам, начи- ная с фазы 2-х ли- стьев до конца куще- ния (независимо от фазы развития куль- туры)	94	1
	1	Тритикале ози- мая	То же	Опрыскивание посе- вов весной по веге- тирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца ку- щения (независимо от фазы развития культуры)		

	0,8-1	Ячмень яровой	Просо куриное	То же	29	1
ФОКСТРОТ, ВЭ (феноксапроп-П-этил, 69 г/л + клокви́нто-сет-мексил (антидот) 34,5 г/л), Кеминова А/С, Дания (Р), (П-3)	0,8-1,2	Пшеница яровая	Метлица обыкновенная, овсюг пустой, просо куриное	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная со 2-ого листа до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)		1
	0,8-1	Пшеница, тритикале и рожь озимые	То же	То же: опрыскивание весной		1
	0,8-1	То же	Метлица обыкновенная	То же: опрыскивание осенью		
Феноксапроп-П-этил + клодинафоп-пропаргил + клокви́нтосет-мексил (антидот)						
АРГО ПРИМ, МЭ (феноксапроп-П-этил, 90 г/л + клодинафоп-пропаргил, 45 г/л + клокви́нтосет-мексил (антидот), 40 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	0,4-0,55	Пшеница, тритикале и ячмень озимые	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	30	1
	0,4-0,55	Пшеница, тритикале и ячмень яровые	То же	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам начиная с фазы 2-х листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	60	1
АЛХИМИК, КЭ (феноксапроп-П-этил, 140 г/л + клодинафоп-пропаргил, 90 г/л + клокви́нто-сет-мексил (антидот), 60 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-3)	0,4-0,6	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-х листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	30	1
	0,4-0,6	Пшеница яровая	То же	То же	30	1
	0,4-0,6	Ячмень яровой	Просо куриное	То же	30	1
Феноксапроп-П-этил + флукарбазон + клокви́нтосет-мексил (антидот)						
АВАНТИКС ТУРБО, МД (феноксапроп-П-этил, 100 г/л + флукарбазон, 17,5 г/л + клокви́нтосет-мексил (антидот), 34 г/л), ООО Группа Компаний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-3)	0,6-0,8	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов весной в фазу 1-3 листьев сорняков до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)		1
	0,6-0,8	Пшеница яровая	То же	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 листьев сорняков до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)		1
Флорасулам						
РАССЕЛ 100, КС (флорасулам, 100 г/л), ООО ИННВИГО,	30-50 мл/га	Пшеница озимая	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу кушения культуры		1

Польша (Р), (П-3)	30-50 мл/га	Тритикале ози- мая	Однолетние дву- дольные (кроме мари белой)	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры		1
	40-50 мл/га	Кукуруза	То же	Опрыскивание посе- вов в фазу 1-6 ли- стьев культуры		1
	40-50 мл/га + 100 мл/га ПАВ Асси- стент +, ВР	То же	То же	То же		
Флорасулам + йодосульфурон-метил-натрий + мефенпир-этил (антидот)						
ГЛОК, ВДГ (флорасулам, 150 г/кг + йодосульфурон-ме- тил-натрий, 60 г/кг + мефенпир-этил (антидот), 60 г/кг), АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-3)	30-40 г/га	Пшеница, три- тикале и ячмень озимые	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов осенью в фазу кущение культуры или весной в фазу кущение – выход в трубку (до стадии 2-х междоузлий) культуры	30	1
	30-40 г/га + 0,2 л/га ПАВ Сател- лит, Ж	То же	То же	То же		
	30-40 г/га	Рожь озимая, пшеница и яч- мень яровые	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры		
	30-40 г/га + 0,2 л/га ПАВ Сател- лит, Ж	То же	То же	То же		
Флуазифоп-П-бутил						
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ (флуазифоп-П-бутил, 150 г/л), Сингента Кроп Про- текшн АГ, Швейца- рия (Р), (П-3)	1,5-2	Гречиха	Многолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов до фазы бутони- зации культуры	73	1
	0,75-1	Рапс озимый	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев у сорняков		1
	1,5-2	То же	Многолетние зла- ковые, в т.ч. пы- рей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Рапс яровой	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев у сорняков	50	1
	1,5-2	То же	Многолетние зла- ковые, в т.ч. пы- рей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		

	0,75-1	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у сорняков	66	1
	1,5-2	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у сорняков	107	1
	1,5-2	Свекла сахарная	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	1,5-2	Свекла столовая	Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	50	1
	0,75-2	Бобы кормовые, горох, люпин	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	60	1
	2	Горох овощной	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см	60	1
	0,75-1	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание посадок в фазу 2-4 листьев у сорняков	58	1
	1,5-2	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,75-2	Капуста белокочанная	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	52	1
	1-2	Капуста белокочанная (безрассадная технология)	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	52	1
	1,5-2	Морковь	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	50	1

	0,75-2	Лук всех генераций	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	50	1
	1,5-2	Земляника садовая	То же	Опрыскивание посадок после уборки урожая при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	0,75-2	Пустырник сердечный	То же	Опрыскивание плантаций в фазу 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте пырея ползучего 10-15 см	70	1
	0,75-2	Ромашка аптечная	То же	То же	35	1
Флукарбазон натрия						
КЕНТАВР , ВДГ (флукарбазон натрия, 700 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	40-60 г/га	Пшеница, тритикале и рожь озимые	Однолетние злаковые (метлица обыкновенная, мятлик однолетний), падалица рапса и некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры	35	1
ЭВЕРЕСТ , ВДГ (флукарбазон натрия, 700 г/кг), Ариста ЛайфСайенс С.А.С., Франция (Р), (П-3)	40-70 г/га	Пшеница озимая	Метлица обыкновенная; падалица рапса и некоторые двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листа культуры или весной в фазу кущения культуры	60	1
	40-70 г/га	Тритикале озимая	Однолетние злаковые (метлица обыкновенная, просо куриное, овсюг обыкновенный), падалица рапса и некоторые двудольные	То же	60	1
	40-70 г/га	То же	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу флаг лист культуры		
	40-70 г/га	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (просо куриное, овсюг обыкновенный)	Опрыскивание посевов в фазу выхода в трубку культуры	60	1
	30-35 г/га	Свекла сахарная (гибриды с устойчивостью к ацетолактат-синтазе (ALS))	Щетинник сизый	Двукратное опрыскивание: первое – в фазу 2-настоящих листьев сорняков; второе – по мере появления новых сорняков в ту же фазу. Применять в смеси с	60	2

				препаратами – ингибиторами ацетолактатсинтазы (ALS)		
Флуметсулам + флорасулам						
КСИОР, КС (флуметсулам, 100 г/л + флорасулам, 75 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,05-0,07	Пшеница, тритикале, рожь и ячмень озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу кущения культуры	104	1
	0,05-0,07	Кукуруза	То же	Опрыскивание посевов в фазу 3-5 листьев культуры	60	1
Флуроксипир кислоты						
СТАРАНЕ ПРЕМИУМ 330, КЭ (флуроксипир кислоты, 333 г/л), Дау АгроСаенсес ВмбХ, Австрия (Р), (П-3)	0,3-0,5	Пшеница и тритикале озимые, ячмень яровой	Однолетние двудольные и некоторые многолетние	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения культуры. Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		1
	0,5	То же	Подмаренник цепкий, звездчатка средняя, виды пикульника	Опрыскивание посевов в фазу флаг-листа культуры. Запрещается использование зеленой массы на корм скоту		
Флуроксипир + флорасулам						
УНИКО, ККР (флуроксипир, 100 г/л + флорасулам, 2,5 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	1-1,5	Пшеница и тритикале озимые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (осот полевой, бодяк полевой)	Опрыскивание посевов весной в фазу кущения – флаг-листа культуры		1
	1,5	Пшеница озимая	То же	Опрыскивание посевов в фазу колошения культуры		1
	1-1,5	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние двудольные, осот полевой	Опрыскивание посевов в фазу кущения - флаг-листа культуры		1
	1,5	То же	То же	Опрыскивание посевов в фазу колошения культуры		
Флурохлоридон						
РЕЙСЕР, КЭ (флурохлоридон, 250 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-3)	1-2	Кукуруза	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	1-1,5	Овес	То же	То же	30	1
	1-1,5	Овес + горох кормовой, овес + люпин узколистный (на зерно)	То же	То же		1
	2-3	Картофель	То же	Опрыскивание почвы не позднее 2-3 дней после посадки культуры		1
	3-4	Подсолнечник	То же	Опрыскивание почвы после посева до всходов культуры		1
	2-3	Морковь	То же	То же		1
Флуфенацет + аклонифен						

БАНДУР ФОРТЕ, КС (флуфенацет, 150 г/л + аклонибен, 450 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	2 -3	Картофель	Однолетние дву- дольные, просо куриное	Опрыскивание почвы до всходов культуры	84	1
Флуфенацет + дифлюфеникан						
НАЦЕТО 3Д, КС (дифлюфеникан, 300 г/л + флуфенацет, 300 г/л), ГЛОБАКЕМ НВ, Бельгия (Р), (П-З)	0,3-0,4	Пшеница ози- мая	Однолетние дву- дольные	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры	87	1
	0,3-0,4	Тритикале ози- мая	То же	То же	87	1
	0,3-0,4	Ячмень озимый	То же	То же	87	1
ФОМДОС, КС (флуфенацет, 400 г/л + дифлюфеникан, 100 г/л), Шандонг Вейфанг Рейнбоу Кемикал Ко., Лтд., Китай (Р), (П-З)	0,4-0,6	Пшеница, три- тикале и рожь озимые	Однолетние дву- дольные и злако- вые	Опрыскивание посе- вов осенью после по- сева до всходов или в фазу 1-3 листа-ку- щение культуры	180	1
	0,4-0,6	Ячмень озимый	То же	Опрыскивание посе- вов осенью после по- сева до всходов или в фазу кушения куль- туры	180	1
	0,6	Пшеница ози- мая	То же	Опрыскивание посе- вов весной в фазу ку- щения культуры	135	1
	0,4-0,6	Пшеница яровая	Некоторые одно- летние двудоль- ные, просо кури- ное	Опрыскивание посе- вов в фазу кушения культуры	30	1
	0,6	Ячмень яровой	Некоторые одно- летние двудоль- ные	То же	30	1
Форамсульфурон + йодосулфурон-метил-натрий + тиенкарбазон-метил + ципросульфамид						
МАЙСТЕР ПАУЭР, МД (форамсульфурон, 31,5 г/л + йодосулф- урон-метил-натрий, 1 г/л + тиенкарбазон- метил, 10 г/л + ципро- сульфамид, 15 г/л), Байер АГ, Германия (Р), (П-З)	1-1,5	Кукуруза	Однолетние и многолетние зла- ковые и двудоль- ные	Опрыскивание посе- вов в фазу 3-5 ли- стьев культуры		1
Хизалофоп-П-тефурил(квизалофоп-П-тефурил)						
ПАНТЕРА, КЭ (квизалофоп-П-тефу- рил, 40 г/л), Ариста Лайф Сайенс Регистрейшнс Грейт- Британ Лтд., Велико- британия (Р), (П-З)	0,75-1	Свекла сахар- ная, столовая и кормовая	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	60	1
	1-1,5	То же	Многолетние зла- ковые, в т.ч. пы- рей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Рапс озимый и яровой	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	40	1

	1-1,5	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание посадок в фазу 2-4 листьев сорняков	25	1
	1-1,5	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посадок в фазу 2-4 листьев сорняков	54	1
	1-1,5	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Горох (семенные посевы), люпин желтый и узколиственный	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	1-1,5	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Морковь, лук репчатый (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	60	1
	1-1,5	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
СКАТ, КЭ (хизалофоп-П-тефурил, 40 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	0,75	Рапс озимый	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,75-1	Свекла сахарная, лен-долгунец	То же	То же		
	1-1,5	Рапс озимый, свекла сахарная, лен-долгунец	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Календула лекарственная	Однолетние злаковые	Опрыскивание плантаций в фазу 2-4 листьев сорняков	40	1
	1,5	Сеянцы и саженцы хвойных и сеянцы лиственных пород (питомники)	Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев однолетних сорняков, при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
ХИЛЕР, МКЭ (квизалофоп-П-тефурил, 40 г/л),	0,75-1	Рапс озимый и яровой	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	40	1

АО «Щелково Агро- хим», Россия (Р), (П-З)	1-1,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Свекла сахарная	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	104	1
	1-1,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Лен-долгунец, бобы кормовые	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	60	1
	1-1,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,75-1	Люпин узко- листный, подсолнечник	Просо куриное	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	60	1
	1-1,5	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
ЭВОКАТ, КЭ (квизалофоп-п-тефу- рил, 50 г/л), ООО Группа Компа- ний «ЗемлякоФФ», Россия (Р), (П-З)	0,7-0,9	Рапс озимый и яровой	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	30	1
	0,9-1,2	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
	0,7-0,9	Свекла сахарная	Просо куриное	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	102	1
	0,9-1,2	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
	0,7-0,9	Лен долгунец, лен масличный	Просо куриное	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	90	1
	1,2	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
	0,7-0,9	Горох	Просо куриное	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	61	1
	0,9-1,2	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
	0,7-0,9	Картофель	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков	76	1
	0,9-1,2	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте пырея ползу- чего 10-15 см		
Хизалофоп-П-этил (квизалофоп -П-этил)						

ЕНОТ 100, КЭ (хизалофоп-П-этил, 100 г/л), ООО ИННВИГО, Польша (Р), (П-З)	0,4-0,6	Свекла сахарная	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев сорняков		1
	0,4 + 0,7 ПАВ Парт- нер+, Ж	То же	То же	То же		
	0,8-1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	0,8 + 0,7 ПАВ Парт- нер+, Ж	То же	То же	То же		
	0,4-0,5	Рапс озимый	Однолетние зла- ковые, в т.ч. пада- лица зерновых	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,3 + 0,7 ПАВ Парт- нер+, Ж	То же	То же	То же		
ЛЕОПАРД, КЭ (квизалофоп-П-этил, 50 г/л), ООО «АДАМА РУС», Россия (Р), (П-З)	1	Гречиха, люпин	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев однолетних сорняков	60	1
	2	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	1-2	Рапс яровой	Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев однолетних сорняков при высоте пырея ползучего 10- 15 см	95	1
	2	Свекла сахарная	То же	То же	125	1
	1	Лен-долгунец	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев однолетних сорняков	102	1
	2	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		
	1	Соя	Однолетние зла- ковые	Опрыскивание посе- вов в фазу 2-4 ли- стьев однолетних сорняков	30	1
	2	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посе- вов при высоте пы- рея ползучего 10-15 см		

	1-2	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посадок в фазу 2-4 листьев однолетних сорняков при высоте пырея ползучего 10-15 см	118	1
	1	Капуста белокочанная, морковь, лук репчатый	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов и посадок в фазу 2-4 листьев однолетних сорняков	50	1
	2	То же	Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов и посадок при высоте пырея ползучего 10-15 см		
МИУРА, КЭ (хизалофоп-П-этил, 125 г/л), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	0,8-1	Гречиха	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов до фазы бутонизации культуры	75	1
	0,4-0,8	Свекла сахарная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	146	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазу 3-5 листьев) независимо от фазы развития культуры		
	0,4-0,8	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание посадок в фазу 2-4 листьев сорняков	44	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Рапс озимый	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	40	1-2
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Рапс яровой	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	40	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,8-1	Сурепица озимая	Однолетние злаковые, пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см	40	1
	0,8-1	Горох	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см	31	1

	0,4-0,8	Соя	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	31	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Люпин узколистный	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	51	1
	0,4-0,8	Лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна	60	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Лен масличный	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	60	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Подсолнечник	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	94	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Капуста белокочанная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	88	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Морковь	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	89	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Лук репчатый из семян (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	66	1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Фацелия (семенные посевы)	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего		

				10-15 см		
	1	Валериана лекарственная	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание плантаций в фазу 2-4 листьев проса куриного и высоте пырея ползучего 10-15 см	101	1
	1	Ромашка аптечная	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание плантаций в фазу 2-4 листьев проса куриного и высоте пырея ползучего 10-15 см	35	1
	1	Пустырник сердечный (на сырье)	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание плантаций в фазу 2-4 листьев проса куриного и высоте пырея ползучего 10-15 см	25	1
	0,8-1	Расторопша пятнистая	То же	То же	59	1
	0,4-0,8	Календула лекарственная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	39	1
	0,5-0,8	Сильфия пронзеннолистная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,8-1	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазу 3-5 листьев) независимо от фазы развития культуры		
ТАРГЕТ СУПЕР, КЭ (хизалофоп-П-этил, 51,6 г/л), ООО «Агро Эксперт Групп», Россия (Р), (П-3)	1	Декоративные кустарники, в т.ч. в населенных пунктах	Многолетние злаковые	Опрыскивание посадок при высоте злаков 10-15 см		1
	1,75-2	Гречиха	Однолетние и многолетние злаковые сорняки при высоте пырея ползучего 10-15 см	Опрыскивание посевов до фазы бутонизации культуры		1
	0,9-1	Рапс озимый	Однолетние злаковые, в т.ч. падалица зерновых	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	1,75-2	Рапс озимый и яровой	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,9-1	Свекла сахарная, лен-долгунец, горох посевной	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у сорняков		1
	1,75-2	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	1	Люпин узколистный	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев у сорняков		1

		(на зерно), картофель				
	2	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	1	Капуста белокочанная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	1,75-2	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см		
	2	Аралия маньчжурская	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-15 см		1
	1	Валерьяна лекарственная, иссоп лекарственный, расторопша пятнистая, пустырник сердечный, эхинацея пурпурная	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
ФОРВАРД, МКЭ (хизалофоп-П-этил, 60 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)	2	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посадок при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,75-2	Гречиха	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов до фазы бутонизации культуры		1
	0,6-0,8	Свекла сахарная, рапс озимый и яровой, лен-долгунец	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев однолетних злаковых сорняков		1
	1,2-1,8	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (в фазу 3-5 листьев)		
	0,6-0,8	Соя, люпин узколистный, горох	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев однолетних злаковых сорняков		1
ХИМЕРА, КЭ (хизалофоп-П-этил, 125 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	1,2-1,8	То же	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Рапс озимый	Однолетние злаковые, в т.ч. падалица зерновых	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,8-1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,6	Сурепица озимая	Однолетние злаковые, в т.ч. падалица зерновых	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1

	0,8-1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,6	Рапс яровой	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,8-1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,8-1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Лен-долгунец (технические цели)	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,8-1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,6	Люпин узколистный (семенные посевы)	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков		1
	0,8-1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,6	Горох посевной	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	92	1
	0,8-1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4-0,8	Соя	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	57	1
	0,8-1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,4	Гречиха	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	30	1
	1	То же	Пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см		
	0,6-0,8	Картофель	Просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 2-4 листьев сорняков	64	1
Хизалофоп-П-этил + имазамокс						
ГЕРМЕС, МД	0,7-0,9	Горох	Однолетние	Опрыскивание	60	1

(хизалофоп-П-этил, 50 г/л + имазамокс, 38 г/л), АО «Щелково Агрохим», Россия (Р), (П-3)			двудольные	посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	(зеленая масса) 84 (зерно)	
	0,9	То же	Однолетние, многолетние злаковые и многолетние двудольные	То же		
	0,9	Бобы кормовые	Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме свеклы и рапса		1
	0,7-1	Соя	Однолетние двудольные, просо куриное	Опрыскивание посевов в фазу 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы – 16 месяцев)	30	1
	0,9	Фасоль	То же	То же	60	1
Этаметсульфурон-метил						
САЛЬСА ПРО , ВДГ (этаметсульфурон-метил, 750 г/кг), ООО «ЭфЭмСи», Россия (Р), (П-3)	20-25 г/га + 0,2 л/га ПАВ Тренд 90	Рапс озимый	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью или весной в фазу развития культуры: - от семядолей до момента выдвижения цветочных бутонов; сорняков – семядоли – 2-4 листа однолетние двудольные		1
	15-25 г/га + 0,2 л/га ПАВ Тренд 90	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (семядольные листья)		1
ТИНАК , МД (этаметсульфурон-метил, 160 г/л), ООО «Франдеса», Беларусь (Р), (П-3)	95-115 мл/га	Рапс озимый	Однолетние двудольные	Опрыскивание культуры осенью в фазу 2-3 листьев культуры или весной в фазу начало стеблевания		1

ЭСТОК , ВДГ (этаметсульфурон-метил, 750 г/кг), АО Фирма «Август», Россия (Р), (П-3)	20-25 г/га + 0,2 л/га ПАВ Адью, Ж	Рапс озимый	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу развития культуры – от семядолей до 6-8 листьев; однолетних двудольных сорняков – семядоли – 2-4 листа		1
	20-25 г/га + 0,2 л/га ПАВ Адью, Ж	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу начала стеблевания культуры		1
	15-25 г/га + 0,2 л/га ПАВ Адью, Ж	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития сорняков (семядольные листья)		1
Этаметсульфурон-метил + клопиралид + пиклорам						
РАЙДЕР , ВДГ (этаметсульфурон-метил, 750 г/кг + клопиралид, 20 г/кг + пиклорам, 5 г/кг), ООО «Агрозащита плюс», Беларусь; Ningbo Lido International Incorporation Co. Ltd., Китай (Р), (П-3)	0,025	Рапс озимый	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3 листьев у культуры		1
	0,025	То же	То же	Опрыскивание посевов весной в фазу начала стеблевания		
	0,025	Рапс яровой	То же	Опрыскивание посевов в фазу 2-3 листьев культуры		1
	0,025	Сурепица озимая	То же	Опрыскивание посевов осенью в фазу 3-4 листьев у культуры	40	1